Corrigé

PROBLEME 13

Partie A : Etude du signe de $x^3 - 1 + 2\ln x$

1. La fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$:

$$g'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x}$$

donc la fonction g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

x	0	1	+	+
g'(x)		+		
g(x)	−∞	0	↗ +∞	

2. Tableau de variation de la fonction g .

3. $g(1) = 1 - 1 + 2\ln 1 = 0$.

4. Si $x \leq 1$, alors $g(x) \leq g(1)$ puis que la fonction g est croissante soit $g(x) \leq 0$.

Si $x \geq 1$, alors $g(x) \geq g(1)$ puis que la fonction g est croissante soit $g(x) \geq 0$.

conclusion : sur $]0; 1]$, $g(x) \leq 0$ et sur $[1; +\infty[$, $g(x) \geq 0$.

On peut résumer tout cela par le tableau de signe suivant

x	1	1	+	+
Signe de g(x)		−	0	+

Partie B :

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}$.

1.a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow 0} x - 1 = -1$; $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^2} = (-\infty) \times (+\infty) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$

De la dernière limite, on en déduit que la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à la courbe (C).

1.b $f(x) - (x - 1) = -\frac{\ln x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$; donc la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote

oblique à (C) au voisinage de $+\infty$. Il y a une autre asymptote à la courbe (C) (voir 1.a), c'est la droite d'équation $x = 0$.

1.c $f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}$;

$$f'(x) = 1 - \frac{1 \times x^2 - 2x \ln x}{x^4} = 1 - \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = 1 - \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} ;$$

$$f'(x) = \frac{x^3 - 1 + 2 \ln x}{x^3} ; f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$

x	0	1	+	+
f'(x)		−	0	+
f(x)		↘ 0 ↗		

1.d $f'(x)$ est du signe de $g(x)$ car $x^3 > 0$ sur $]0; +\infty[$ et le signe de $g(x)$ a déjà été trouvé à la partie A : $f'(1) = 0$

1.e Soit x l'abscisse du point d'intersection de l'asymptote (D) et de la courbe (C), on a : $f(x) = x - 1$ soit $\ln x = 0$,

par conséquent $x = 1$. l'ordonnée de ce point est $f(1) = 0$.

La courbe (C) et la droite (D) se coupent au point de coordonnées $(1; 0)$. $f(x) - (x - 1)$ est du signe de

$-\ln x$ (voir Partie B 1. b)

Etudions le signe de $-\ln x$:

$-\ln x \geq 0$ si $\ln x \leq 0$ soit $\ln x \leq \ln 1$ d'où $x \leq 1$ sur $]0; 1]$, $-\ln x \geq 0$ donc la courbe (C) est au dessus de la droite (D)

sur $]1; +\infty[$, $-\ln x \leq 0$ donc la courbe (C) est au dessous de la droite (D)

1.f voir graphique

2.a pour tout réel x on a :

$$H'(x) = \frac{1}{x^2}(1 + \ln x) - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{1 + \ln x - 1}{x^2} = \frac{\ln x}{x^2} = h(x) \text{ donc } H \text{ est une}$$

primitive de la fonction h définie sur $]0; +\infty[$

2.b Soit Δ le domaine plan limité par (D), (C) et les droites d'équation $x = 1$ et $x = \sqrt{e}$. Sur $]1; \sqrt{e}]$ la courbe (C)

est au dessous de (D) donc l'aire du domaine Δ limité par (D), (C) et les

droites d'équation : $x = 1$ et $x = \sqrt{e}$ est en unité d'aire :

$$\int_1^{\sqrt{e}} [(x-1) - f(x)] dx = \int_1^{\sqrt{e}} h(x) dx = [H(x)]_1^{\sqrt{e}} = H(\sqrt{e}) - H(1).$$

$$H(\sqrt{e}) = \frac{-1}{\sqrt{e}}(1 + \ln \sqrt{e}) = \frac{-1}{\sqrt{e}} \left(1 + \frac{1}{2} \ln e \right) = \frac{-3}{2\sqrt{e}} \quad H(1) = -(1 + \ln 1) = -1,$$

$$\text{donc } \int_1^{\sqrt{e}} h(x) dx = \left(\frac{-3}{2\sqrt{e}} + 1 \right) \text{ u.a} = \left(\frac{-3}{2\sqrt{e}} + 1 \right) \times 6 = 6 - \frac{9}{\sqrt{e}} \text{ cm}^2. \text{ on trouve en arrondissant au mm}^2 :$$

0,54 cm².

PROBLEME 14

Partie A

soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln x - 1 - \frac{9}{2}x^2$.

Pour tout réel $x \in]0; +\infty[$, $g'(x) = \frac{1}{x} - 9x = \frac{1-9x^2}{x} = \frac{(1-3x)(1+3x)}{x}$. Or $x > 0$ donc $g'(x) = 0$

Si et seulement si, $1-3x = 0$ ou $1+3x = 0$ c'est-à-dire $x = \frac{1}{3}$ ou $x = -\frac{1}{3}$, mais $-\frac{1}{3} \notin]0; +\infty[$

Donc $g'(x) > 0$ sur $]0; \frac{1}{3}[$ et $g'(x) < 0$ sur $]\frac{1}{3}; +\infty[$.

3- la fonction g admet un maximum sur $]0; +\infty[$,

égal à $-\ln 3 - \frac{3}{2} < 0$, donc pour tout réel appartenant à

$]0; +\infty[$,

$g(x)$ est strictement négatif.

x	0	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$\swarrow$ $-\ln 3 - \frac{3}{2}$ $\searrow$		

Partie B

soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = -9x + 5 - 2\frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -9x + 5 = 5 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} -2 \frac{\ln x}{x} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

La droite D d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à la courbe C au voisinage de 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -9x + 5 = -\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Pour tout réel $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = -9 - 2 \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = -9 - \frac{2 - 2 \ln x}{x^2} = \frac{-9x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = \frac{2g(x)}{x^2}$.

Or $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ est strictement négatif sur $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	
$g(x)$	$+\infty$	$-\infty$

Tableau de variations

2/a) soit D la droite d'équation $y = -9x + 5$. On

considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = f(x) - (-9x + 5)$.

pour tout $x \in]0; +\infty[$; $h(x) = -9x + 5 - 2 \frac{\ln x}{x} - (-9x + 5) = -2 \frac{\ln x}{x}$. De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$,

donc

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$. la droite D est donc asymptote oblique à la courbe C au voisinage de $+\infty$.

b) pour le point d'intersection de C et D, on a $h(x) = 0$, c'est-à-dire $\ln x = 0$, soit $x = 1$, les coordonnées

de ce point sont $(1; -4)$.

c) si $x = 1$, on vient de voir que C et D se coupent ;

si $x > 1$ on a : $\ln x > 0$ et donc $h(x) < 0$, d'où la courbe C est en dessous de la droite D

si $0 < x < 1$, on a : $\ln x < 0$ et donc $h(x) > 0$, d'où la courbe C est au dessus de la droite D.

3°-Tangente T à la courbe C au point A d'abscisse 1

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1); f'(1) = -11 \text{ et } f(1) = -4, \text{ donc } y = -11(x - 1) - 4, \text{ soit } y = -11x + 7$$

b) courbes

4) la fonction f est dérivable est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$, donc en

particulier sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$, de plus

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + 4 \ln 2 > 0 \text{ et } f(1) = -4 < 0;$$

d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un seul réel α dans

l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Encadrement de α d'amplitude 10^{-2} . on a

$$f(0,6) > 0 \text{ et } f(0,7) < 0, \text{ donc}$$

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

$$\text{Puis } f(0,68) > 0 \text{ et } f(0,69) < 0 \text{ donc}$$

$$0,68 < \alpha < 0,69.$$

PROBLEME 15

A. Etude d'une fonction auxiliaire

1) $g(x) = x^2 + 1 - 2\ln x, x \in \mathbb{R}^{*+}$;

$$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2 - 2}{x}$$

si $x \in]0 ; 1]$ alors $g'(x) < 0$, d'où le tableau de variation

x	0	e	$+\infty$
$g'(x)$		-	0
$g(x)$		↘ 2 ↗	

2) Pour tout $x \in \mathbb{R}^{*+}$, $g(x) > 2$ d'où $g(x) > 0$

B. Etude de f et tracé de la courbe C.

1) a) $f(x) = x + \frac{1}{x} - 2\frac{\ln x}{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = (+\infty)(-\infty) = -\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

donc la droite d'équation $x = 0$ est asymptote à la courbe C.

c) $f'(x) = \frac{\left(2x - \frac{2}{x}\right)x - (x^2 + 1 + 2\ln x)}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - 2\ln x}{x^2} = \frac{g'(x)}{x^2}$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		$-\infty \rightarrow +\infty$

2) a) $f(x) - x = \frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$. donc la droite

d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe C lorsque x tend vers $+\infty$

b) $f(x) = x$ si et seulement si $\frac{1 + 2\ln x}{x} = 0$. $x \in \mathbb{R}^{*+}$ si et seulement si $\ln x = -1/2$ si et seulement si

$x = e^{-1/2}$ c) Si $x > e^{-1/2}$ alors $f(x) - x > 0$ donc si $x \in]0 ; e^{-1/2}[$ alors C est au dessous de Δ .

3) a) $x_B = 1$.

L'équation de la tangente T en B sera $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$. $y - 2 = 2(x - 1)$. $y = 2x$

b) Le coefficient directeur de T' doit être égal à 1.

On cherche à résoudre $f'(x) = 1$ soit $\frac{x^2 + 1 - 2\ln x}{x^2} = 1$ $x \in \mathbb{R}^{*+}$ d'où $1 - 2\ln x = 0$. $\ln x = \frac{1}{2}$;

$x = e^{1/2}$

4) a) $f(e) = \frac{e^2 + 1 + 2}{e} = \frac{e^2 + 3}{e}$

b) $x_A = e^{-1/2}$, $x_A = e^0 = 1$, $x_A = e^{1/2}$, $x_A = e$ Suite géométrique de raison $q = e^{1/2}$

C. 1) $H(x) = (\ln x)^2$. $H'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2\ln x}{x} = h(x)$

2) Soit

$$I = \int_{\sqrt{e}}^e (f(x) - x) dx = \int_{\sqrt{e}}^e \left(\frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x}\right) dx = \left[\ln x + (\ln x)^2\right]_{\sqrt{e}}^e = \ln e + (\ln e)^2 - \ln e^{-1/2} - (\ln e^{-1/2})^2 = 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

L'unité d'aire = 4 cm² donc l'aire cherchée est 9 cm².

PROBLEME 16

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire g

1. $g'(x) = \frac{1}{x} - 4x = \frac{1-4x^2}{x} = \frac{(1-2x)(1+2x)}{x}$. Pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$, $x > 0$ et $1 + 2x > 0$.

Donc, $g'(x)$ est du signe de $1-2x$ sur $]0; +\infty[$. Or, $1-2x > 0$ si $x < \frac{1}{2}$. D'où : $g'(x)$ est positive si x appartient à l'intervalle $]0; 1/2[$ et $g'(x)$ est négative si x appartient à l'intervalle $]1/2; +\infty[$

On en déduit alors que la fonction g est croissante sur $]0; 1/2[$ et décroissante sur $]1/2; +\infty[$.

Tableau de variations de la fonction g :

x	0	1/2	$+\infty$
$g'(x)$		+	0 -
$g(x)$		$\nearrow$ $-\ln 2 - 3/2$ $\searrow$	

$$g(1/2) = \ln(1/2) - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = -\ln 2 - 3/2$$

2. De la question précédente, en on déduit que la fonction

g admet un maximum atteint en 1/2 et ce maximum est strictement négatif.

On en déduit alors que la fonction g est négative sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Partie B : Etude d'une fonction f

1. a) Limite de f en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-2x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \text{ donc par soustraction des limites on a :}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - 2x - \frac{\ln x}{x}\right) = -\infty.$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

1. b) Limite de f en 0 :

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-2x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = (+\infty)(-\infty) = -\infty$, D'où, par addition des limites, on en conclut

$$\text{que : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - 2x - \frac{\ln x}{x}\right) = 1 - (-\infty) = +\infty. \text{ D'où } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

2. a) Montrons que la droite $\mathcal{D}$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$:

$$\text{On a : } f(x) - (1-2x) = -\frac{\ln x}{x}. \text{ Or, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0. \text{ Donc : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) - (1-2x)) = 0.$$

On en déduit

alors que la droite $\mathcal{D}$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ au voisinage de $+\infty$.

2. b) Position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $\mathcal{D}$:

Etudions le signe de $f(x) - (1-2x)$, c'est-à-dire le signe de $-\frac{\ln x}{x}$.

Pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$, $x > 0$. $-\frac{\ln x}{x}$ est donc du signe de $-\ln x$ sur $]0; +\infty[$.

Or, $\ln x \geq 0$ si $x \geq 1$; et $\ln x \leq 0$ si $0 < x \leq 1$. Donc : $f(x) - (1 - 2x) \geq 0$ si $0 < x \leq 1$ et $f(x) - (1 - 2x) \leq 0$ si $x \geq 1$

D'où : C'est au-dessus de la droite D sur $]0; 1]$ et C'est en-dessous de la droite D sur $[1; +\infty[$

3. a) Pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, on a :

$$f'(x) = -2 - \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{-2x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

3. b) Signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$:

Pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$; $x^2 > 0$. $f'(x)$ est donc du signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Or, d'après la question A.2, on sait que $g(x)$ est négative sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

On en conclut que $f'(x)$ est négative sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

La fonction f est donc décroissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

4. cf graphique

Partie C : Calcul d'une aire

1. Pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$: $h'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \ln x \times \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{x}$

2. a) cf graphique

2. b) Sur $[1; e]$, la droite D est au-dessus de la courbe C , on a donc :

$$A = \left(\int_1^e (y - f(x)) dx \right) \times u.a = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = [h(x)]_1^e \times u.a = (h(e) - h(1)) \times u.a = \left(\frac{1}{2} (\ln e)^2 - \frac{1}{2} (\ln 1)^2 \right) u.a = \frac{1}{2} \times 2^2 = 2 \text{ cm}^2$$

PROBLEME 17

A 1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln x) = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x) = 1 - \infty = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln x) \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = (-\infty) \times +\infty = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -\infty$. on peut en déduire en passant que la droite d'équation $x = 0$ est asymptote à C .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0. \text{ On peut en déduire que la droite d'équation } y = 0$$

est asymptote en $+\infty$

2. a. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout réel $x \in]0; +\infty[$ on a :

$$f'(x) = \frac{(1/x) \times x - 1 \times (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{1 - \ln x - 1}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$$

2. b. $f'(x)$ est du signe de $-\ln x$ car $x^2 > 0$ sur $]0; +\infty[$ $-\ln x > 0$ si et seulement si $\ln x < 0$

si et seulement si $0 < x < 1$. on en déduit que sur l'intervalle $]0; 1]$, $f'(x) > 0$ donc f croissante

sur l'intervalle $[1; +\infty[$, $f'(x) < 0$ donc f décroissante.

2. c. $f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+ 0 -	
$f(x)$		1	0

Partie B :

1. Le point M_1 a pour ordonnées 0 donc son abscisse est solution de l'équation $f(x) = 0$:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} = 1/e$$

2. a. Coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x_2 :

$$f'(1/\sqrt{e}) = \frac{-\ln(1/\sqrt{e})}{(1/\sqrt{e})^2} = \frac{\ln(\sqrt{e})}{1/e} = \frac{e}{2}$$

ordonnée du point au point d'abscisse x_2 :

$$f(1/\sqrt{e}) = \frac{1 + \ln(1/\sqrt{e})}{1/\sqrt{e}} = \frac{1 - 1/2}{1/\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{2} \Leftrightarrow x_2 = \frac{\sqrt{e}}{2}$$

T :

$$y = f'(1/\sqrt{e})(x - 1/\sqrt{e}) + f(1/\sqrt{e}) = (e/2) \frac{e}{2} (x - 1/\sqrt{e}) + 1/\sqrt{e} = (e/2)x - 1/\sqrt{e} + 1/\sqrt{e} = (e/2)x$$

La tangente T_2 au point M_2 a pour équation : $y = \frac{e}{2}x$.

b. c'est bien l'équation d'une droite passant par l'origine du repère.

3. la tangente au point M_3 d'abscisse x_3 est parallèle à l'axe des abscisses donc son coefficient directeur

est nul donc $f'(x_3) = 0$ on en déduit $x_3 = 1$ et $M_3(1; 1)$

$$4. f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2} \quad f''(x) = \frac{(-1/x) \times x^2 + 2x \times (1 + \ln x)}{x^4} = \frac{x - 2 \ln x}{x^3} = -\frac{2 \ln x - 1}{x^3}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2 \ln x - 1}{x^3} = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x - 1 \Leftrightarrow \ln x^2 = \ln e \Leftrightarrow x_4 = \sqrt{e}$$

$$5. x_1 = 1/e ; x_2 = \frac{\sqrt{e}}{2} ; x_3 = 1 \text{ et } x_4 = \sqrt{e} \quad \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{x_4}{x_3} = \sqrt{e} \text{ . Donc } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ sont}$$

les quatre termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\sqrt{e}$.

6.

$$A = \int_{1/e}^2 f(x) dx = [F(x)]_{1/e}^2 = F(2) - F(1/e)$$

$$= \ln 2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 - \left(\ln(1/e) + \frac{1}{2}(\ln(1/e))^2 \right)$$

$$= \ln 2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 - \left(-1 + \frac{1}{2} \right)$$

$$A = \ln 2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 + \frac{1}{2}$$

Partie C :

1. g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout réel x de $]0; +\infty[$ on a :

$$g(x) = (\ln x)^2 \quad g'(x) = 2 \frac{\ln x}{x}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} \quad F(x) = \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$$