Problème 31

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-2; 2]$.

Partie A

La figure ci-dessous donne une partie de la courbe C représentative de la fonction f dans un repère orthonormal du plan, ainsi que la droite D , tangente à la courbe au point d'abscisse 0. On note f' la fonction dérivée de f sur $[-2; 2]$.

1. Par lecture graphique et sans donner de justification :

- a. Déterminer $f(0)$.
- b. Donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$.

Aucune valeur approchée de la (ou des) solution(s) n'est demandée.

c. Donner le nombre de solutions de l'équation $f'(x) = 0$.

Aucune valeur approchée de la (ou des) solution(s) n'est demandée.

2. Par lecture graphique et en justifiant votre réponse, déterminer $f'(0)$.

3. L'une des deux courbes $C1$, $C2$, $C3$ ci-après est la courbe de la fonction f' , fonction dérivée de la fonction f . En justifiant votre réponse, éliminer les deux courbes qui ne peuvent pas représenter f' .

Partie B

La fonction f étudiée dans la première partie est définie sur $[-2; 2]$ par : $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 2x - 1,5$

- 1. Calculer $f(0)$.
- 2. a. On note f' la fonction dérivée de f . Calculer $f'(x)$.
 - b. Résoudre dans $[-2; 2]$, l'inéquation $e^{2x} - 2 \geq 0$
 - c. En déduire l'intervalle sur lequel la fonction f est croissante.

Problème 32

Partie B : étude d'une fonction intermédiaire

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = \ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$

1. a. On désigne par g' la dérivée de la fonction g .

Montrer que, pour tout nombre réel strictement positif x , $g'(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x^3}$

b. Étudier le signe de $g'(x)$. En déduire que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

2. a. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[1/2; 1]$

b. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .

3. Déduire des questions B1° et B2° le signe de $g(x)$, pour x appartenant à l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

Partie C : étude des variations de la fonction f et construction de la courbe associée

1. a. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = e^x g(x)$, pour tout nombre x appartenant à l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

b. En déduire le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

2. a. Dresser le tableau de variations de la fonction f .

b. Calculer une valeur approchée à 10.1 près de $f(\alpha)$, en prenant 0,6 pour valeur approchée de α .

3. a. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

x	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
$f(x)$ à 10^{-2} près									

b. Construire l'asymptote D et la courbe C pour x appartenant à l'intervalle $]0 ; 2,5]$.

4. Montrer que la fonction F , définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $F(x) = e^x \ln x$ est une primitive de f .

5. On désire calculer l'aire de la partie E du plan comprise entre la courbe C, l'axe des abscisses et les

droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 2$.

b. Déterminer la valeur exacte de l'aire de E en unités d'aires, puis en cm^2 .

Problème 34

Partie A : Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E): $y' + y = -x - 1$; où y désigne une fonction de la variable x ,

définie et dérivable sur l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

1. a) Résoudre l'équation différentielle $y' + y = 0$.

b) Déterminer la solution h de cette équation différentielle $y' + y = 0$ prenant la valeur $1/e$ en $x = 1$.

2. Déterminer le nombre réel a tel que la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = e^{-x} + ax$ soit solution de l'équation différentielle (E).

Partie B : Étude d'une fonction auxiliaire f

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x} - x$.

1. Déterminer les limites de la fonction f en $+\infty$ et $-\infty$.

2. f' désigne la fonction dérivée de la fonction f

Calculer, pour tout réel x , $f'(x)$ puis en déduire le tableau de variations de la fonction f .

3. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0 ; 1]$.

b) Donner un encadrement de α d'amplitude 0,01.

4. Préciser le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $[0 ; 1]$.

Partie C : Calcul de l'aire d'une partie du plan

La représentation graphique C de la fonction f , dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est tracée sur la

feuille jointe en annexe, qui est à rendre avec la copie.

1. Dans le demi-plan constitué des points d'abscisses positives, hachurer la partie D limitée par la courbe C

l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.

2. Calculer en fonction de α la mesure, en unités d'aire, de l'aire de la partie D du plan.

Partie D : Étude d'une fonction g et représentation graphique

La fonction g est définie sur $]-\infty; \alpha[$ par : $g(x) = \frac{x}{e^{-x} - x}$ (où α désigne le nombre réel trouvé à la partie B) et on note C_g sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. a) Vérifier que, pour tout $x \in]-\infty; \alpha[$ $g(x) = \frac{xe^x}{1 - xe^x}$

b) En déduire la limite de la fonction g en $-\infty$ et interpréter graphiquement cette limite.

2. En utilisant les résultats trouvés dans la partie B question 4, déterminer la limite de la fonction g en α .

Interpréter graphiquement cette limite.

3. a) La fonction g' désignant la dérivée de la fonction g , montrer que pour tout $x \in]-\infty; \alpha[$:

$$g'(x) = \frac{e^{-x}(x+1)}{(e^{-x} - x)^2}$$

b) En déduire les variations de la fonction g sur $]-\infty; \alpha[$ et dresser le tableau des variations de la fonction g .

4. Tracer la courbe représentative C_g de la fonction g dans le repère figurant sur la feuille annexe à remettre

avec la copie

Problème 35

Partie A: Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 5y = 5x^3 + 3x^2 + 5$, où y représente une fonction de la variable x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $y' + 5y = 0$.
2. Déterminer deux nombres réels a et b tels que la fonction u , définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = ax^3 + b$, soit solution de l'équation différentielle (E).
3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = ke^{-5x} + x^3 + 1$ où k est un nombre réel.
 - a) Vérifier que h est solution de l'équation (E).
 - b) Déterminer le réel k tel $h(0) = 2$.

Partie B : Étude de la fonction f

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -3e^{-5x} + x^3 + 1$.

1. a) Déterminer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $-\infty$.
- b) Déterminer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.
2. a) On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f . Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .
- b) En déduire le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations.
3. a) Calculer $f(0)$ et $f(1)$.
- b) Établir que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0 ; 1]$.
- c) Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} du nombre réel α .
- d) Déterminer selon les valeurs du réel x , le signe de $f(x)$.

Partie C : Courbe représentative de la fonction f

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unités graphiques 8 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées.

On note C la courbe représentative de la fonction f dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = x^3 + 1$. La représentation graphique Γ de la fonction u , dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est tracée sur la feuille jointe en annexe.
 - a) On pose, pour tout réel x $d(x) = f(x) - u(x)$. Étudier le signe de $d(x)$.
 - b) En déduire la position de la courbe C par rapport à la courbe Γ .
2. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous. On donnera dans chaque cas la valeur décimale arrondie au centième de $f(x)$.

x	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
$f(x)$								

3. Tracer la courbe C dans le repère figurant sur la feuille annexe à remettre avec la copie.

Partie D : Calcul d'une aire

On appelle P la partie du plan limitée par la courbe C , l'axe des abscisses et les droites d'équation

$$x = 1/2 \text{ et } x = 1.$$

1. Hachurer sur la feuille annexe la partie P du plan.
2. Calculer la mesure, en unités d'aire, de l'aire A de la partie P du plan.
Dans cette question particulièrement, toute trace de recherche, même incomplète, figurant sur la copie

Problème 36

Partie A : Détermination d'une fonction g

On désigne par (E) l'équation différentielle $2y' + y = 0$, dans laquelle y désigne une fonction de la variable x définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$. y' désigne la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation différentielle (E).
2. Soit f la solution particulière de l'équation différentielle (E) vérifiant $f(2) = e$.

Démontrer que, pour tout nombre réel x , $f(x) = e^{2-x/2}$.

3. Pour tout nombre réel x , on pose $g(x) = (2x+1)[f(x)]^2 - 9$.

Montrer que $g(x) = (2x+1)e^{4-x} - 9$.

Partie B : Étude de la fonction g

On désigne par C la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthogonal.

1. Déterminer la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers $-\infty$.
2. a. Montrer, que pour tout nombre réel x , $g(x) = 2e^4 x e^{-x} + e^4 e^{-x} - 9$.
b. Utiliser cette expression pour déterminer la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers $-\infty$.
c. En déduire que la courbe C admet une asymptote Δ dont on donnera une équation.
3. a. On désigne par g' la fonction dérivée de la fonction g . Montrer que pour tout réel x ,
 $g'(x) = (1-2x)e^{4-x}$.
b. Déterminer le sens des variations de g et dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. a. Calculer la valeur exacte des nombres $g(-1)$ et $g(0)$.
b. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[-1 ; 0]$.

- c. Donner l'arrondi au centième de α .
5. Déterminer une équation de la droite D tangente à la courbe C au point d'abscisse 4.
6. a. Compléter le tableau de valeurs de g qui se trouve sur la feuille annexe à rendre avec la copie.
On arrondira les valeurs à l'unité.
- b. Tracer la droite Δ , la droite D, puis la courbe C, dans le repère figurant sur la feuille annexe à rendre avec la copie.

Partie C : Calcul d'aire

1. Démontrer que la fonction G définie sur R par $G(x) = (-2x - 3)e^{4-x} - 9x$ est une primitive sur R de la fonction g .
2. a. Hachurer la partie H du plan délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 4$.
- b. Calculer en unités d'aire la mesure exacte de l'aire de la partie H du plan.
- c. En déduire en cm^2 la valeur arrondie au centième de l'aire de H.
On rappelle que les unités graphiques sont : 2 cm pour une unité en abscisse et 1 cm pour 10 unités en ordonnée

Tableau des valeurs de la fonction g (valeurs arrondies à l'unité)

x	-0,75	-0,5	-0,25	0	0,5	1	2	3	4	5	6
$f(x)$											

Repère orthogonal d'unités graphiques : 2 cm pour 1 unité en abscisse et 1 cm pour 10 unités en ordonnée

Problème 35

- I-Pour chacune des questions, une seule des réponses **a**, **b** ou **c** est exacte.
Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.

On définit la fonction f sur l'ensemble R des nombres réels par : $f(x) = 2e^{-\frac{1}{2}x}$.

Le plan est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

On a tracé, ci-dessous, la courbe représentative C de la fonction f dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$

On note A et B les points de coordonnées respectives $(-3; 0)$ et $(0; 2)$.

On note D le domaine (hachuré ci-dessous) délimité par :

- la courbe C,
- l'axe des abscisses,
- l'axe des ordonnées,
- la droite d'équation : $x = 2$.

1 .
a. La fonction f est une solution de l'équation différentielle (E) :

Réponse a. : (E) : $2y' + y = 0$; Réponse b. : (E) : $2y' - y = 0$; Réponse c. : (E) : $y' - y = 0$.

(y désigne une fonction inconnue définie sur l' ensemble des nombres réels de variable x ; y' désigne la fonction dérivée de la fonction y .)

b. La courbe C a pour asymptote la droite d'équation :

Réponse a. : $y = -2x$; Réponse b : $x = 0$; Réponse c. : $y = 0$.

2. On note S le solide de révolution engendré par la rotation du domaine D autour de l'axe des abscisses.

La valeur V du volume du solide S est donnée par : $V = \pi \int_0^2 [f(x)]^2 dx$ (en unités de volume).

La valeur V du volume du solide S, en cm^2 est égale à :

Réponse a. : $4\pi(1 - e^{-2})$; Réponse b. : $16\pi(1 - e^{-2})$; Réponse c. : $32\pi(1 - e^{-2})$.

Problème 37

Partie A

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, trois réponses sont proposées .Une seule des réponses proposées est exacte. Une bonne réponse rapporte 1 point. Une mauvaise réponse enlève 0,5 point. L'absence de réponse apporte ni n'enlève aucun point. Si le total des points est négatif la note globale attribuée à l'exercice est 0.

Vous reporterez sur votre copie la réponse correcte. Aucune justification n'est demandée.

1. Soit f la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = (2x + 3)e^{-x}$.
Sa fonction dérivée f' est donnée par :

a. $f'(x) = 2e^{-x}$
 $f'(x) = (-2x-1)e^{-x}$.

b. $f'(x) = (-2x-3)e^{-x}$

c.

2. Soient f et g les fonctions définies et dérivables sur telles que $f(x) = \frac{8(x+1)}{e^x}$ et $g(x) = 0,5(x+1)e^x$

Dans le repère orthogonal ci-dessous, on a tracé les courbes C_f et C_g représentant les fonctions f et g sur l'intervalle $[-1 ; 4]$. On désigne par T et T' les tangentes respectives à C_f et C_g au point d'abscisse 0.

a. $f(0)$ est égale à :

a. -1

b. 0,5

c. 0

d. 8

b. $f'(0)$ est égale à :

a. -1

b. 0

c. 1

d. 8

c. sur l'intervalle $[-1;4]$ l'équation $f(x) = g(x)$ a :

a. Trois solutions

b. Deux solutions

c. Une solution

d. Aucune solution

d. g a pour dérivée :

a. $(0,5x+1)e^x$

b. $0,5e^x$

c. $0,5xe^x$

d.

$0,5(x+1)e^x$

Problème 38

Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+3)e^x - 1$

1. Déterminer la limite de g en $+\infty$ et la limite de g en $-\infty$.

2. Déterminer, à l'aide de la dérivée g' , le sens de variation de g .

En déduire le tableau de variation de g .

3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique $\square$ qui appartient à l'intervalle $]-4;0[$.

4. Déduire des questions précédentes le signe de $g(x)$ en fonction des valeurs de x .

Partie B: Étude d'une fonction et tracé de sa courbe représentative

Soit f la définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+2)e^x - x$

On note (C_f) la courbe représentative de f dans le repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(Unités graphiques : 4cm sur l'axe des abscisses et 2cm sur l'axe des ordonnées).

1. a. Déterminer la limite de f en $-\infty$.
 b. Montrer que la droite () d'équation $y = -x$ est asymptote la courbe (C_f) en $-\infty$.
 c. Étudier, en fonction des valeurs de x , les positions relatives de () et (C_f)
2. En remarquant que $f(x)$ peut s'écrire $f(x) = e^x \left(x+2 - \frac{x}{e^x} \right)$. déterminer la limite de f en $+\infty$.
3. Vérifier que pour tout réel, on a $f'(x) = g(x)$
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) en son point A d'abscisse 0.
6. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, une valeur approchée de α à 10^{-2} près, puis une valeur approchée de $f(\alpha)$ à 10^{-2} près.
7. Tracer, dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la courbe (C_f) la tangente (T) et l'asymptote ().

Partie C.

1. Soit H la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $H(x) = (x+1)e^x$.

Calculer $H'(x)$ puis en déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$

2. Calculer en cm^2 , l'aire A comprise entre la courbe (C_f) , l'axe des abscisses , la droite l'équation $x = -2$ et l'axe des ordonnées. On donnera la valeur approchée à 10^{-2} près.