problème 13

A 1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln x) = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x) = 1 - \infty = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln x) \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = (-\infty) \times +\infty = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$. on peut en déduire en passant que la droite d'équation $x = 0$ est asymptote à C.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. On peut en déduire que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote en $+\infty$

2. a. f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et pour tout réel $x \in]0 ; +\infty[$ on a : $f'(x) = \frac{(1/x) \times x - 1 \times (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{1 - \ln x - 1}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$

2.b. $f'(x)$ est du signe de $-\ln x$ car $x^2 > 0$ sur $]0 ; +\infty[$ $-\ln x > 0$ si et seulement si $\ln x < 0$ si et seulement si $0 < x < 1$. on en déduit que sur l'intervalle $]0 ; 1]$, $f'(x) > 0$ donc f croissante sur l'intervalle $[1 ; +\infty[$, $f'(x) < 0$ donc f décroissante .

2. c. $f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		1	0

Partie B :

1. Le point M_1 a pour ordonnées 0 donc son abscisse est solution de l'équation $f(x) = 0$:

$f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} = 1/e$

2. a. coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x_2 : $f'(1/\sqrt{e}) = \frac{-\ln(1/\sqrt{e})}{(1/\sqrt{e})^2} = \frac{\ln(\sqrt{e})}{1/e} = \frac{e}{2}$.

ordonnée du point au point d'abscisse x_2 : $f(1/\sqrt{e}) = \frac{1 + \ln(1/\sqrt{e})}{1/\sqrt{e}} = \frac{1 - 1/2}{1/\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{2} \Leftrightarrow x_2 = \frac{\sqrt{e}}{2}$.

T : $y = f'(1/\sqrt{e})(x - 1/\sqrt{e}) + f(1/\sqrt{e}) = (e/2) \frac{e}{2} (x - 1/\sqrt{e}) + 1/\sqrt{e} = (e/2)x - 1/\sqrt{e} + 1/\sqrt{e} = (e/2)x$

La tangente T_2 au point M_2 a pour équation : $y = \frac{e}{2}x$.

b. c'est bien l'équation d'une droite passant par l'origine du repère.

3. la tangente au point M_3 d'abscisse x_3 est parallèle à l'axe des abscisses donc son coefficient directeur est nul donc $f'(x_3) = 0$ on en déduit $x_3 = 1$ et $M_3 (1 ; 1)$

4. $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$. $f''(x) = \frac{(-1/x) \times x^2 + 2x \times (1 + \ln x)}{x^4} = \frac{x - 2 \ln x}{x^3} = -\frac{2 \ln x - 1}{x^3}$

$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2 \ln x - 1}{x^3} = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x - 1 \Leftrightarrow \ln x^2 = \ln e \Leftrightarrow x_4 = \sqrt{e}$

5. $x_1 = 1/e$; $x_2 = \frac{\sqrt{e}}{2}$; $x_3 = 1$ et $x_4 = \sqrt{e}$. $\frac{x_2}{x_1} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{x_4}{x_3} = \sqrt{e}$

Donc x_1, x_2, x_3, x_4 sont les quatre termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\sqrt{e}$.

$A = \int_{1/e}^2 f(x) dx = [F(x)]_{1/e}^2 = F(2) - F(1/e)$

6. $= \ln 2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 - \left(\ln(1/e) + \frac{1}{2}(\ln(1/e))^2 \right)$

$= \ln 2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 - \left(-1 + \frac{1}{2} \right)$

$A = \ln 2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 + \frac{1}{2}$

Partie C :

1. g est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et pour tout réel x de $]0 ; +\infty[$ on a : $g(x) = (\ln x)^2$ $g'(x) = 2 \frac{\ln x}{x}$.

$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$ $F(x) = \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$