

EXERCICE 5

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - \frac{1}{2}y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}$, où y est une fonction inconnue de la variable x , dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

1. Résoudre l'équation différentielle : $y' - \frac{1}{2}y = 0$.

2. On considère la fonction f définie sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels par :

$$f(x) = e^{x/2} - \frac{1}{2}x$$

Vérifier que f est solution de l'équation (E)

3. On a dessiné ci-contre la courbe C_f représentative de la fonction f , précédemment définie, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, pour les valeurs de x comprises entre 0 et 2.

On note K le solide engendré par la rotation de la courbe C_f autour de l'axe des abscisses.

a. On note h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = xe^{x/2}, \text{ et } H \text{ la fonction définie sur } \mathbb{R}$$

$$\text{par : } H(x) = 2e^{x/2}(x - 2).$$

Démontrer que H est une primitive de h sur $\mathbb{R}$

b. Calculer la valeur exacte du volume V du solide K , exprimée en unités de volume.

$$(\text{On rappelle que } V = \pi \int_0^2 [f(x)]^2 dx).$$

