Problème 11

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + x \ln x$. On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Toutes les aires considérées dans ce problème seront exprimées en unités d'aire.

Partie A

Le but de cette partie est de déterminer un encadrement de l'aire A du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe (C_f) et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

On note M et N les points de (C_f) d'abscisses respectives 1 et 2, P et Q leurs projetés orthogonaux respectifs sur l'axe des abscisses. La figure est donnée plus bas.

1. a. Montrer que f est positive sur $[1; 2]$.
- b. Montrer que le coefficient directeur de la droite (MN) est $2 \ln 2$.
- c. Soit E le point d'abscisse $\frac{4}{e}$. Montrer que sur l'intervalle $[1; 2]$, le point E est l'unique point de (C_f) en lequel la tangente à (C_f) est parallèle à (MN) .
- d. On appelle (T) la tangente à (C_f) au point E . montrer qu'une équation de (T) est :

$$y = (2 \ln 2)x - \frac{4}{e} + 1.$$

2. Soit g la fonction définie sur $[1; 2]$ par $g(x) = f(x) - \left[(2 \ln 2)x - \frac{4}{e} + 1 \right]$.

- a. Montrer que $g'(x) = 1 + \ln\left(\frac{x}{4}\right)$ pour tout x de $[1; 2]$.
- b. Etudier les variations de g sur $[1; 2]$ et en déduire la position relative de (C_f) et de (T) sur cet intervalle.
3. Soient M' et N' les points d'abscisses respectives 1 et 2 de la droite (T) . On admet que la courbe (C_f) reste sous la droite (MN) sur l'intervalle $[1; 2]$ et que les points M' et N' ont des ordonnées strictement positives.
 - a. Calculer les aires des trapèzes $MNQP$ et $M'N'QP$.
 - b. En déduire, à l'aide de la calculatrice, un encadrement de A d'amplitude 10^{-1} .

Partie B

Le but de cette partie est de déterminer la valeur exacte de A .

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^2 x \ln x dx$.
2. En déduire la valeur exacte de A .

Problème 12

Partie A

Le but de cette partie est d'étudier la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x + \frac{2 \ln x}{x}$. On désigne par (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique: 1 cm).

1. Étude de la fonction auxiliaire g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$
 - a) Étudier le sens de variation de g et calculer $g(1)$.
 - b) En déduire le signe de $g(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.
2. a) Calculer les limites de f en 0 et en $+\infty$.

- b) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
- c) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C_f) et étudier la position de (C_f) par rapport à (D) .
- d) Déterminer les coordonnées du point A de (C_f) sachant que (C_f) admet en A une tangente T parallèle à (D) .
- e) Tracer (C_f) , (D) et T dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
3. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par (D) , la courbe (C_f) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique x_0 . Prouver que $\frac{1}{2} \leq x_0 \leq 1$.

Problème 13

Partie A

Étude de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$

On appellera C sa courbe représentative.

1. Étudier la limite de f en $+\infty$.
Étudier la limite de f en 0.
Étudier les variations de f ; en dresser le tableau de variations.
2. Déterminer la valeur de x telle que $f(x) = 0$.
Écrire l'équation de la tangente T à C en ce point.
3. Tracer C et T.

Partie B

1. Montrer qu'une primitive de $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ est $x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$.

En déduire l'ensemble des primitives F de f .

2. Déterminer la primitive de f qui s'annule pour $x = 1$.

Cette primitive sera appelée F_1 .

Déduire de la partie A le sens de variation de F_1 ; déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition, dresser le tableau de variations et donner les intersections de la courbe représentative de F_1 avec $x'Ox$.

Représenter graphiquement F_1 .

3. On appelle F_2 la primitive de f qui prend la valeur 0,5 pour $x = 1$. Donner l'expression de F_2 . Expliquer la construction de la courbe représentative de F_2 à partir de celle de F_1 . Tracer la courbe représentative de F_2 .

Problème 13

Première partie On considère la fonction numérique f définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x \cdot \ln \frac{x+2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

- 1.a. Montrer que f est continue en 0.
- b. f est-elle dérivable en 0 ?
- c. On pose $h = \frac{2}{x}$ avec $(x > 0)$. Trouver la limite de f quand x tend vers $+\infty$.

2.a. Pour $x > 0$ calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ et vérifier que $f''(x) = -\frac{4}{x(x+2)^2}$.

- b. Etudier le sens de variation de $f'(x)$, et trouver la limite de $f'(x)$ quand x tend vers $+\infty$. En déduire le signe de $f'(x)$.
- c. Dresser le tableau de variations de $f(x)$
3. On appelle C la courbe représentative de $f(x)$ (unités : 4 cm). Tracer C en indiquant la tangente en O et au point A d'abscisse 2.
4. Soit u la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $u(x) = \frac{2x}{x+2}$ et H sa représentation graphique dans le même repère que C .
- a. Dresser le tableau de variation de u et vérifier que pour tout $x > 0$ on a $f(x) - u(x) = x \cdot f'(x)$. En déduire la position relative de C et H . Tracer H en indiquant le point B d'abscisse 2.
- b. λ étant un réel strictement positif, montrer que la tangente à C au point d'abscisse λ rencontre l'axe des ordonnées au point J d'ordonnée $u(\lambda)$. En déduire à l'aide du tracé de H la construction de la tangente à C au point d'abscisse λ . Indiquer la construction ainsi de la tangente à C au point A .

Deuxième partie On se propose de déterminer l'ensemble (E) des fonctions g , définies et dérivables sur $]0, +\infty[$ et possédant la propriété suivante P : $g(x) - x \cdot g'(x) = \frac{2x}{x+2}$

g étant définie et dérivable sur $]0, +\infty[$ on pose $G(x) = \frac{g(x)}{x}$.

1. Montrer que g possède la propriété P si et seulement si $G'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$
2. En déduire l'ensemble (E) .

Problème 14

Soit la fonction définie sur l'intervalle $I = [4; +\infty[$ par :

$f(x) = -2x + 5 + 3 \ln\left(\frac{x+1}{x-4}\right)$ et (C) sa courbe représentative dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique : 1 cm.

1. Étude de f

- a) Étudier les limites de la fonction f aux bornes de I .
- b) Montrer que sur I , $f'(x)$ est strictement négatif et dresser le tableau de variation de f .
- c) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -2x + 5$ est une asymptote à (C_f) .
- Préciser la position de (C_f) par rapport à (D) .
2. Tracer la courbe (C_f) et la droite (D) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
3. Déterminer les coordonnées du point de (C_f) où la tangente (T) a un coefficient directeur égal à $-\frac{9}{2}$. Donner une équation de (T) et la tracer dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

4. Calcul d'aire

- a) Déterminer, à l'aide d'une intégration par parties, les primitives sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \ln x$
- b) Montrer que la fonction $G(x) = (x+1)\ln(x+1) - x$ est une primitive de la fonction $g(x) = \ln(x+1)$ sur I .
- c) Montrer que la fonction $H(x) = (x-4)\ln(x-4) - x$ est une primitive de la fonction $h(x) = \ln(x-4)$ sur I .

d) Dédurre des questions précédentes le calcul de l'aire A du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations respectives. $x = 5$ et $x = 6$.

On donnera la valeur exacte de A puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

5. Intersection de (C) et de l'axe des abscisses

a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans I une unique solution, notée x_0 .

b) Déterminer graphiquement un encadrement de x_0 d'amplitude 0,5.

c) À l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement de x_0 d'amplitude 10^{-2} .

On explicitera la méthode employée.

Partie B

Calcul d'intégrales

Pour tout réel a de l'intervalle $]0 ; 1]$ on pose :

$$I(a) = \int_a^1 f(x) dx \quad \text{et} \quad J(a) = \int_a^1 g(x) dx.$$

1. Calculer l'intégrale $I(a)$ en fonction de a .

À cet effet, on pourra remarquer que $f(x)$ peut s'écrire : $f(x) = x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$.

2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $J(a)$ en fonction de a .

3. a) Calculer : $\lim_{a \rightarrow 0} (I(a) - J(a))$. [On admettra que $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 \ln x) = 0$.]

b) Donner une interprétation géométrique de cette limite

Problème 15

a. La fonction g est définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2x\sqrt{x} - 3 \ln x + 6$

En utilisant les variations de g , déterminer son signe suivant les valeurs de x .

b. La fonction numérique f est définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3 \ln x}{\sqrt{x}} + x - 1$

1. Déterminer les limites de f en 0 et $+\infty$ (en $+\infty$, on pourra poser $X = \sqrt{x}$).

2. Utiliser la première partie pour déterminer le sens de variation de f .

3. a. Soit (Δ) la droite d'équation $y = x - 1$ et C la représentation graphique de f dans un repère

orthonormé du plan. Montrer que (Δ) est asymptote de C et étudier leurs positions relatives.

Les construire.

4-a-Déterminer la dérivée de la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = 6\sqrt{x} \ln x$

b- En déduire la primitive F de f sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1.