Cette épreuve comporte trois pages numérotées 1/3 ; 2/3 et 3/3 . Le candidat recevra deux feuilles de papier millimétré.

EXERCICE 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm. Soit B, C, D et H les points

d'affixes respectives $b = \sqrt{8} - i\sqrt{8}$, $c = \sqrt{3} + i$, $d = 1 - i\sqrt{3}$ et $h = \frac{dc}{b^3}$.

1. a) Ecrire les nombres complexes b, c et d sous forme trigonométrique.
b) En déduire la forme trigonométrique du nombre complexe h .
c) Justifier que h^{1932} est un nombre réel strictement négatif.
2. a) Construire avec précision (en expliquant la méthode) les points B, C et D .
b) Justifier que le triangle DOC est rectangle isocèle
3. a) Déterminer l'affixe du point E pour que $CODE$ soit un carré.
b) Déterminer l'affixe du point F pour que O soit le centre de gravité du triangle BCF .
c) Placer les points E et F .
4. a) Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe h .
b) En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

EXERCICE 2

Un dé parfait possède : une face marquée 0 ; deux faces marquées - 2 et trois faces marquées 1.

- I. On lance une fois le dé et on lit le numéro marqué sur la face supérieure.
Calculer la probabilité d'obtenir chaque numéro.
- II. Une expérience $\mathcal{E}$ consiste à lancer deux fois de suite le dé. On note a le numéro lu au premier lancer et b celui du deuxième lancer. On obtient ainsi le résultat $(a; b)$ de $\mathcal{E}$.
 1. Justifier que la probabilité d'obtenir des numéros identiques est $\frac{7}{10}$
 2. Pour un résultat $(a; b)$ obtenu, on écrit le nombre complexe $z = a + ib$ et on place son point image M dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.
 - a) Placer tous les points images possibles.
 - b) Déterminer la probabilité de chacun des événements :

E_1 « M est sur la droite d'équation $y = x$ » et E_2 « OJM est un triangle rectangle »

3. Soit A le point d'affixe $-1 - i$ et (Γ) le cercle de centre A et de rayon $\sqrt{3}$.
On désigne par Y la variable aléatoire égale à la distance AM .
- Montrer que Y prend exactement trois valeurs que l'on précisera.
 - Justifier que la probabilité l'événement $(Y = \sqrt{5})$ est $\frac{1}{2}$.
 - Déterminer la loi de probabilité de Y .
 - Vérifier que l'espérance mathématique de Y est $\frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}{4}$.
 - Montrer que la probabilité que le point M se place à l'extérieur du cercle (Γ) est $\frac{3}{4}$.
4. On pratique n fois ($n \in \mathbb{N}^*$) la même expérience $\mathcal{E}$, en espérant placer une fois au moins le point M à l'intérieur du cercle (Γ) .
- Quelle est la probabilité P_n de le réaliser ?
 - Au bout de combien de fois peut-on le réaliser à plus de 98,95 % ?

PROBLEME

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ avec $OI = 2$ cm

PARTIE A

Soit h la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -\frac{2x^2}{x^2+1} + \ln(x^2 + 1)$.

- Calculer les limites de h en $-\infty$ et $+\infty$.
- Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = \frac{-2x(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$
- Etudier le sens de variation de h et dresser son tableau de variation.
- Justifier que sur $]0; +\infty[$ l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α .
 - Montrer que $1,98 < \alpha < 1,99$.
- Etudier la parité de h . En déduire que $-\alpha$ est une racine de h .
- Démontrer que :

$$\begin{cases} \forall x \in]-\infty; -\alpha[\cup]\alpha; +\infty[& h(x) > 0 \\ \forall x \in]-\alpha; 0[\cup]0; \alpha[& h(x) < 0 \\ \forall x \in \{-\alpha; 0; \alpha\} & h(x) = 0 \end{cases}$$

Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par
$$\begin{cases} g(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{3x} & \text{si } x \neq 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

et (C_g) est sa courbe représentative dans $(O; I; J)$

1. Montrer que g est impaire.
2. a) Calculer la limite à droite de g en 0 (on pourra poser $X = x^2$)
b) En déduire la limite à gauche de g en 0 puis que g est continue en 0.
3. a) Montrer que g est dérivable en 0 et que $g'(0) = \frac{1}{3}$
b) Donner une équation de la tangente (T) à (C_g) au point d'abscisse 0.
4. a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^*, g(x) = \frac{2 \ln|x|}{3x} + \frac{1}{3x} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$.
b) En déduire les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de g .
c) Interpréter graphiquement ces limites.
5. a) Justifier que $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = \frac{-h(x)}{3x^2}$
b) Déterminer le sens de variation de g et dresser son tableau de variation.
c) Justifier que $g(\alpha) = \frac{2\alpha}{3(\alpha^2+1)}$ puis en déduire $g(-\alpha)$ en fonction de α .
d) Déterminer $g([-1; 2[)$
6. Construire (T) et (C_g) . On prendra $\alpha = 1,98$.
7. a) Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[$, $\frac{2 \ln x}{x} \leq \frac{\ln(x^2+1)}{x} \leq \frac{2 \ln x}{x} + \frac{\ln 2}{x}$.
b) En déduire que : $\frac{2}{3e} \leq g(e) \leq \frac{2 + \ln 2}{3e}$
8. Soit f la restriction de g à l'intervalle $K =]-\alpha; 0[$.
a) Justifier que f réalise une bijection de K sur un intervalle L à préciser.
b) Calculer $f(-1)$ puis justifier que la réciproque f^{-1} de f est dérivable en $-\ln(\sqrt[3]{2})$.