ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE
ET D'ECONOMIE APPLIQUEE
ABIDJAN

AVRIL 1998

CONCOURS D'ELEVE INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE
OPTION MATHEMATIQUES

EPREUVE DE CALCUL NUMERIQUE

DUREE : 2 HEURES

Les trois parties sont très largement indépendantes.

Les candidats pourront admettre un résultat qu'ils n'auraient pas démontré à condition de le préciser explicitement.

Il sera tenu le grand compte de la rigueur et de la clarté du raisonnement.

Dans tout le problème :

n désigne un entier naturel strictement positif,

$x = (x_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ un élément de $\mathbb{R}^n$,

$\| \cdot \|$ une norme quelconque de $\mathbb{R}^n$,

$M_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille (n, n) , à coefficients réels, muni de sa structure usuelle d'espace vectoriel réel,

$A = \left((a_{ij})_{i, j \in \{1, \dots, n\}} \right)$ un élément de $M_n(\mathbb{R})$

A^t la matrice transposée de A ,

et trA la trace de A

PARTIE n° 1

① On définit $\|\cdot\|: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ de la façon suivante :

$$\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \|A\| = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|Ax\| \leq \alpha \|x\| \} \quad (S)$$

Montrer que $(M_n(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé.

Dans tout le reste du problème, on dira qu'une norme $N(\cdot)$ de $M_n(\mathbb{R})$ est subordonnée si l'on peut trouver une norme $\|\cdot\|$ de $\mathbb{R}^n$ telle que $N(\cdot)$ se construit à partir de $\|\cdot\|$ en utilisant la formule (S). On dira aussi que $N(\cdot)$ est subordonnée à $\|\cdot\|$.

② Soit $\|\cdot\|$ une norme subordonnée de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que :

$$\forall A, B \in M_n(\mathbb{R}), \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

③ Soient $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ les trois normes de $\mathbb{R}^n$ définies par :

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

On note $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ les trois normes de $M_n(\mathbb{R})$ subordonnées à $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ respectivement

Montrer que :

$$\textcircled{1} \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\textcircled{2} \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

④ Montrer que l'application $\|\cdot\|_E : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\|A\|_E = \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

munit $M_n(\mathbb{R})$ d'une structure d'espace vectoriel normé.

Montrer que $\|A\|_E = \left(\text{tr}(A^t A) \right)^{1/2}$. Cette norme est-elle subordonnée ?

PARTIE n° 2

Dans toute cette partie, on suppose que A est inversible

Soit $\|\cdot\|$ une norme de $M_n(\mathbb{R})$ subordonnée à la norme $\|\cdot\|$ de $\mathbb{R}^n$, et $\Delta A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $\|\Delta A\| < \|A^{-1}\|^{-1}$.

① Montrer que $A + \Delta A$ est inversible.

② Soient b et Δb deux éléments de $\mathbb{R}^n$. On définit x et $\Delta x \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$Ax = b \text{ et } (A + \Delta A)(x + \Delta x) = (b + \Delta b).$$

① Montrer l'existence et l'unicité de x et Δx .

② On définit : $\chi(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$.

On notera que $\chi(A)$ dépend à priori du choix de la norme subordonnée $\|\cdot\|$.

$\chi(A)$ est appelé coefficient de conditionnement de la matrice A

Montrer que $\chi(A) \geq 1$

③ Montrer que $\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\chi(A)}{1 - \chi(A)\|\Delta A\|/\|A\|} \left(\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$

Lorsque l'on cherche à résoudre numériquement le système $Ax = b$, le meilleur cas de figure est-il d'avoir une matrice au coefficient de conditionnement faible ou élevé ?

① Calculer, à 10^{-2} près, les solutions des systèmes suivants :

$$10u_1 + 7u_2 + 8u_3 + 7u_4 = 32$$

$$7u_1 + 5u_2 + 6u_3 + 5u_4 = 23$$

$$8u_1 + 6u_2 + 10u_3 + 9u_4 = 33$$

$$7u_1 + 5u_2 + 9u_3 + 10u_4 = 31$$

$$10v_1 + 7v_2 + 8v_3 + 7v_4 = 32,1$$

$$7v_1 + 5v_2 + 6v_3 + 5v_4 = 22,9$$

$$8v_1 + 6v_2 + 10v_3 + 9v_4 = 33,1$$

$$7v_1 + 5v_2 + 9v_3 + 10v_4 = 30,9$$

$$10w_1 + 7w_2 + 8,1w_3 + 7,2w_4 = 32$$

$$7,08w_1 + 5,04w_2 + 6w_3 + 5w_4 = 23$$

$$8w_1 + 5,98w_2 + 9,89w_3 + 9w_4 = 33$$

$$6,99w_1 + 4,99w_2 + 9w_3 + 9,98w_4 = 31$$

② Calculer $x(A)$, A étant la matrice de $M_4(\mathbb{R})$ associée au premier système étudié dans la question précédente, lorsque l'on prend $\|\cdot\|_2$ comme norme. Vérifier la majoration obtenue dans la question ② de la Partie 2 lorsque l'on considère le second système comme une perturbation du premier.