AVRIL 2006

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

1^{ère} COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

(Durée de l'épreuve : 4 heures)

Les résultats seront encadrés.

Pour n entier ≥ 1 , On désigne par $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (resp. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$) l'espace vectoriel des matrices n lignes et n colonnes à coefficients dans $\mathbb{C}$ (resp. $\mathbb{R}$).

Si $A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on écrit $A \leq B$ (resp. $A < B$) si pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $a_{i,j} \leq b_{i,j}$ (resp. $a_{i,j} < b_{i,j}$). A est positive (resp. strictement positive) si $A \geq [0]$ (resp. $A > [0]$), $[0]$ désigne la matrice nulle.

Un vecteur $x \in \mathbb{C}^n$ est dit positif (resp. strictement positif) si ses coordonnées sont positives (resp. strictement positives).

Une norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dite sous-multiplicative si

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad N(AB) \leq N(A)N(B).$$

Partie I

On munit $\mathbb{C}^n$ de la norme : $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto \|x\| = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{R}$, définie par

$$\|A\|_\infty = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}, \quad A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),$$

est une norme.

2. Si $A = (a_{i,j})$, vérifier que

$$\|A\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \right).$$

3. Montrer que la norme $\|\cdot\|_\infty$ est sous-multiplicative.

Partie II

Pour toute matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout vecteur $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, on pose $|A| = (|a_{i,j}|)$ et $|x| = (|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$.

1. Montrer que si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $x \in \mathbb{C}^n$, alors $|A+B| \leq |A| + |B|$, $|AB| \leq |A||B|$ et $|Ax| \leq |A||x|$.

2. Montrer que si A est une matrice strictement positive et x un vecteur positif non nul alors Ax est un vecteur strictement positif.

3. Montrer que si A est une matrice positive et x un vecteur strictement positif alors $Ax = 0$ implique $A=0$.

4. Montrer que si deux complexes z, z' vérifient $|z+z'| = |z| + |z'|$, alors il existe un réel λ tel que $z' = \lambda z$.

5. En déduire que si $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}^n$ sont n nombres complexes ($n \geq 2$) tels que $|z_1 + z_2 + \dots + z_n| = |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$,

$$\exists \theta \in \mathbb{R}, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \quad z_k = e^{i\theta} |z_k|$$

6. Soit A une matrice strictement positive et $x \in \mathbb{C}^n$. Montrer que

$$|Ax| = |A||x| \implies \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad x = e^{i\theta} |x|.$$

Partie III

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A , on appelle rayon spectral le nombre $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice inversible, $T = (t_{i,j})$ une matrice triangulaire semblable à la matrice A et λ une valeur propre de la matrice A .

- Déterminer le rayon spectral de la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a^2 \neq c^2$.
- Montrer qu'il existe une matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, non nulle, telle que $AX = \lambda X$.
- En déduire que $\rho(A) \leq \|A\|$.
- Comparer $\rho(A)$ et $\rho(S^{-1}AS)$.
- Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a $\rho(A^k) = [\rho(A)]^k$. En déduire que $\rho(A) \leq \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$.
- Montrer que l'application $N : A \mapsto \|S^{-1}AS\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- Soit $\varepsilon > 0$ et $\Delta = (\Delta_{i,j})$ la matrice donnée par

$$\Delta_{i,j} = 0, \quad \text{si } i \neq j \quad \text{et} \quad \Delta_{i,i} = d^{i-1}, 1 \leq i \leq n, \quad \text{où } d > 0.$$

Calculer $\Delta^{-1}T\Delta$, En déduire qu'il existe une norme sous-multiplicative N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$N(A) \leq \rho(A) + \varepsilon.$$

- Montrer que si $\rho(A) < 1$ alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$.
- En déduire que $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$ (considérer la matrice $A_\varepsilon = \frac{A}{\rho(A) + \varepsilon}$, $\varepsilon > 0$).

Partie IV

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice strictement positive.

On note $\mathcal{S}_+ = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / x_i \geq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$.

- Montrer que l'ensemble

$$\Lambda = \{\lambda \in \mathbb{R} / \exists X \in \mathcal{S}_+, AX \geq \lambda X\}$$

est majoré et que sa borne supérieure λ_0 est une valeur propre réelle de A associée à un vecteur propre X strictement positif.

- Si $\lambda \neq \lambda_0$ est une autre valeur propre de A , montrer que $|\lambda| < \lambda_0$.
- Montrer que le sous espace propre E_{λ_0} de A associé à la valeur propre λ_0 est de dimension 1.