

BACCALAURÉAT  
SESSION 2024

**Fomesoutra.com**  
*ça soutra !*

Durée : 4 h  
Coefficient : 4

# MATHÉMATIQUES

## SÉRIE D

Cette épreuve comporte 3 pages numérotées 1/3, 2/3 et 3/3.  
Toute calculatrice scientifique est autorisée.

### EXERCICE 1 (2 points)

Écris, le numéro de chacun des énoncés ci-dessous suivi de VRAI si l'énoncé est vrai ou de FAUX si l'énoncé est faux.

- Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $K$  et  $F$  une primitive de  $f$  sur  $K$ .  
Les fonctions  $x \mapsto F(x) + c$ ,  $c \in \mathbb{R}$  sont les primitives de  $f$  sur  $K$ .
- Le coefficient de corrélation linéaire  $r$  d'une série statistique double  $(X, Y)$  est tel que :  
 $-1 < r < -0,87$ . La corrélation linéaire entre les variables  $X$  et  $Y$  est forte.
- La fonction dérivée sur  $\mathbb{R}$  de la fonction  $x \mapsto a^x$ ,  $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ , est la fonction :  $x \mapsto a^x$ .
- Soit  $f$  une fonction définie sur  $]0; +\infty[$  et  $\ell$  un nombre réel tel que :  
 $\forall x \in ]0; +\infty[, |f(x) - \ell| < \frac{1}{x}$ . On a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ .

### EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, les informations  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  permettent d'obtenir quatre affirmations dont une seule est vraie.

Écris le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de l'information qui donne l'affirmation vraie.

- $z$  est un nombre complexe tel que  $z = a + bi$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}$ . Le module de  $z$  est égal à...  
a)  $a^2 + b^2$  ; b)  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ; c)  $a^2 - b^2$  ; d)  $|a + b|$ .
- Une primitive sur  $]0; \frac{\pi}{2}[$  de la fonction  $x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x}$  est la fonction  $F$  définie par :...  
a)  $F(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$  ; b)  $F(x) = -\ln(\sin x)$  ; c)  $F(x) = \ln(\sin x)$  ; d)  $F(x) = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{(\sin x)^2}$ .
- Soit  $\Omega$  un point du plan. L'homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $-3$  est une similitude directe de centre  $\Omega$ , de ...  
a) rapport  $-3$  et d'angle  $0$  ; b) rapport  $-3$  et d'angle  $\pi$  ;  
c) rapport  $3$  et d'angle  $\pi$  ; d) rapport  $3$  et d'angle  $0$ .
- Si  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont des points du plan complexe d'affixes respectives  $z_A$ ,  $z_B$  et  $z_C$  telles que :  
 $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = -i\sqrt{3}$ , alors...  
a)  $ABC$  est un triangle rectangle en  $A$  ; b)  $ABC$  est un triangle isocèle en  $A$   
c)  $ABC$  est un triangle rectangle isocèle en  $A$  ; d) les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.

**EXERCICE 3** (3 points)

Dans le cadre du programme jeunesse d'un gouvernement, une enquête a été menée en 2023 sur l'ensemble des élèves issus d'un centre de formation professionnelle.

Cette enquête a révélé que 40% de ces élèves sont des bacheliers. Parmi ces bacheliers, 90% ont obtenu un emploi et parmi les non bacheliers, 70% ont obtenu un emploi.

1. On choisit au hasard un élève issu de ce centre.

Démontre que la probabilité que cet élève ait obtenu un emploi est 0,78.

2. On admet que le centre a formé suffisamment d'élèves.

On choisit au hasard 5 élèves issus du centre et on désigne par  $X$  la variable aléatoire égale au nombre d'élèves ayant obtenu un emploi.

a) On admet que  $X$  suit une loi binomiale de paramètres 5 et 0,78.

Calcule l'espérance mathématique  $E(X)$  de  $X$  et interprète le résultat.

b) Calcule la probabilité qu'au moins 3 de ces élèves aient obtenu un emploi.

**EXERCICE 4** (3 points)

On se propose de chercher la fonction  $f$ , dérivable sur  $\mathbb{R}$ , solution de l'équation différentielle

(E) :  $y' - 2y = -4x - 4$  telle que  $f(0) = 1$ , puis de déterminer une valeur approchée de l'équation  $x \in [0; +\infty[$ ,  $f(x) = -1$ .

1. Démontre que la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $h(x) = 2x + 3$  est une solution de (E).

2. Soit l'équation différentielle (E') :  $y' - 2y = 0$ .

Détermine les solutions sur  $\mathbb{R}$  de (E').

3. Soit  $g$  une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

a) Démontre que  $g$  est solution de (E) si et seulement si  $g - h$  est une solution de (E').

b) Dédus des questions précédentes les solutions de (E).

c) Justifie que la fonction  $f$  cherchée est définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = -2e^{2x} + 2x + 3$ .

4. a) Justifie que  $f$  est strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$ .

b) Démontrer que l'équation  $x \in [0; +\infty[$ ,  $f(x) = -1$ , admet une solution unique  $\alpha$  telle que :  $0,4 < \alpha < 0,5$ .

**EXERCICE 5** (5 points)

Le but de cet exercice est de démontrer qu'une fonction est bijective et d'effectuer un calcul d'aire.

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, I, J)$  d'unité graphique 2 cm.

On considère la fonction numérique  $h$ , continue sur  $]1; +\infty[$  et définie par :  $h(x) = \frac{x+1}{x \ln x}$ .

On note  $(\mathcal{C})$  sa courbe représentative dans le repère  $(O, I, J)$ .

1. Démontre que :  $\forall x \in ]1; +\infty[, 1 + x + \ln x > 0$ .

2. a) Calcule la limite de  $h$  à droite en 1, puis interprète graphiquement le résultat.

b) Démontre que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe  $(\mathcal{C})$  de  $h$  en  $+\infty$ .

3. a) Démontre que :  $\forall x \in ]1; +\infty[, h'(x) = -\frac{1+x+\ln x}{(x \ln x)^2}$ .

b) Justifie que :  $\forall x \in ]1; +\infty[, h'(x) < 0$ .

4. Démontre que  $h$  est une bijection de  $]1; +\infty[$  dans un intervalle  $K$  à préciser.

5. Soit  $(\Gamma)$  la courbe représentative de la fonction  $g$  définie sur  $]1; +\infty[$  par :  $g(x) = \frac{1}{\ln x}$ .

Démontre que  $(\mathcal{C})$  est au-dessus de  $(\Gamma)$  sur  $]1; +\infty[$ .

6. a) Justifie que :  $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln 2$ .

b) Détermine l'aire  $\mathcal{A}$  en  $\text{cm}^2$  de la partie du plan limitée par  $(\mathcal{C})$ ,  $(\Gamma)$  et les droites d'équations  $x = e$  et  $x = e^2$ .

### **EXERCICE 6**

**(5 points)**

Monsieur Zahui, un entrepreneur, vient d'acquérir avec la mairie de sa ville natale un terrain qu'il doit mettre en valeur. Il souhaite construire sur ce terrain un marché de produits vivriers pour aider les femmes à écouler facilement leurs marchandises. Il dispose de 20 000 000 F CFA et voudrait doubler cette somme avant de commencer à réaliser son projet. Il sollicite une institution financière qui lui propose d'épargner cette somme à un taux d'intérêt annuel de 6,9%.

Monsieur Zahui voudrait savoir le nombre minimum d'années qu'il lui faut pour commencer le projet. Ne sachant pas comment s'y prendre, il te sollicite.

À l'aide d'une argumentation basée sur tes connaissances mathématiques, réponds à la préoccupation de Monsieur Zahui.

DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS

SOUS-DIRECTION DES EXAMENS SCOLAIRES

SERVICE BACCALAUREAT

### BACCALAUREAT - SESSION 2024

ÉPREUVE : ...MATHÉMATIQUES... DATE : ...19-06-2024... HEURE : ...4H...

CORRIGE ET BAREME

SÉRIE(S) :

**D**

CORRIGE	BAREME
<p>Ce barème est national. Il ne peut être modifié.</p> <p>Certaines réponses ont été données à titre indicatif. Cependant, toute autre démarche correcte sera acceptée.</p> <p>Le correcteur devra tenir compte de la démarche qui conduit au résultat.</p> <p>A un résultat correct non justifié ou incorrectement justifié, on accordera la moitié des points sauf si la question est notée sur 0,25. Dans ce cas on attribuera la note zéro (0).</p> <p>Pour l'exercice 06, le correcteur doit attribuer les points en fonction des indicateurs et non à chaque résultat.</p> <p>Le critère de perfectionnement (CP) est à appliquer à l'ensemble de la production de l'exercice.</p>	

1/7

CORRIGE	BAREME
<u>EXERCICE 1. (2pts)</u>	
1- Vrai ; 2- Vrai ; 3- Faux ; 4- Vrai	(0,5) x 4
<u>EXERCICE 2 (2pts)</u>	
1-B ; 2-C ; 3-C ; 4-A	(0,5) x 4
<u>EXERCICE 3 (3pts)</u>	
1. Démonstration correcte:	
$P(E) = P(B \cap E) + P(\bar{B} \cap E) \text{ ou } \left\{ \begin{array}{l} = P(B) \times \frac{P(E)}{B} + P(\bar{B}) \times \frac{P(E)}{B} \end{array} \right\}$	(0,5)
$P(E) = 0,4 \times 0,9 + 0,6 \times 0,7 = 0,78$	(0,5)
2. a) Calcul de E(x).	
$E(x) = np$	(0,25)
$= 5 \times 0,78$	} (0,25)
$E(x) = 3,9$	
Interprétation	
En moyenne, 4 personnes sur 5 de ce centre ont obtenu un emploi.	(0,5)
b) Calcul de la probabilité qu'au moins 3 de ces élèves aient obtenu un emploi.	
$P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$	(0,25)
$= C_5^3 \times (0,78)^3 \times (0,22)^2 + C_5^4 \times (0,78)^4 \times (0,22)^1 + C_5^5 \times (0,78)^5 \times (0,22)^0$	} (0,75)
$P(X \geq 3) = 0,926$	

CORRIGE

BAREME

Exercice 4 (3 pts)

1. Démonstration correcte.

$h$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et on a :

$\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = 2$

$h'(x) - 2h(x) = -4x - 4$ , donc  $h$  est solution

de (E)

0,25

2. Déterminons les solutions sur  $\mathbb{R}$  de (E').

Les solutions sur  $\mathbb{R}$  de (E') sont les fonctions de la forme :  $x \mapsto k e^{2x}$ ;  $k \in \mathbb{R}$

0,25

3.a) Démonstration correcte - - - - -

0,5

3.b) Déduction des solutions de (E).

Soit  $g$  une solution de (E),

on a :  $g - h$  est solution de (E').

$(g - h)(x) = k e^{2x}$ ;  $k \in \mathbb{R}$

$g(x) = k e^{2x} + h(x)$

$g(x) = k e^{2x} + 2x + 3$

Les solutions sur  $\mathbb{R}$  de (E) sont les fonctions de la forme :  $x \mapsto k e^{2x} + 2x + 3$ ;  $k \in \mathbb{R}$

0,5

c) Justification correcte - - - - -

0,25

4.a) Démonstration correcte

$\forall x \in [0; +\infty[$ ,  $f'(x) = -4e^{2x} + 2$  - - - - -

0,25

$\forall x \in [0; +\infty[$   $f'(x) < 0$  - - - - -

0,25

CORRIGE	BAREME
4. b) Démonstration correcte de l'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution $\alpha$ - - - - -	0,5
Vérification de : $0,4 < \alpha < 0,5$ - - - - -	0,25
On a : $f(0,4) = -0,65$ et $f(0,5) = -1,44$ Comme $f(0,5) < -1 < f(0,4)$ donc $0,4 < \alpha < 0,5$ Car $f$ est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$	
<u>EXERCICES (5 pts)</u>	
1. Démonstration correcte - - - - -	0,5
2. a) Calcul de la limite de $h$ à droite en 1.	
$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x \ln x}$ $= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x} \times \frac{1}{\ln x}$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = +\infty \quad \text{car} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} = +\infty \end{cases}$	0,5
Interprétation graphique du résultat:	
La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $(\mathcal{C})$ . - - - - -	0,25
2. b) Démonstration correcte:	
$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ - - - - -	0,5
3. a) Démonstration correcte - - - - -	0,5
3. b) Justification correcte - - - - -	0,5

CORRIGE	BAREME
4. Démonstration correcte de la bijection- Intervalle $K = ]0; +\infty[$ - - - - -	0,5 0,25
5. Démonstration correcte $h(x) - g(x) = \frac{1}{x \ln x}$ - - - - -	0,25
$\forall x \in ]1; +\infty[, h(x) - g(x) > 0$ - - - - -	0,25
6. a) Justification correcte - - - - -	0,5
6. b) Détermination de l'aire $A$ en $cm^2$ $A = \int_e^{e^2} (h(x) - g(x)) dx$ - - - - -	0,25
$A = \left( \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx \right) \times 4 cm^2$ } $A = (4 \ln 2) cm^2$ }	0,25

EXERCICE 6 (5 pts)

Critères	Indicateurs	Barème
CM1 : (0,75) Pertinence	Pour répondre à la préoccupation de Mr Zahui, je vais : - utiliser les suites numériques - Déterminer une suite $(U_n)$ qui donne le capital après $n$ années d'épargne ( $n \in \mathbb{N}$ ). - Déterminer la valeur minimale de $n$ telle que : $U_n \geq 2 \times U_0$	1 ind/3 $\rightarrow$ 0,5 à partir de 2 ind/3 totalité des points (0,75)

Critères	CORRIGE Indicateurs	BAREME Barème
<p>CM2 : (2,5)</p> <p>Utilisation correcte des outils math en situation (concerne les étapes de la démarche)</p> <p>• Choix des outils appropriés</p> <p>• Application correcte des propriétés, règles et définition</p>	<p>• Définition de <math>(U_n)</math> On a : <math>U_0 = 20\,000\,000</math> <math>\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = 1,069 U_n</math></p> <p>• Détermination de la nature de <math>(U_n)</math> <math>(U_n)</math> est une suite géométrique de 1er terme <math>U_0 = 20\,000\,000</math> et de raison <math>q = 1,069</math>.</p> <p>• Formule explicite de <math>(U_n)</math> <math>\forall n \in \mathbb{N}, U_n = 20\,000\,000 \times (1,069)^n</math></p> <p>• Présence de l'inéquation : <math>U_n \geq 2U_0</math></p> <p>• Détermination de la valeur minimale de <math>n</math>.</p>	<p>1 ind/5 <math>\rightarrow</math> (1pt)</p> <p>2 ind/5 <math>\rightarrow</math> (1,75)</p> <p>à partir de 3 ind/5, totalité des points (2,5).</p>
<p>CM3 : (1,25)</p> <p>Cohérence de la réponse</p> <p>• Cohérence entre les étapes de la démarche.</p> <p>• Cohérence dans la démonstration</p>	<p>• Le résultat produit est conforme au résultat attendu <math>U_n \geq 2U_0 \Rightarrow n \geq 10,38</math></p> <p>• Le résultat produit est en adéquation avec la démarche</p> <p>• La qualité des enchaînements de la démarche</p> <p>• Conclusion correcte : La valeur minimale de <math>n</math> est 11.</p>	<p>1 ind/4 <math>\rightarrow</math> 0,5</p> <p>2 ind/4 <math>\rightarrow</math> 0,75</p> <p>à partir de 3 ind/4, totalité des points (1,25)</p>

