

PROBLÈME 1

PARTIE A

1. $D_f = \mathbb{R}$

2.

a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{cases}$

b. $f(x) = \frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{(\sqrt{x^2+1}+x)} = \frac{x^2+1-x^2}{(\sqrt{x^2+1}+x)}$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$

On en déduit que :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{cases}$

(Γ) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$.

3.

a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} + x$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2+1}+x)(\sqrt{x^2+1}-x)}{(\sqrt{x^2+1}-x)}$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = 0$

b. $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2}$

$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} > |x|$

Or $|x| \geq x, \forall x \in \mathbb{R}$

D'où $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} > x$

$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} - x > 0$

$\Leftrightarrow f(x) > 0$

En conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$

$f(x) + 2x = \sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x} = \frac{1}{f(x)}$

On en déduit que :

$\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) + 2x) > 0$

c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = 0$.

Alors (Γ) admet une asymptote oblique d'équation $y = -2x$ au voisinage de $-\infty$.

$\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) + 2x) > 0$.

Alors (Γ) est au dessus de son asymptote oblique.

4.

a. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 = \frac{x-\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{-(\sqrt{x^2+1}-x)}{\sqrt{x^2+1}}$

$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{-f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$

b. $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} > 0$.

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $-f(x)$.

Par conséquent : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R}, f est strictement décroissante

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | 0 |

c. f est dérivable sur \mathbb{R} donc continue sur cet ensemble ; de plus f est strictement décroissante sur \mathbb{R} .

Alors f réalise une bijection de \mathbb{R} sur $I =]0; +\infty[$

Soit $y \in I$,

$f(x) = y \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} - x = y$

$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = y + x$

$\Leftrightarrow x^2 + 1 = (y + x)^2$

$\Leftrightarrow x^2 + 1 = y^2 + 2xy + x^2$

$\Leftrightarrow 1 - y^2 = 2xy$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1-y^2}{2y} = u^{-1}(y)$$


On en déduit que :

$$\forall x \in]0; +\infty[, f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{2x}$$

5. (T): $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$
 $f'(0) = 1$ et $f(0) = 1$

$$(T): y = x + 1$$

6. Voir graphique
 7. Pour la construction de (Γ') on remarquera que (Γ') et (Γ) sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$



PARTIE B

1. $f(x) = x \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} = 2x$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x \geq 0 \\ x^2 + 1 = 4x^2 \end{cases}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$
 $\Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

On conclut donc que :
 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$

2. f étant décroissante,
 $\forall x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], f\left(\frac{3}{4}\right) \leq f(x) \leq f\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}$
 $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{3}{4}$
 (Car $\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} \approx 0,61 \leq \frac{3}{4}$)

$$\text{Donc } \forall x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], \frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{3}{4}$$

$$f'(x) = \frac{-f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\forall x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], \frac{1}{4} \leq x^2 \leq \frac{9}{16}$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{4} \leq x^2 + 1 \leq \frac{25}{16}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{5}}{2} \leq \sqrt{x^2 + 1} \leq \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{5} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \leq \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{5} \leq \frac{f(x)}{\sqrt{x^2+1}} \leq \frac{3}{2\sqrt{5}}$$

$$(\text{Car } \frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{3}{4})$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3}{2\sqrt{5}} \leq f'(x) \leq -\frac{2}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{5} \leq |f'(x)| \leq \frac{3}{2\sqrt{5}} \leq \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], |f'(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{5}}$$

3.
 a. Par définition, $U_0 = \frac{1}{2} \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$
 $\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$
 et montrons que $U_{n+1} \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$

En effet :

$$U_n \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right] \Rightarrow f(U_n) \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$$

Car d'après 2.a,

$$\forall x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], \frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{3}{4}$$

$$\text{Or } f(U_n) = U_{n+1}$$

$$\text{D'où } U_{n+1} \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right] \text{ si } U_n \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$$

- b. $\frac{\sqrt{3}}{3} \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], U_n \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$ et

$$\forall x \in \left[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right], |f'(x)| \leq \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Donc d'après l'inégalité des accroissements finis on a :

$$\left|f(U_n) - f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}} \left|U_n - \frac{\sqrt{3}}{3}\right|$$

$$\text{Or } f(U_n) = U_{n+1} \text{ et } f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\left|U_{n+1} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}} \left|U_n - \frac{\sqrt{3}}{3}\right|$$

c. En partant de l'inégalité précédente, on a :

$$n = 0 \Rightarrow \left| U_1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}} \left| U_0 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right|$$

$$n = 1 \Rightarrow \left| U_2 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}} \left| U_1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right|$$

$$n = 3 \Rightarrow \left| U_3 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}} \left| U_2 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow \left| U_n - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}} \left| U_{n-1} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$\left| U_n - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^n \left| U_0 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right|$$

$$\left| U_0 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \approx 0,07 \leq 1$$

$$\Rightarrow \left| U_n - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^n \left| U_0 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^n \times 1$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left| U_n - \frac{\sqrt{3}}{3} \right| \leq \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^n$$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^n = 0$ car $0 < \frac{2}{\sqrt{5}} < 1$

On en déduit que la suite (U_n)

converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{\sqrt{3}}{3}$

PROBLEME 2

$$f(x) = x \ln x - x + 1 \text{ si } x > 0$$

$$\begin{cases} f(0) = 1 \end{cases}$$

$$D_f = [0; +\infty[$$

PARTIE A

1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - x + 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1) = 1 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Alors f est continue en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x - 1) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty$$

Alors f n'est pas dérivable en 0

Interprétation graphique

Au point $(0; 1)$ la courbe (\mathcal{C}) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas

2. $f'(x) = \ln x$

$$\forall x \in]0; 1[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$, f est décroissante

Sur $]1; +\infty[$, f est croissante

Tableau de variations de f

| | | | | |
|---------|---|---|-----------|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ | |
| $f'(x)$ | | - | 0 | + |
| $f(x)$ | 1 | | 0 | $+\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\ln x - 1 + \frac{1}{x} \right)$$


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$

3. (T): $y = f'(e)(x - e) + f(e)$

$$(T): y = x + 1 - e$$

4. Tracer de (T) et (C)



PARTIE B

$$g(x) = 2 - f(x)$$

- $f(x) - g(x) = 2x(\ln x - 1)$
 $\forall x \in [0; +\infty[$, $2x \geq 0$ alors le signe dépend de celui de $(\ln x - 1)$
 $\ln x - 1 > 0 \Rightarrow x > e$
 $\forall x \in [0; e[$, $f(x) - g(x) \leq 0$
 $\forall x \in [e; +\infty[$, $f(x) - g(x) \geq 0$
 On en déduit que :

Sur $[0; e[$, (C) est en dessous de (Gamma)
 Sur $[e; +\infty[$, (C) est au dessus de (Gamma)

- $g(x) = -f(x) + 2$
 Soit (C') la courbe symétrique de (C) par rapport à l'axe des abscisses ; la courbe (Gamma) est l'image de (C') par la translation du vecteur $2\vec{j}$ (voir la figure)
- $\mathcal{A}(\lambda) = ua \times \int_{\lambda}^e (g(x) - f(x)) dx$

$$\int_{\lambda}^e (g(x) - f(x)) dx = \int_{\lambda}^e 2x(1 - \ln x) dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = 1 - \ln x \\ v'(x) = 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = -\frac{1}{x} \\ v(x) = x^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{\lambda}^e (g(x) - f(x)) dx &= [x^{2(1-\ln x)}]_{\lambda}^e + \int_{\lambda}^e x dx \\ &= \left[\frac{3}{2} x^2 - x^2 \ln x \right]_{\lambda}^e \end{aligned}$$

$$\int_{\lambda}^e (g(x) - f(x)) dx = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \lambda^2 + \lambda^2 \ln \lambda$$

$$ua = 4cm^2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = (2e^2 - 6\lambda^2 + 4\lambda^2 \ln \lambda) cm^2$$

$$4. \lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda) = 2e^2 \text{ car } \begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda^2 = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda^2 \ln \lambda = 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{A} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda) = 2e^2$$

Interprétation graphique

\mathcal{A} représente l'aire en cm^2 du domaine plan délimité par les courbes (C) et (Gamma) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e$

PARTIE C

- $g'(x) = -f'(x)$

D'après PARTIE A.2

$$\forall x \in]0; 1[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$, g est croissante

Sur $]1; +\infty[$, g est décroissante

Tableau de variation de g

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---|-----------|
| x | 0 | 1 | + | + | + |
| $g'(x)$ | | + | 0 | - | |
| $g(x)$ | | | | | |
| | 1 | | 2 | | $-\infty$ |

Sur $[0; 1]$, $g > 0$

(Car $\forall x \in [0; 1]$, $g(x) \in [1; 2]$)

Sur $]1; +\infty[$, g est continue car

dérivable et est strictement

décroissante. Alors g réalise une

bijection de $]1; +\infty[$ sur $] -\infty; 2[$ et

$0 \in] -\infty; 2[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et $\alpha \in]1; +\infty[$

2.

- $\begin{cases} g(3) = 0,70 > 0 \\ g(4) = -0,54 < 0 \end{cases}$

On a : $g(3) \times g(4) < 0$
Alors $\alpha \in I = [3; 4]$

b. $g(x) = 0 \Leftrightarrow -x \ln x + x + 1 = 0$
 $\Leftrightarrow \ln x = 1 + \frac{1}{x}$
 $\Leftrightarrow x = e^{1+\frac{1}{x}}$

$g(x) = 0 \Leftrightarrow e^{1+\frac{1}{x}} = x$

Déduction

On sait que α est l'unique solution de l'équation $g(x) = 0$ sur $[3; 4]$.
 On en déduit que α est l'unique solution de l'équation $e^{1+\frac{1}{x}} = x$ sur $[3; 4]$

3. $\Phi(x) = e^{1+\frac{1}{x}}$; $D_\Phi = I = [3; 4]$

a. $\Phi'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{1+\frac{1}{x}} < 0 \forall x \in [3; 4]$

On en déduit que Φ est décroissante

| | | |
|------------|------|------|
| x | 3 | 4 |
| $\Phi'(x)$ | - | |
| $\Phi(x)$ | 3,79 | 3,49 |

b. D'après le tableau de variation de Φ , on a :

$\forall x \in [3; 4], 3,49 \leq \Phi(x) \leq 3,79$

Or $[3,49; 3,79] \subset [3; 4]$

D'où $\forall x \in [3; 4], \Phi(x) \in [3; 4]$

c. $\forall x \in [3; 4], 9 \leq x^2 \leq 16$

$\Leftrightarrow \frac{1}{16} \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{9}$ et $3 \leq \Phi(x) \leq 4$

$\Leftrightarrow \frac{3}{16} \leq \frac{1}{x^2} e^{1+\frac{1}{x}} \leq \frac{4}{9}$

$\Leftrightarrow -\frac{4}{9} \leq \Phi'(x) \leq -\frac{3}{16}$

$\Leftrightarrow \frac{3}{16} \leq |\Phi'(x)| \leq \frac{4}{9}$

On conclut que :

$\forall x \in [3; 4], |\Phi'(x)| \leq \frac{4}{9}$

4. $\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = \Phi(U_n) \end{cases}$

a. $U_0 = 3 \in [3; 4]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in [3; 4]$

et montrons que $U_{n+1} \in [3; 4]$

$U_n \in [3; 4] \Rightarrow \Phi(U_n) \in [3; 4]$

Car d'après 3b),

$\forall x \in [3; 4], \Phi(x) \in [3; 4]$

Or par définition, $U_{n+1} = \Phi(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [3; 4]$ si $U_n \in [3; 4]$

On conclut donc que :

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [3; 4]$

b. $\alpha \in [3; 4], U_n \in [3; 4]$ et

$\forall x \in [3; 4], |\Phi'(x)| \leq \frac{4}{9}$

Donc d'après l'inégalité des accroissements finis on a :

$|\Phi(U_n) - \Phi(\alpha)| \leq \frac{4}{9} |U_n - \alpha|$

Or $\Phi(U_n) = U_{n+1}$ et $\Phi(\alpha) = \alpha$ d'où

$\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{9} |U_n - \alpha|$

Déduction

En partant de l'inégalité précédente, on a :

$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{4}{9} |U_0 - \alpha|$

$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{4}{9} |U_1 - \alpha|$

$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{4}{9} |U_2 - \alpha|$

⋮

$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{4}{9} |U_{n-1} - \alpha|$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités. On obtient après simplification :

$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |U_0 - \alpha|$

$|U_0 - \alpha| = |3 - \alpha|$

$3 \leq \alpha \leq 4 \Rightarrow -1 \leq 3 - \alpha \leq 0$

$\Rightarrow |U_0 - \alpha| \leq 1$

$\Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n \times 1$

On en déduit que :

$\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{4}{9} < 1$

On en déduit que la suite (U_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

d. $\left(\frac{4}{9}\right)^n \leq 10^{-2} \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-2}$

Or $\left(\frac{4}{9}\right)^n \leq 10^{-2} \Leftrightarrow -n \ln \frac{9}{4} \leq -2 \ln 10$

$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 10}{\ln 3 - \ln 2}$

$\Leftrightarrow n \geq 5,67$

Donc $|U_n - \alpha| \leq 10^{-2}, \forall n \geq 6$

Le plus petit entier cherché est 6

PROBLEME 3

$$f(x) = \sqrt{x} \cdot e^{-x}; D_f = [0; +\infty[$$

PARTIE A

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} \times e^{-x} = +\infty \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty \\ e^0 = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = +\infty$$

Alors f n'est pas dérivable en 0

Conclusion

La courbe (C) admet à l'origine O du repère une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

$$2. \forall x > 0, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{-x} - \sqrt{x} \cdot e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{\sqrt{x} \cdot e^{-x}}{2x} - \frac{2x\sqrt{x} \cdot e^{-x}}{2x}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1-2x}{2x}\right) \sqrt{x} \cdot e^{-x}$$

On conclut donc que :
 $\forall x > 0, f'(x) = \left(\frac{1-2x}{2x}\right) \times f(x)$

$\forall x \in]0; +\infty[, 2x > 0$ et $f(x) > 0$
 Le signe dépend de celui de $1 - 2x$
 Par conséquent :

$$\forall x \in]0; \frac{1}{2}], f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]\frac{1}{2}; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; \frac{1}{2}[$, f est croissante

Sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$, f est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|---|---------------|-----------|
| x | 0 | $\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | | | |


$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \times \frac{x}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \end{cases}$

On conclut donc que : La courbe (C) de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

4. Tracer de (C)



5.

a. $\mathcal{V}(\lambda) = uv \times \int_0^\lambda f^2(x) dx$

$$\int_0^\lambda f^2(x) dx = \int_0^\lambda x e^{-2x} dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{cases}$$

$$\int_0^\lambda f^2(x) dx = \left[-\frac{1}{2} x e^{-2x} \right]_0^\lambda +$$

$$\int_0^\lambda \frac{1}{2} e^{-2x} dx$$

$$\int_0^\lambda f^2(x) dx = \left[\left(-\frac{1}{2} x - \frac{1}{4}\right) e^{-2x} \right]_0^\lambda$$

$$\int_0^\lambda f^2(x) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} (2\lambda + 1) e^{-2\lambda}$$

$$uv = 64 \text{ cm}^3$$

$$\mathcal{V}(\lambda) = 16 [1 - (2\lambda + 1) e^{-2\lambda}] \text{ cm}^3$$

b. $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{V}(\lambda) = 16$

Car $\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} 2\lambda e^{-2\lambda} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2\lambda} = 0 \end{cases}$

PARTIE B

1. $g(x) = \ln x + 2x$

a. $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = x$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} \cdot e^{-x} = x$$

$$\Leftrightarrow x \cdot e^{-2x} = x^2$$

$$\Leftrightarrow e^{-2x} = x$$

$$\Leftrightarrow -2x = \ln x$$

$$\Leftrightarrow \ln x + 2x = 0$$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$

b. $g'(x) = 2 + \frac{1}{x} > 0 \forall x \in]0; +\infty[$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, g est croissante

Tableau de variation de g

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | + |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

Déduction

Sur $]0; +\infty[$, g est continue car dérivable et est strictement croissante

Alors g réalise une bijection de

$]0; +\infty[$ sur $] -\infty; +\infty[$ et

$0 \in] -\infty; +\infty[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$

c. $\begin{cases} g(0,4) = -0,12 < 0 \\ g(0,5) = 0,30 > 0 \end{cases}$

On a : $g(0,4) \times g(0,5) < 0$
Alors $\alpha \in [0,4; 0,5]$

2. α étant aussi solution de l'équation $f(x) = x$, alors α est l'abscisse du point d'intersection de (\mathcal{C}) et la droite d'équation $y = x$

3.

a. Sur $[0,4; 0,5]$, f est croissante

Par conséquent :

$$\forall x \in [0,4; 0,5],$$

$$f(0,4) \leq f(x) \leq f(0,5)$$

$$\Leftrightarrow 0,42 \leq f(x) \leq 0,43$$

$$\text{Or } [0,42; 0,43] \subset [0,4; 0,5]$$

D'où $\forall x \in [0,4; 0,5], f(x) \in [0,4; 0,5]$

b. $f'(x) = \left(\frac{1-2x}{2x}\right) \times f(x)$

$$\forall x \in [0,4; 0,5], \frac{4}{5} \leq 2x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 1 - 2x \leq \frac{1}{5} \text{ et } 1 \leq \frac{1}{2x} \leq \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{1-2x}{2x} \leq \frac{1}{4} \text{ et } 0,4 \leq f(x) \leq 0,5$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \left(\frac{1-2x}{2x}\right) \times f(x) \leq \frac{1}{8}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq |f'(x)| \leq \frac{1}{8}$$

Donc $\forall x \in [0,4; 0,5], |f'(x)| \leq \frac{1}{8}$

4. $\begin{cases} U_0 = 0,4 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$

a. $U_0 = 0,4 \in [0,4; 0,5]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que

$U_n \in [0,4; 0,5]$ et montrons que

$U_{n+1} \in [0,4; 0,5]$

$U_n \in [0,4; 0,5] \Rightarrow f(U_n) \in [0,4; 0,5]$

Car d'après 3a),

$\forall x \in [0,4; 0,5], f(x) \in [0,4; 0,5]$

Or par définition, $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [0,4; 0,5]$ si

$U_n \in [0,4; 0,5]$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [0,4; 0,5]$$

b. $\alpha \in [0,4; 0,5]; U_n \in [0,4; 0,5]$ et

$$\forall x \in [0,4; 0,5], |f'(x)| \leq \frac{1}{8}$$

Donc d'après l'inégalité des accroissements finis on a :

$$|f(U_n) - f(\alpha)| \leq \frac{4}{9} |U_n - \alpha|$$

Or $f(U_n) = U_{n+1}$ et $f(\alpha) = \alpha$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{8} |U_n - \alpha|$$

c. En partant de l'inégalité précédente, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{8} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{8} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{8} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{8} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités. On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{8}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |0,4 - \alpha|$$

$$0,4 \leq \alpha \leq 0,5 \Rightarrow -0,1 \leq 0,4 - \alpha \leq 0$$

$$\Rightarrow |U_0 - \alpha| \leq 0,1$$

$$\Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{8}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{8}\right)^n \times 0,1$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq 0,1 \times \left(\frac{1}{8}\right)^n$$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{8}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{1}{8} < 1$
On en déduit que la suite (U_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

5. $0,1 \times \left(\frac{1}{8}\right)^n \leq 10^{-5}$
 $\Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-5}$
 Or $0,1 \times \left(\frac{1}{8}\right)^n \leq 10^{-5}$
 $\Leftrightarrow -3n \ln 2 \leq -4 \ln 10$
 $\Leftrightarrow n \geq \frac{4 \ln 10}{3 \ln 2}$
 $\Leftrightarrow n \geq 4,42$
 Donc $|U_n - \alpha| \leq 10^{-5}, \forall n \geq 5$
L'entier cherché est $n_0 = 5$

PARTIE C

$$F(x) = \int_0^x \sqrt{t} \cdot e^{-t} dt; D_F = [0; +\infty[$$

1. F est la primitive de f qui s'annule en 0.

Par conséquent :

$$F'(x) = f(x) = \sqrt{x} \cdot e^{-x}$$

Déduction

$\forall x \in [0; +\infty[, f(x) \geq 0 \Leftrightarrow F'(x) \geq 0$
 On en déduit que F est croissante

2.

a. $\forall t \geq 0, \left(\sqrt{t} - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$

$$\Leftrightarrow t - \sqrt{t} + \frac{1}{4} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{t} \leq t + \frac{1}{4}$$

$$\text{Donc } \forall t \geq 0, \sqrt{t} \leq t + \frac{1}{4}$$

b. $\forall t \geq 0, \sqrt{t} \leq t + \frac{1}{4}$

$$\Leftrightarrow \sqrt{t} \cdot e^{-t} \leq \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x \sqrt{t} \cdot e^{-t} dt \leq \int_0^x \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t} dt$$

Donc $\forall t \geq 0,$

$$F(x) \leq \int_0^x \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t} dt$$

c. **Intégration par parties**

$$\begin{cases} u(t) = t + \frac{1}{4} \\ v'(t) = e^{-t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = -e^{-t} \end{cases}$$

$$\int_0^x \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t} dt$$

$$= \left[-\left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t}\right]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt$$

$$\int_0^x \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t} dt = \left[-\left(t + \frac{5}{4}\right) e^{-t}\right]_0^x$$

$$\int_0^x \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t} dt = \frac{5}{4} - \left(x + \frac{5}{4}\right) e^{-x}$$

d. $\forall x \geq 0, x + \frac{5}{4} \geq 0$ et $e^{-x} \geq 0$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{5}{4}\right) e^{-x} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -\left(x + \frac{5}{4}\right) e^{-x} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{4} - \left(x + \frac{5}{4}\right) e^{-x} \leq \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow F(x) \leq \int_0^x \left(t + \frac{1}{4}\right) e^{-t} dt \leq \frac{5}{4}$$

$$\text{Donc } \forall x \geq 0, F(x) \leq \frac{5}{4}$$

PROBLEME 4

PARTIE A

$$\begin{cases} f(x) = x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$$D_f =]0; +\infty[$$

1.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x+2) - x \ln x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Alors f est continue en 0

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+2) - \ln x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = +\infty$$

Car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

Alors f n'est pas dérivable en 0

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)$

Posons $X = \frac{2}{x}$ ($x > 0$)

Si $x \rightarrow +\infty$, alors $X \rightarrow 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} \ln(1+X) = \lim_{X \rightarrow 0} 2 \frac{\ln(1+X)}{X} = 2$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2.

a. $\forall x \in]0; +\infty[$,

$$f'(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - x \times \frac{-2}{x^2} \times \frac{x}{x+2}$$

$$\text{On a donc } f'(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - \frac{2}{x+2}$$

D'autres parts :

$$f''(x) = \frac{-2}{x(x+2)} + \frac{2}{(x+2)^2}$$

$$f''(x) = \frac{-4}{x(x+2)^2}$$

b. $\forall x \in]0; +\infty[$, $f''(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, f' est strictement décroissante

Tableau de variation de f'

| | | |
|----------|---|--------------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | | - |
| $f'(x)$ | | \searrow 0 |

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - \frac{2}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+2} = 0 \end{cases}$

Déduction

D'après le tableau de variation de f' ,
 $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$

c. Tableau de variation de f

Sur $]0; +\infty[$, f est croissante


| | | |
|---------|---|--------------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + |
| $f(x)$ | | \nearrow 2 |

3. A l'origine O du repère la courbe (C) admet une demi tangente verticale dirigée vers le haut

Au point A d'abscisse 2,

$$(T): y = \left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right)x + 1$$

Au voisinage de $+\infty$, (C) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 2$



4.

a. $\forall x \in]0; +\infty[$, $f(x) = x$

$$\Leftrightarrow x \left(\ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - 1 \right) = 0 \text{ et } x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+2}{x} = e$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{e-1}$$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[$,

$$f(x) = x \Leftrightarrow x = \frac{2}{e-1}$$

- b. La courbe (\mathcal{C}') de la réciproque f^{-1} de f et la courbe (\mathcal{C}) sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ (Voir figure)

PARTIE B

1. $\mathcal{A}(\alpha) = \int_{\alpha}^2 f(x) dx = \int_{\alpha}^2 x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) dx$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) \\ v'(x) = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{-2}{x(x+2)} \\ v'(x) = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$$

$$\mathcal{A}(\alpha) = \left[\frac{1}{2}x^2 \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) \right]_{\alpha}^2 + \int_{\alpha}^2 \frac{x}{x+2} dx$$

$$\mathcal{A}(\alpha) = \left[\frac{1}{2}x^2 \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) + x - 2 \ln(x+2) \right]_{\alpha}^2$$

Car $\frac{x}{x+2} = 1 - \frac{2}{x+2}$

On a donc :

$$\mathcal{A}(\alpha) = 2 - 2 \ln 2 - \frac{1}{2}\alpha^2 \ln\left(\frac{\alpha+2}{\alpha}\right) - \alpha + 2 \ln(\alpha+2)$$

2.
$$\begin{cases} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \alpha^2 \ln\left(\frac{\alpha+2}{\alpha}\right) = 0 \\ \lim_{\alpha \rightarrow 0} \alpha = 0 \end{cases}$$

Alors $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \mathcal{A}(\alpha) = 2$

Interprétation graphique

$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \mathcal{A}(\alpha) = 2$ est l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe (\mathcal{C}), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$

PARTIE C

$$u(x) = \frac{2x}{x+2}; D_u =]0; +\infty[$$

(P): $g(x) - xg'(x) = u(x)$

1. $f(x) - xf'(x)$

$$= x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - x \left(\ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - \frac{2}{x+2} \right)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - xf'(x)$$

$$= x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) - x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) + \frac{2x}{x+2}$$

$$\Leftrightarrow f(x) - xf'(x) = \frac{2x}{x+2} = u(x)$$

On en déduit que :
 f possède la propriété (P)

2. $G(x) = \frac{g(x)}{x}; D_g = D_G =]0; +\infty[$

Supposons que g possède la propriété (P)

On a : $\forall x \in]0; +\infty[$,

$$g(x) - xg'(x) = u(x)$$

$$\Rightarrow xG(x) - x(xG(x))' = u(x)$$

$$\Rightarrow xG(x) - xG(x) - x^2G'(x) = u(x)$$

$$\Rightarrow G'(x) = -\frac{u(x)}{x^2}$$

$$\Rightarrow G'(x) = -\frac{2}{x(x+2)} = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$$

Alors $G'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$ si g possède la propriété (P)

Réciproquement :

Supposons que $\forall x \in]0; +\infty[$,

$$G'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$$

On a : $\left(\frac{g(x)}{x}\right)' = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$

$$\Rightarrow -\frac{1}{x^2}g(x) + \frac{1}{x}g'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow g(x) - xg'(x) = -\frac{x^2}{x+2} + x$$

$$\Rightarrow g(x) - xg'(x) = \frac{2x}{x+2} = u(x)$$

Alors g possède la propriété (P)

si $G'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$

On vient ainsi de montrer que : g possède la propriété (P) si et seulement si : pour tout x appartenant à $]0; +\infty[$,

$$G'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$$

3. Déduction

$\forall x \in]0; +\infty[$,

$$G'(x) = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$$

$$\Leftrightarrow G(x) = \ln(x+2) - \ln x + K;$$

$K \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow G(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) + K; K \in \mathbb{R}$$

Or $g(x) = xG(x)$

On en déduit que :

$$g(x) = x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) + Kx; K \in \mathbb{R}$$

Les éléments de (\mathbb{E}) sont les fonctions G définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = x \ln\left(\frac{x+2}{x}\right) + Kx; K \in \mathbb{R}$$

PROBLEME 5

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{e^x+1}; D_f = \mathbb{R} \text{ et}$$

$$U_n = \int_0^1 f_n(x) dx$$

PARTIE A

Étude de la fonction f_n

1. On suppose $n = 0$

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_0(x) = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x+1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_0(x) = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

b. $f_0'(x) = -\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_0'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , f_0 est strictement décroissante

Tableau de variation de f_0

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f_0'(x)$ | - | |
| $f_0(x)$ | 1 | 0 |

c. $I(0; \frac{1}{2})$

$$f_0(2 \times 0 - x) + f_0(x)$$

$$= f_0(-x) + f_0(x)$$

$$= \frac{1}{e^{-x}+1} + \frac{1}{e^x+1}$$

$$= \frac{e^x}{1+e^x} + \frac{1}{e^x+1}$$


$$= \frac{e^x+1}{e^x+1} = 1$$

$$f_0(2 \times 0 - x) + f_0(x) = 2 \times \frac{1}{2}$$

Alors $I(0; \frac{1}{2})$ est un centre de symétrie de (C_0)

d. Traçons (C_0)

Tangente en $I(0; \frac{1}{2})$



2. On suppose que $n \geq 1$

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-(n+1)x}}{1+e^{-x}} = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-(n+1)x} = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-nx}}{1+e^x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = +\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-nx} = +\infty \end{cases}$

b. Les fonctions $x \mapsto e^{-nx}$ et

$x \mapsto e^x + 1$ sont dérivables sur \mathbb{R} et comme $\forall x \in \mathbb{R}, e^x + 1 \neq 0$ alors

$f_n: x \mapsto \frac{e^{-nx}}{e^x+1}$ est dérivable sur \mathbb{R}

$$f_n'(x) = \frac{-ne^{-nx}(e^x+1) - e^{-(n-1)x}}{(e^x+1)^2} = \frac{-e^{-nx}(ne^x+n+e^x)}{(e^x+1)^2}$$

On conclut donc que : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f_n'(x) = \frac{-e^{-nx}(n+(n+1)e^x)}{(e^x+1)^2}$$

c. $\forall x \in \mathbb{R}, e^{-nx} > 0; (e^x + 1)^2 > 0$ et $\forall n \geq 1, (n + (n + 1)e^x) > 0$ et par suite $\forall x \in \mathbb{R}, f_n'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , f_n est strictement décroissante

Tableau de variation

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f_n'(x)$ | - | |
| $f_n(x)$ | $+\infty$ | 0 |

d. $f_n(0) = \frac{1}{2}$

Alors le point $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$ appartient à toutes les courbes (C_n)

e. Traçons (C_1) dans le même repère que (C_0)

Tangente en $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$

$$(T): y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$$

3. Interprétation graphique

U_n est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_n) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

$$U_0 = \int_0^1 f_0(x) dx = \int_0^1 \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx$$

$$U_0 = [-\ln(1+e^{-x})]_0^1$$

$$\text{Donc on a : } U_0 = \ln\left(\frac{2e}{e+1}\right)$$

PARTIE B

Étude de la suite (U_n)

1. Étude d'une suite auxiliaire (V_n)

Pour tout n , on pose $V_n = \int_0^1 e^{-nx} dx$

a. $V_n = \left[-\frac{1}{n}e^{-nx}\right]_0^1$

$$V_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n}e^{-n}$$

b. $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} = 0 \end{cases}$

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$$

$$nV_n = 1 - e^{-n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (nV_n) = 1 \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} = 0$$

2. Comparaison de (U_n) à (V_n)

a. $\forall x \in [0; 1], 1 \leq e^x \leq e$

$$\Leftrightarrow 2 \leq e^x + 1 \leq e + 1 \text{ et}$$

$$e^x + 1 \leq 2e^x \leq e^x + e$$

On conclut donc que :

$$\forall x \in [0; 1], 2 \leq e^x + 1 \leq 2e^x$$

b. Déduction

$$2 \leq e^x + 1 \leq 2e^x$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{-x}}{2} \leq \frac{1}{e^x + 1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{-(n+1)x}}{2} \leq \frac{e^{-nx}}{e^x + 1} \leq \frac{e^{-nx}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-(n+1)x} dx \leq \int_0^1 f_n(x) dx$$

$$\leq \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-nx} dx$$

On en déduit que :

$$\forall n \geq 1, \frac{1}{2}V_{n+1} \leq U_n \leq \frac{1}{2}V_n$$

c. $\forall n \geq 1, \frac{1}{2}V_{n+1} \leq U_n \leq \frac{1}{2}V_n$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_{n+1} = 0$$

$$\text{D'où } 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \leq 0$$

On conclut donc que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

D'autres parts :

$$\forall n \geq 1, \frac{1}{2}(nV_{n+1}) \leq nU_n \leq \frac{1}{2}(nV_n)$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} (nV_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (nV_{n+1}) = 1$$

$$\text{D'où } \frac{1}{2} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (nU_n) \leq \frac{1}{2}$$

On conclut donc que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (nU_n) = \frac{1}{2}$$

3. Étude d'une suite associée à (U_n)

On pose : $S_n = \sum_{p=1}^n U_p$ et

$$t_n = \sum_{p=1}^n V_p$$

a. $\forall p \geq 1, \frac{1}{p} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{e^{-p}}{p} \leq e^{-p}$

Par conséquent :

$$0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq \sum_{p=1}^n e^{-p}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq e^{-1} \times \left(\frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}}\right)$$

$$\text{Or } \forall n \geq 1, 1 - e^{-n} \leq 1$$

$$\text{D'où } 0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq \frac{e^{-1}}{1-e^{-1}} \times 1$$

On a donc :

$$0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq \frac{1}{e-1}$$

b. $\forall t \in [p; p+1], \frac{1}{p+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{p}$

D'où d'après l'inégalité de la moyenne on a :

$$\frac{1}{p+1}(p+1-p) \leq \int_p^{p+1} \frac{dt}{t} \leq$$

$$\frac{1}{p}(p+1-p)$$

$$\text{Alors on a : } \frac{1}{p+1} \leq \int_p^{p+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{p}$$

Par la suite on a :

$$\frac{1}{p+1} \leq [\ln t]_p^{p+1} \leq \frac{1}{p}$$

$$\text{Soit } \frac{1}{p+1} \leq \ln(p+1) - \ln p \leq \frac{1}{p}$$

c. Dédution

$$\sum_{p=1}^n \frac{1}{p+1} \leq \sum_{p=1}^n \ln(p+1) - \ln p \leq$$

$$\sum_{p=1}^n \frac{1}{p}$$

$$\sum_{p=1}^n \frac{1}{p+1} \leq \ln(n+1) \leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{p}$$

Ou encore

$$\sum_{p=1}^{n-1} \frac{1}{p+1} \leq \ln n \leq \sum_{p=1}^{n-1} \frac{1}{p}$$

$$\text{Or } \sum_{p=1}^{n-1} \frac{1}{p+1} = -1 + \sum_{p=1}^n \frac{1}{p}$$

On en déduit que :

$$\sum_{p=1}^n \frac{1}{p} \leq \ln n + 1 \text{ et}$$

$$\ln(n+1) \leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{p}$$

D'où on a :

$$\ln(n+1) \leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{p} \leq \ln n + 1$$

d. $t_n = \sum_{p=1}^n V_p = \sum_{p=1}^n \int_0^1 e^{-px} dx$

$$t_n = \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{p} - \frac{e^{-p}}{p} \right)$$

$$t_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{p} - \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p}$$

$$\text{Or } 0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq \frac{1}{e-1} \text{ et}$$

$$\ln(n+1) \leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{p} \leq \ln n + 1$$

D'où on a :

$$\ln(n+1) - \frac{1}{e-1} \leq t_n \leq \ln n + 1$$

En passant à la limite, on a :

$$+\infty \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} t_n \leq +\infty$$

$$\text{car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = +\infty$$

Par ailleurs : $\forall n > 1,$

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} - \frac{1}{e-1} \times \frac{1}{\ln n} \leq \frac{t_n}{\ln n} \leq 1 + \frac{1}{\ln n}$$

En passant à la limite, on a :

$$1 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{t_n}{\ln n} \leq 1$$

Car

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{\ln n} \times \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n = +\infty \end{array} \right.$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{t_n}{\ln n} = 1$$

e. $\forall p \geq 1, \frac{1}{2}V_{p+1} \leq U_p \leq \frac{1}{2}V_p$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(t_{n+1} - V_1) \leq S_n \leq \frac{1}{2}t_n$$

On en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{\ln n} = \frac{1}{2}$$

PROBLEME 6

PARTIE A

$$g(x) = (2x+1)e^{-2x} + 1; D_g = \mathbb{R}$$

1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x} = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2xe^{-2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \end{cases}$$

2. $g'(x) = -4xe^{-2x}$

$$\forall x \in]-\infty; 0[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, g'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[$, g est croissante

Sur $]0; +\infty[$, g est décroissante

Tableau de variations de g

| | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ |
| $g(x)$ | $-\infty$ | 2 | 1 |

3. Sur $]-\infty; 0[$, g est continue car

dérivable et est strictement

croissante. Alors g réalise une

bijection de $]-\infty; 0[$ sur $]-\infty; 2[$ et

$0 \in]-\infty; 2[$ donc l'équation $g(x) = 0$

admet une unique solution

$$\alpha \in]-\infty; 0[$$

Sur $]0; +\infty[$, $g(x) \in]1; 2]$ donc on a

$$g(x) \neq 0$$

Montrons que $-1 < \alpha < 0$

$$\begin{cases} g(-1) = 1 - e^2 < 0; \\ g(0) = 2 > 0 \end{cases};$$

On a : $g(-1) \times g(0) < 0$

Alors $-1 < \alpha < 0$

4. Signe de $g(x)$

$$\forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) < 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) > 0$$

PARTIE B

$$f(x) = (1+x)e^{-2x} + 1 - x; D_f = \mathbb{R}$$

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x}(1+x+e^{2x}-xe^{2x})$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} 1+x = -\infty \end{array} \right.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 1-x = -\infty \end{array} \right.$

2. $(\Delta): y = -x + 1$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)e^{-2x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = 0$$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-2x} = 0 \end{array} \right.$

Alors la droite $(\Delta): y = -x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C) en $+\infty$

Position de (C) par rapport à (Δ)

$$\forall x \in]-\infty; -1[, f(x) - y < 0$$

$$\forall x \in]-1; +\infty[, f(x) - y > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; -1[$, (C) est en dessous de (Δ)

Sur $]-1; +\infty[$, (C) est au dessus de (Δ)

3. $f'(x) = e^{-2x} - 2(1+x)e^{-2x} - 1$
 $\Leftrightarrow f'(x) = -[(2x+1)e^{-2x} + 1]$

Don on a : $f'(x) = -g(x)$

Déduction

D'après PARTIE A on a :

$$\forall x \in]-\infty; \alpha[, f'(x) > 0$$


$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; \alpha[$, f est croissante

Sur $]\alpha; +\infty[$, f est décroissante

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|--|----------|-----------|
| x | $-\infty$ | α | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | $f(\alpha)$  | | |

4. Sur $[0; +\infty[$, f est continue car dérivable et est strictement décroissante. Alors f réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $]-\infty; 2]$ et $0 \in]-\infty; 2]$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet sur $[0; +\infty[$ une solution et une seule β .

Justification de l'encadrement

$$\begin{cases} f(1) = 0,27 > 0 \\ f\left(\frac{3}{2}\right) = -0,37 < 0 \end{cases}$$

On a : $f(1) \times f\left(\frac{3}{2}\right) < 0$
Alors $1 \leq \beta \leq \frac{3}{2}$


5. $f(-\beta) = (1-\beta)e^{2\beta} + 1 + \beta$
 $\Leftrightarrow f(-\beta) = e^{2\beta}[1-\beta + (1+\beta)e^{-2\beta}]$
 $\Leftrightarrow f(-\beta) = e^{2\beta}f(\beta)$
 Or $f(\beta) = 0$

D'où on a : $f(-\beta) = 0$

Déduction

On en déduit que $-\beta$ est solution de l'équation $f(x) = 0$ sur $\left[-\frac{3}{2}; -1\right]$

6. Traçons (Δ) et (C)



PARTIE C

$t > -1$

1. Voir figure

2. $\mathcal{A}(t) = ua \times \int_{-1}^t (f(x) - y) dx$

$\int_{-1}^t (f(x) - y) dx = \int_{-1}^t (1 + x)e^{-2x} dx$

Intégration par parties

$\begin{cases} u(x) = 1 + x \\ v'(x) = e^{-2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} \end{cases}$

$\int_{-1}^t (f(x) - y) dx$

$= \left[-\frac{1}{2}(1 + x)e^{-2x} \right]_{-1}^t + \int_{-1}^t \frac{1}{2}e^{-2x} dx$

$= \left[\left(-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \right) e^{-2x} \right]_{-1}^t$

$\int_{-1}^t (f(x) - y) dx = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}(2t + 3)e^{-2t}$

$ua = 4cm^2$

$\mathcal{A}(t) = [e^2 - (2t + 3)e^{-2t}] cm^2$

3. $\begin{cases} \lim_{t \rightarrow +\infty} 2te^{-2t} = 0 \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-2t} = 0 \end{cases}$

Alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(t) = e^2$

PARTIE D

$h(x) = (1 + x)e^{-2x} + 1;$

$D_h = I = \left[1; \frac{3}{2} \right]$

1. $h(x) = x$

$\Leftrightarrow (1 + x)e^{-2x} + 1 = x$

$\Leftrightarrow (1 + x)e^{-2x} + 1 - x = 0$

$\Leftrightarrow f(x) = 0$

Déduction

β étant l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$ sur $\left[1; \frac{3}{2} \right]$ donc β est aussi l'unique solution de l'équation $h(x) = x$.

2. $h'(x) = -(2x + 1)e^{-2x}$

$\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], h'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $\left[1; \frac{3}{2} \right], h$ est décroissante

| | | |
|---------|------|---------------|
| x | 1 | $\frac{3}{2}$ |
| $h'(x)$ | - | |
| $h(x)$ | 1,27 | 1,12 |

Déduction

$\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], 1,12 \leq h(x) \leq 1,27$

Or $[1,12 ; 1,27] \subset \left[1; \frac{3}{2} \right]$

D'où $\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], h(x) \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

3. $\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], 2 \leq 2x \leq 3$

$\Leftrightarrow 3 \leq 2x + 1 \leq 4$ et

$e^{-3} \leq e^{-2x} \leq e^{-2}$

$\Leftrightarrow 3e^{-3} \leq (2x + 1)e^{-2x} \leq 4e^{-2}$

$\Leftrightarrow -4e^{-2} \leq h'(x) \leq -3e^{-3}$

$\Leftrightarrow 3e^{-3} \leq |h'(x)| \leq 4e^{-2}$

Donc $\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], |h'(x)| \leq \frac{4}{e^2}$

Déduction

$\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], |h'(x)| \leq \frac{4}{e^2}$

D'après l'inégalité de la moyenne

On a :

$\left| \int_{\beta}^x h'(t) dt \right| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$

$\Leftrightarrow |[h(t)]_{\beta}^x| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$

$\Leftrightarrow |h(x) - h(\beta)| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$

$\Leftrightarrow |h(x) - h(\beta)| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$

Or $h(\beta) = \beta$ d'après PARTIE D1.

D'où $\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right],$

$|h(x) - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$

4. $U_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = h(U_n)$

a. $U_0 = 1 \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons $U_n \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$ et

montrons que $U_{n+1} \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

$U_n \in \left[1; \frac{3}{2} \right] \Rightarrow h(U_n) \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

Car $\forall x \in \left[1; \frac{3}{2} \right], h(x) \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

Or par définition $U_{n+1} = h(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$ si $U_n \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

On conclut donc que :

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$

b. On sait que :

$$\forall x \in \left[1; \frac{3}{2}\right], |h(x) - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$$

Prenons $x = U_n$ on a :

$$|h(U_n) - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_n - \beta|$$

Par définition $U_{n+1} = h(U_n)$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|U_{n+1} - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_n - \beta|$$

c. En partant de l'inégalité précédente, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_0 - \beta|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_1 - \beta|$$

$$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_2 - \beta|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_{n-1} - \beta|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités. On obtient après simplification :

$$|U_n - \beta| \leq \left(\frac{4}{e^2}\right)^n |U_0 - \beta|$$

$$|U_0 - \beta| = |1 - \beta|$$

$$1 \leq \beta \leq \frac{3}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq 1 - \alpha \leq 0$$

$$\Rightarrow |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2} \leq 1$$

$$\Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{e^2}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left[\left(\frac{2}{e}\right)^2\right]^n$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^{2n}$$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e}\right)^{2n} = 0$ car $0 < \frac{2}{e} < 1$

On en déduit que la suite (U_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \beta$

e. On sait que :

$$\left(\frac{2}{e}\right)^{2n} \leq 10^{-3} \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-3}$$

Or $\left(\frac{2}{e}\right)^{2n} \leq 10^{-3}$

$$\Leftrightarrow -2n(1 - \ln 2) \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{3 \ln 10}{2(1 - \ln 2)}$$

$$\Leftrightarrow n \geq 11,25$$

Donc on a : $|U_n - \alpha| \leq 10^{-3} \forall n \geq 12$

C'est à partir de $n = 12$ que l'on est sûr que U_n représente une valeur approchée de β à 10^{-3} près?

PROBLEME 7

$$g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1+x^2}{3x^2-1}$$

PARTIE A

1. $D_g = \left[0; \frac{\sqrt{3}}{3}\right[\cup \left]\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty\right[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^-} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^+} g(x) = +\infty$$

$$g'(x) = -\frac{8x}{(3x^2-1)^2}$$

$$\forall x \in D_g, (3x^2 - 1)^2 > 0 \text{ et } -8x \leq 0$$

Par conséquent :


$$\forall x \in D_g, g'(x) \leq 0$$

On en déduit que :

Sur D_g , g est décroissante

| | | | |
|---------|----|----------------------|---------------|
| x | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | - | | - |
| $g(x)$ | -1 | | $+\infty$ |
| | ↘ | | ↘ |
| | | | $\frac{1}{3}$ |

2. Tracer des courbes de g et de \ln



3. $h(x) = \ln x - g(x)$

$$D_h =]0; \frac{\sqrt{3}}{3} [\cup] \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty [$$

$$h'(x) = \frac{1}{x} + \frac{8x}{(3x^2-1)^2} > 0 \forall x \in D_h$$

On en déduit que :

Sur D_h , h est strictement croissante
Des limites des fonctions g et \ln , on déduit :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} h(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^-} h(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^+} h(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= +\infty \end{aligned}$$

Tableau de variation de h

| | | | |
|---------|-----------|----------------------|-----------|
| x | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | | + | + |
| $h(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ |

Sur chacun des intervalles $]0; \frac{\sqrt{3}}{3} [$ et $] \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty [$, h est dérivable donc continue et est strictement croissante sur chacun de ces intervalles.

Alors h réalise une bijection de chacun de ces intervalles sur \mathbb{R} et $0 \in \mathbb{R}$.

Par conséquent l'équation $h(x) = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 telles que :

$$x_1 \in]0; \frac{\sqrt{3}}{3} [\text{ et } x_2 \in] \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty [$$

C'est-à-dire $0 < x_1 < \frac{\sqrt{3}}{3} < x_2$

Montrons que $0 < x_1 < 1 < x_2 < 2$

$$\begin{cases} h(1) = -1 < 0 \\ h(2) = \ln 2 - \frac{5}{11} > 0 \end{cases}$$

On a : $]1; 2[\subset] \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty [$ **et**

$h(1) \times h(2) < 0$, alors $1 < x_2 < 2$

Par conséquent :

$$0 < x_1 < \frac{\sqrt{3}}{3} < 1 < x_2 < 2$$

Donc on a : $0 < x_1 < 1 < x_2 < 2$

Déduction

Signe de $h(x)$

$$\begin{aligned} \forall x \in]0; x_1[, h(x) &< 0 \\ \forall x \in]x_1; \frac{\sqrt{3}}{3} [, h(x) &> 0 \\ \forall x \in] \frac{\sqrt{3}}{3}; x_2[, h(x) &< 0 \\ \forall x \in]x_2; +\infty[, h(x) &> 0 \end{aligned}$$

PARTIE B

$$f(x) = \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2}$$

1. $D_f =]0; +\infty [$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(1+\ln x)(x^2+1)^2 - 4x^2(x^2+1) \ln x}{(x^2+1)^4} \\ &= \frac{x^2+1+(1-3x^2) \ln x}{(x^2+1)^3} = \frac{(1-3x^2)\left(-\frac{x^2+1}{3x^2-1} + \ln x\right)}{(x^2+1)^3} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{(1-3x^2)h(x)}{(x^2+1)^3} \text{ si } x \neq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \times \frac{x^2}{(x^2+1)^2}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \times \frac{1}{(x^2+1)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{(x^2+1)^2} = 1 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \times \frac{1}{(x^2+1)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{(x^2+1)^2} = 1 \end{cases}$

3. $\forall x \in D_f ; (x^2 + 1)^3 > 0$ alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $(1 - 3x^2)h(x)$

$$1 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

D'après PARTIE A, et la règle des signes, on a :

$$\forall x \in]0; x_1[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]x_1; x_2[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]x_2, +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que

Sur $]0; x_1[$, f est décroissante


Sur $]x_1; x_2[$, f est croissante

Sur $]x_2, +\infty[$, f est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|-----------|---|---|
| x | 0 | x_1 | x_2 | $+\infty$ | | |
| $f'(x)$ | | - | 0 | + | 0 | - |
| $f(x)$ | 0 | $f(x_1)$ | $f(x_2)$ | 0 | | |

4. Allure de (Γ)



5. $\forall x \in \mathbb{R}^*; \frac{1}{x} - \frac{x}{(x^2+1)} = \frac{x^2+1-x^2}{x(x^2+1)}$

Soit $\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{(x^2+1)}$

On en déduit que :

$x \mapsto \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x(x^2+1)}$ sur $]0; +\infty[$

6. $\alpha \in]0; 1[, J(\alpha) = \int_{\alpha}^1 \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{x}{(x^2+1)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{x^2+1} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} J(\alpha) &= \left[\frac{-\ln x}{2(x^2+1)} \right]_{\alpha}^1 + \frac{1}{2} \int_{\alpha}^1 \frac{1}{x(x^2+1)^2} dx \\ &= \left[\frac{-\ln x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right) \right]_{\alpha}^1 \\ &= -\frac{\ln 2}{4} + \frac{\ln \alpha}{2(\alpha^2+1)} - \frac{1}{2} \left(\ln \alpha - \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + 1) \right) \end{aligned}$$

$$J(\alpha) = -\frac{\ln 2}{4} + \frac{1}{4} \ln(\alpha^2 + 1) - \frac{\alpha^2 \ln \alpha}{2(\alpha^2+1)}$$

7. $\mathcal{A}(\alpha) = ua \times (-J(\alpha))$

$$ua = 16 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}(\alpha) = \left(4 \ln 2 - 4 \ln(\alpha^2 + 1) + \frac{8\alpha^2 \ln \alpha}{\alpha^2+1} \right) \text{ cm}^2$$

Et on a : $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \mathcal{A}(\alpha) = 4 \ln 2$

Car $\begin{cases} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \alpha^2 = 0 \\ \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \alpha^2 \ln \alpha = 0 \end{cases}$

Cette limite est l'aire en cm^2 du domaine limité par (Γ) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

PROBLEME 8

PARTIE A

$$f(x) = x - 4 + \frac{1}{4} \ln|x|$$

1. $D_f = \mathbb{R}^*$ et pour x élément de \mathbb{R}^*

$$f'(x) = \frac{4x+1}{4x}$$

$$\forall x \in]-\infty; -\frac{1}{4}[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]-\frac{1}{4}; 0[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

$$\text{Sur }]-\infty; -\frac{1}{4}[, f \text{ est croissante}$$

$$\text{Sur }]-\frac{1}{4}; 0[, f \text{ est décroissante}$$

$$\text{Sur }]0; +\infty[, f \text{ est croissante}$$

Tableau de variation de f

| | | | | |
|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $-\frac{1}{4}$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | $+$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\frac{-17-\ln 4}{4}$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - 4 + \frac{1}{4} \ln(-x) \right)$$

Posons $X = -x$;

Si $x \rightarrow -\infty$ alors $X \rightarrow +\infty$ et

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \left(-X - 4 + \frac{1}{4} \ln X \right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} X \left(-1 + \frac{1}{4X} - \frac{1}{4} \frac{\ln X}{X} \right) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0 \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{4X} = 0 \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} X = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - 4 + \frac{1}{4} \ln|x| \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0} \ln|x| = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{1}{4} \frac{\ln x}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \end{cases}$$

2. $\forall x \in]-\infty; 0[; f(x) < 0$

Par ailleurs :

Sur $]0; +\infty[$, f est dérivable donc continue et est strictement croissante.

Alors f réalise une bijection de

$$]0; +\infty[\text{ sur }]-\infty; +\infty[\text{ et}$$

$$0 \in]-\infty; +\infty[$$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet, une solution unique α dans

$$]0; +\infty[$$

$$f(3) = -1 + \frac{1}{4} \ln 3 < 0$$

$$f(4) = \frac{1}{4} \ln 4 > 0$$

$$\text{On a : } f(3) \times f(4) < 0$$

$$\text{D'où } 3 < \alpha < 4$$

3. De tout ce qui précède, on déduit que :

$$\forall x \in]-\infty; 0[; f(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; \alpha[; f(x) < 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[; f(x) > 0$$

PARTIE B

$\forall x \in \mathbb{R}^*$,

$$h(x) = x + 1 - \frac{31}{16} x^2 - \frac{1}{8} x^2 \ln|x| \text{ et}$$

$$h(0) = 1$$

$$D_h = \mathbb{R}$$

1. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1$ car $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln|x| = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0)$$

Alors la fonction h est continue en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{31}{16} x + \frac{1}{8} x \ln|x| .$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x| = 0$$

Alors h est dérivable en 0 et

$$h'(0) = 1$$

2. $h'(x) = 1 - \frac{31}{8} x - \frac{1}{4} x \ln|x| - \frac{1}{8} x$

$$h'(x) = 1 - 4x - \frac{1}{4} x \ln|x|$$

$$\Leftrightarrow h'(x) = x \left(\frac{1}{x} - 4 - \frac{1}{4} \ln|x| \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Or } f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{1}{x} - 4 + \frac{1}{4} \ln\left|\frac{1}{x}\right| \\ &= \frac{1}{x} - 4 - \frac{1}{4} \ln|x| \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in \mathbb{R}^*, h'(x) = x f\left(\frac{1}{x}\right)$

3. On sait que :

$$\frac{1}{x} \in]-\infty; 0[\Leftrightarrow x \in]-\infty; 0[$$

$$\frac{1}{x} \in]0; \alpha[\Leftrightarrow x \in \left] \frac{1}{\alpha}; +\infty[$$

$$\frac{1}{x} \in]\alpha; +\infty[\Leftrightarrow x \in \left] 0; \frac{1}{\alpha} \right[$$

D'après PARTIE A3

$$\forall x \in]-\infty; 0[, x < 0 \text{ et } f\left(\frac{1}{x}\right) < 0$$

$$\forall x \in \left] 0; \frac{1}{\alpha} \right[, x > 0 \text{ et } f\left(\frac{1}{x}\right) < 0$$

$$\forall x \in \left] \frac{1}{\alpha}; +\infty \right[, x > 0 \text{ et } f\left(\frac{1}{x}\right) > 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, h'(x) > 0$$

$$\forall x \in \left] 0; \frac{1}{\alpha} \right[, h'(x) > 0$$

$$\forall x \in \left] \frac{1}{\alpha}; +\infty \right[, h'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $\left] -\infty; \frac{1}{\alpha} \right[$, h est croissante

Sur $\left] \frac{1}{\alpha}; +\infty \right[$, h est décroissante

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 - \frac{31}{16}x^2 - \frac{1}{8}x^2 \ln(-x) \end{aligned}$$

Posons $X = -x$;

Si $x \rightarrow -\infty$ alors $X \rightarrow +\infty$ et

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} -X + 1 - \frac{31}{16}X^2 - \frac{1}{8}X^2 \ln X = -\infty$$

Car $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$

Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{31}{16} - \frac{1}{8} \ln x \right) = -\infty \end{aligned}$$


$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$

Tableau de variation de h

| | | | |
|---------|-----------|----------------------------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $\frac{1}{\alpha}$ | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | + | 0 | - |
| $h(x)$ | $-\infty$ | $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$ | $-\infty$ |

4. $(T_0): y = x + 1$

Tracer de (C_h)



Unité : 2 cm

5.

a. $\mathcal{A}(\lambda) = \int_{\lambda}^1 h(x) dx$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda) &= \int_{\lambda}^1 \left(x + 1 - \frac{31}{16}x^2 \right) dx - \\ &\frac{1}{8} \int_{\lambda}^1 x^2 \ln|x| dx \end{aligned}$$

Calculons $\int_{\lambda}^1 x^2 \ln|x| dx$

Intégration par parties :

$$\left\{ \begin{array}{l} u(x) = \ln|x| \\ v'(x) = x^2 \end{array} \right. \text{ on a : } \left\{ \begin{array}{l} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{1}{3}x^3 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} &\int_{\lambda}^1 x^2 \ln|x| dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \ln|x| \right]_{\lambda}^1 - \int_{\lambda}^1 \frac{1}{3}x^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \ln|x| - \frac{1}{9}x^3 \right]_{\lambda}^1 \\ \mathcal{A}(\lambda) &= \left[\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{91}{144}x^3 - \frac{1}{24}x^3 \ln|x| \right]_{\lambda}^1 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{125}{144} - \frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda + \frac{91}{144}\lambda^3 + \frac{1}{24}\lambda^3 \ln \lambda$$

b. $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda^3 \ln \lambda = 0$

Alors $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \mathcal{A}(\lambda) = \frac{125}{144}$

PARTIE C

1.

a. g est une fonction paire.

$$g'(x) = -\frac{1}{4x} < 0, \forall x > 0$$

Alors g est une fonction décroissante sur $]0; +\infty[$

Tableau de variation de g

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | - |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

On en déduit que :

$$g([3; 4]) = [g(4); g(3)] = [3,65; 3,73]$$

$$\text{Or } [3,65; 3,73] \subset [3; 4]$$

$$\text{D'où } g([3; 4]) \subset [3; 4]$$

b. $g(x) = x$

$$\Leftrightarrow 4 - x - \frac{1}{4} \ln|x| = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 0$$

α étant l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$, alors α est aussi l'unique solution de l'équation $g(x) = x$ car ces deux équations sont équivalentes

a. $U_0 = 3 \in [3; 4]$.

Supposons que $U_n \in [3; 4]$ pour tout entier n puis montrons que

$$U_{n+1} \in [3; 4]$$

En effet :

$$U_n \in [3; 4] \Rightarrow g(U_n) \in [3; 4]$$

$$\text{Car } g([3; 4]) \subset [3; 4]$$

$$\text{Or par définition } U_{n+1} = g(U_n)$$

$$\text{D'où } U_{n+1} \in [3; 4] \text{ si } U_n \in [3; 4]$$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [3; 4]$$

C'est-à-dire $3 \leq U_n \leq 4$ b. $g'(x) = -\frac{1}{4x}$

$$3 \leq x \leq 4 \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \leq g'(x) \leq -\frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{16} \leq |g'(x)| \leq \frac{1}{12}$$

On déduit donc que

$$\forall x \in [3; 4], |g'(x)| \leq \frac{1}{12}$$

On sait que $\alpha \in [3; 4]$

$\forall x \in [3; 4]$, en appliquant l'inégalité des accroissements finis à l'intervalle de bornes $(\alpha; x)$ on a :

$$|g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{1}{12} |x - \alpha|.$$

$$\text{Or } g(\alpha) = \alpha$$

D'où $\forall x \in [3; 4]$,

$$|g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{12} |x - \alpha|$$

c. On sait que $3 \leq U_n \leq 4$.

Donc en faisant $x = U_n$ dans la relation précédente on a :

$$|g(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{12} |U_n - \alpha|$$

$$\text{Or par définition : } U_{n+1} = g(U_n)$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{12} |U_n - \alpha|$$

Dédution :

En partant de l'inégalité précédente, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{12} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{12} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{12} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{12} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |3 - \alpha|$$

$$3 \leq \alpha \leq 4$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq -\alpha \leq -3$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq U_0 - \alpha < 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^n \times 1$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^n$$

d. Comme g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$, $g(\alpha) = \alpha$ et $U_{n+1} = g(U_n)$, on a :

$$\begin{aligned}
 U_n < \alpha &\Rightarrow g(U_n) > \alpha \\
 &\Rightarrow U_{n+1} > \alpha \\
 &\Rightarrow U_n < \alpha < U_{n+1}
 \end{aligned}$$

D'autres parts :

$$\begin{aligned}
 U_n > \alpha &\Rightarrow g(U_n) < \alpha \\
 &\Rightarrow U_{n+1} < \alpha \\
 &\Rightarrow U_{n+1} < \alpha < U_n
 \end{aligned}$$

On conclut donc que :
 α est compris entre deux termes consécutifs de la suite (U_n)

Par ailleurs :

On pourra remarquer que $U_0 < \alpha < U_1$ et montrer alors par récurrence que pour tout entier p :
 $U_{2p} < \alpha < U_{2p+1}$

- e. Il suffit de résoudre $\left(\frac{1}{12}\right)^n \leq \frac{1}{100}$ pour obtenir $|U_n - \alpha| \leq 10^{-2}$

On trouve que le plus petit entier n_0 à partir duquel cette inégalité est vraie est $n_0 = 2$.

D'où l'encadrement :

$$U_2 < \alpha < U_2 + 10^{-2}$$

Une calculatrice fournit $U_2 \approx 3,675$.

On peut donc prendre $\alpha \approx 3,68$ avec la précision 10^{-2} .

PROBLEME 9

PARTIE A

$$f(x) = 2 + \frac{\ln x}{x+1}; D_f = \mathbb{R}_+^*$$

1. $g(x) = 1 + x - x \ln x; D_g = \mathbb{R}_+^*$

a. $g'(x) = -\ln x$

$$\forall x \in]0; 1[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[, g$ est croissante

Sur $]1; +\infty[, g$ est décroissante

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + x(1 - \ln x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

Tableau de variation de g

| | | | |
|---------|---|---|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | + | 0 | - |
| $g(x)$ | 1 | 2 | $-\infty$ |

- b. Sur $]0; 1[, g(x) \neq 0$ car
 $\forall x \in]0; 1[, g(x) \in]1; 2[$
 Sur $]1; +\infty[, g$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.
 Alors g réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur $] -\infty; 2[$ et $0 \in] -\infty; 2[$
 donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique $x_0 \in]1; +\infty[$
- $$\begin{cases}
 g(3,5) = 0,125 > 0 \\
 g(3,6) = -0,008 < 0
 \end{cases}$$

On a : $g(3,5) \times g(3,6) < 0$
Alors $x_0 \in]3,5; 3,6[$

- c. Signe de $g(x)$

$$\forall x \in]0; x_0[, g(x) > 0$$

$$\forall x \in]x_0; +\infty[, g(x) < 0$$

2.

a. $f'(x) = \frac{x+1-x \ln x}{x(x+1)^2} = \frac{g(x)}{x(x+1)^2}$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x(x+1)^2 > 0$$

Alors $f'(x)$ est du même signe que $g(x)$.

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; x_0[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]x_0; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; x_0[$, f est croissante

Sur $]x_0; +\infty[$, f est décroissante

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \end{cases}$

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| x | 0 | x_0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + | 0 - |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $f(x_0)$ | 2 |

$$f(x_0) = 2 + \frac{\ln x_0}{x_0 + 1}$$

$$\text{Or } g(x_0) = 0 \Leftrightarrow \ln x_0 = \frac{x_0 + 1}{x_0}$$

$$\text{D'où } f(x_0) = 2 + \frac{1}{x_0}$$

Encadrement de $f(x_0)$

$$3,5 \leq x_0 \leq 3,6$$

$$\Leftrightarrow 0,27 \leq \frac{1}{x_0} \leq 0,28$$

$$\Leftrightarrow 2,27 < f(x_0) < 2,28$$

b. (D) : $y = 2$

$$f(x) - y = \frac{\ln x}{x+1}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x + 1 > 0$$

Alors le signe de $f(x) - y$ est celui de $\ln x$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[, f(x) - y < 0$$


$$\forall x \in]1; +\infty[, f(x) - y > 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$, (C) est en dessous de (D)

Sur $]1; +\infty[$, (C) est au dessus de (D)

Tracer de (C)



c. $\forall x \in \mathbb{R}^*, F(-x) = F(x)$
Alors F est une fonction paire
D'autre part :

$$\forall x > 0, F(x) = f(x)$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, $(C) = (\Gamma)$

Sur $]-\infty; 0[$, (Γ) est la symétrique de (C) par rapport à l'axe des ordonnées. (Voir figure)

$$(\Gamma) = (C) \cup \mathcal{S}_{(O; j)}((C))$$

PARTIE B

1. $I(t) = \int_1^t \frac{\ln x}{x+1} dx; t \geq 1$

a. $I(t)$ est l'aire en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = t$

b. $J(t) = \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]_1^t$

$$J(t) = \frac{1}{2} (\ln t)^2$$

c. $K(t) = \int_1^t \frac{\ln x}{x^2} dx$

Intégration par parties :

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$K(t) = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^t + \int_1^t \frac{1}{x^2} dx$$

$$K(t) = \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^t$$

$$K(t) = \frac{t-1-\ln t}{t}$$

$$K'(t) = \frac{\ln t}{t^2} \geq 0 \quad \forall t \geq 1$$

On en déduit que :

Sur $[1; +\infty[$, K est croissante

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} K(t) = 1$$

Tableau de variation de K

| | | |
|---------|---|-----------|
| t | 1 | $+\infty$ |
| $K'(t)$ | | + |
| $K(t)$ | 0 | 1 |

On en déduit que :

$$\forall t \geq 1, 0 \leq K(t) \leq 1$$

2. $\forall x \geq 1, \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)} \geq 0$

D'autres parts :

$$x \geq 1 \Leftrightarrow x + 1 \geq x$$

$$\Leftrightarrow x(x + 1) \geq x^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x(x+1)} \leq \frac{1}{x^2}$$

On conclut donc que :

$$\forall x \geq 1, 0 \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{x^2}$$

Déduction :

$$\forall x \geq 1, \ln x \geq 0 \text{ et}$$

$$0 \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{\ln x}{x} - \frac{\ln x}{x+1} \leq \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx - \int_1^t \frac{\ln x}{x+1} dx \leq \int_1^t \frac{\ln x}{x^2} dx$$

Donc on a : $0 \leq J(t) - I(t) \leq K(t)$

3. $0 \leq \frac{1}{2}(\ln t)^2 - I(t) \leq K(t) \leq 1$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{2} - \frac{I(t)}{(\ln t)^2} \leq \frac{1}{(\ln t)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{(\ln t)^2} \leq \frac{I(t)}{(\ln t)^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\ln t)^2} = 0$$

Alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{I(t)}{(\ln t)^2} = \frac{1}{2}$

PARTIE C

1. $h(x) = f(x) - x; D_h = [1; +\infty[$

a. $h'(x) = f'(x) - 1$

$$\forall x \in]x_0; +\infty[, f'(x) < 0 \text{ et donc}$$

$$\forall x \in]x_0; +\infty[, h'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]x_0; +\infty[$, h est décroissante

b. $f''(x) = \frac{(x^3+2x^2+x)g'(x) - (3x^2+4x+1)g(x)}{[x^3+2x^2+x]^2}$

$$\forall x \in [1; x_0]; g'(x) < 0 \text{ et } g(x) \geq 0$$

Donc $(x^3 + 2x^2 + x)g'(x) < 0$ et

$$(3x^2 + 4x + 1)g(x) \geq 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in [1; x_0], f''(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $[1; x_0]$, f' est décroissante

Par conséquent :

$$\forall x \in [1; x_0], f'(x_0) \leq f'(x) \leq f'(1)$$

Alors $0 \leq f'(x) \leq \frac{g(1)}{4}$

c. $\forall x \in [1; x_0]; 0 \leq f'(x) \leq \frac{g(1)}{4}$

$$\Rightarrow 0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 1 \leq f'(x) - 1 \leq -\frac{1}{2} < 0$$

$$\Rightarrow h'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $[1; x_0]$, h décroissante

2.

a. h est dérivable donc continue et strictement décroissante sur $[1; +\infty[$

Elle réalise alors une bijection de $[1; +\infty[$ sur $h([1; +\infty[) =]-\infty; 1]$ et $0 \in]-\infty; 1]$.

D'où l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [1; +\infty[$

$$\begin{cases} h(2) = 0,23 > 0 \\ h(3) = -0,73 < 0 \end{cases}$$

On a : $h(2) \times h(3) < 0$

Alors $2 < \alpha < 3$

$$h(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = x$$

Alors α est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ sur $[1; +\infty[$ et on a : $2 \leq \alpha \leq 3$

b. f est croissante sur $[2 ; 3]$

$$\forall x \in [2 ; 3],$$

$$f(2) \leq f(x) \leq f(3)$$

$$\Leftrightarrow 2,23 \leq f(x) \leq 2,27$$

$$\text{Or } [2,23 ; 2,27] \subset [2 ; 3]$$

$$\text{D'où } 2 \leq f(x) \leq 3$$

$$\text{Donc } \forall x \in [2 ; 3], f(x) \in [2 ; 3]$$

c. $[2 ; 3] \subset [1 ; x_0]$.

Donc f' est décroissante sur $[2 ; 3]$

$$\forall x \in [2 ; 3], f'(3) \leq f'(x) \leq f'(2)$$

$$\Leftrightarrow 0,015 \leq f'(x) \leq 0,09 \leq \frac{1}{9}$$

$$\text{Donc } \forall x \in [2 ; 3], 0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{9}$$

d. $\forall x \in [2 ; 3]$, en appliquant à l'intervalle de bornes $(x ; \alpha)$ l'inégalité des accroissements finis, on a :

$$|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{9}|x - \alpha|$$

$$\text{Or } f(\alpha) = \alpha$$

$$\text{D'où } \forall x \in [2 ; 3],$$

$$|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{9}|x - \alpha|$$

3.

a. $U_0 = 2 \in [2 ; 3]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in [2 ; 3]$

et montrons que $U_{n+1} \in [2 ; 3]$

En effet :

$$U_n \in [2 ; 3] \Rightarrow f(U_n) \in [2 ; 3]$$

Car $\forall x \in [2 ; 3], f(x) \in [2 ; 3]$

Or par définition $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [2 ; 3]$ si $U_n \in [2 ; 3]$

On conclut alors que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [2 ; 3]$$

On sait aussi que :

$$\forall x \in [2 ; 3], |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{9}|x - \alpha|$$

Prenons $x = U_n$

$$\text{On a : } |f(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_n - \alpha|$$

Or par définition $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_n - \alpha|$$

b. En partant de l'inégalité précédente, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_1 - \alpha|$$

$$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |2 - \alpha|$$

$$2 \leq \alpha \leq 3$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq U_0 - \alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n \times 1$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n$$

c. $0 < \frac{1}{9} < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^n = 0$

On en déduit que la suite (U_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

PROBLEME 10

PARTIE A

$$f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}; D_f = [0; +\infty[$$

$$\begin{aligned} 1. f(x) &= \sqrt{x} e^{1-x} \\ &= \frac{\sqrt{x} \times \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \times e \times e^{-x} \\ &= \frac{e}{\sqrt{x}} \times x e^{-x} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{e}{\sqrt{x}} \times \frac{x}{e^x}$$

On a donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{\sqrt{x}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \end{cases}$$

La courbe (C) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$

$$2. \forall x > 0; f'(x) = \frac{(1-2x)}{2\sqrt{x}} e^{1-x}$$

$\forall x \in]0; +\infty[, 2\sqrt{x} > 0$ et $e^{1-x} > 0$
Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $1 - 2x$

$$1 - 2x > 0 \Rightarrow x < \frac{1}{2}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; \frac{1}{2}[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]\frac{1}{2}; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :


Sur $]0; \frac{1}{2}[, f$ est croissante

Sur $]\frac{1}{2}; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|---|----------------------|-----------|
| x | 0 | $\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + | - |
| $f(x)$ | 0 | $\sqrt{\frac{e}{2}}$ | 0 |

3. Tracé de (C) :



4.

a. Voir figure

$$b. \mathcal{V} = uv \times \pi \int_0^1 f^2(x) dx$$

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \int_0^1 x e^{2-2x} dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{2-2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -\frac{1}{2} e^{2-2x} \end{cases}$$

$$\int_0^1 x e^{2-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} x e^{2-2x} \right]_0^1 +$$

$$\int_0^1 \frac{1}{2} e^{2-2x} dx$$

$$\int_0^1 x e^{2-2x} dx = \left[-\frac{1}{4} (2x + 1) e^{2-2x} \right]_0^1$$

$$\int_0^1 x e^{2-2x} dx = \frac{e^2 - 3}{4}$$

$$uv = 8 \text{ cm}^3$$

$$\mathcal{V} = 8\pi \left(\frac{e^2 - 3}{4} \right) \text{ cm}^3 = 2\pi(e^2 - 3) \text{ cm}^3$$

PARTIE B

$$U_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$$

1. U_n est l'aire en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = n$ et $x = n + 1$

2. f est décroissante sur $[1; +\infty[$.

D'où $\forall n \geq 1$ et $\forall t, n \leq t \leq n + 1$

$$\text{On a : } f(n + 1) \leq f(t) \leq f(n)$$

En appliquant l'inégalité de la moyenne sur , on a :

$$f(n + 1)[n + 1 - n] \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n)[n + 1 - n]$$

$$\text{Donc } \forall n \geq 1, f(n + 1) \leq U_n \leq f(n)$$

3. On déduit de cette inégalité que :
 $f(n+2) \leq U_{n+1} \leq f(n+1) \leq U_n \leq f(n)$

**C'est-à-dire $\forall n \geq 1, U_{n+1} \leq U_n$
 Ceci montre que (U_n) est une suite décroissante.**

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
 D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n+1) = 0$

On déduit que (U_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$

PARTIE C

1.
 a. F est l'unique primitive de f s'annulant pour $x = 1$
 b. On en déduit que :

$$\forall x \geq 1, F'(x) = f(x)$$

D'après l'étude de f dans PARTIE A
 $\forall x \in [1; +\infty[, f(x) > 0$
Par conséquent :
 Sur $[1; +\infty[, F$ est croissante

2.
 a. $\forall t \geq 0, (\sqrt{t} - \sqrt{2})^2 \geq 0$
 $\Leftrightarrow t - 2\sqrt{t}\sqrt{2} + 2 \geq 0$

$$\text{Donc } \forall t \geq 0, (t+2) \geq 2\sqrt{2}\sqrt{t}$$

- b. **Déduction**

$$\begin{aligned} \forall t \geq 1, (t+2) &\geq 2\sqrt{2}\sqrt{t} \\ \Leftrightarrow (t+2)e^{1-t} &\geq 2\sqrt{2}\sqrt{t}e^{1-t} \\ \text{D'où } \forall x \geq 1, \\ \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt &\geq 2\sqrt{2} \int_1^x \sqrt{t}e^{1-t} dt \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{2}F(x) &\leq \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\forall x \geq 1, F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt$$

- c. **Intégration par parties**

$$\begin{aligned} \begin{cases} u(t) = t+2 \\ v'(t) = e^{1-t} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{1-t} \end{cases} \\ \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt &= [-(t+2)e^{1-t}]_1^x + \int_1^x e^{1-t} dt \\ &= [-(t+2)e^{1-t} - e^{1-t}]_1^x \\ \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt &= [-(t+3)e^{1-t}]_1^x \\ \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt &= 4 - (x+3)e^{1-x} \end{aligned}$$

Déduction

$$\begin{aligned} \forall x \in [1; +\infty[, (x+3) > 0; e^{1-x} > 0 \\ \Leftrightarrow (x+3)e^{1-x} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow -(x+3)e^{1-x} &\leq 0 \\ \Leftrightarrow 4 - (x+3)e^{1-x} &\leq 4 \\ \Leftrightarrow \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt &\leq 4 \\ \Leftrightarrow F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt &\leq \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \Leftrightarrow F(x) &\leq \sqrt{2} \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \forall t \geq 1, f(t) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \int_1^x f(t) dt &\geq 0 \quad \forall x \geq 1 \\ \Leftrightarrow F(x) &\geq 0 \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\forall x \geq 1, 0 \leq F(x) \leq \sqrt{2}$$

- 3.

a. $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_{n-1}$
 $= \int_1^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt + \dots + \int_{n-1}^n f(t) dt$

D'après la relation de Chasles on a :

$$S_n = \int_1^n f(t) dt$$

- b. $S_n = F(n) \Leftrightarrow 0 \leq S_n \leq \sqrt{2}$
 La suite (S_n) est croissante et bornée.
 On en déduit que (S_n) est convergente
 On sait que : $0 \leq S_n \leq \sqrt{2}$
 D'où en passant à la limite, on a :
 $0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \leq \sqrt{2}$

$$\text{Soit } 0 \leq l \leq \sqrt{2}$$

PROBLEME 11

PARTIE A

$f(x) = e^{-x} \cos x ; D_f = \mathbb{R}$

1. $f'(x) = -e^{-x}(\cos x + \sin x)$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$

Ceci montre bien que $f'(x)$ est du signe de $-(\cos x + \sin x)$


2. $\cos x + \sin x$

$= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right)$

$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos x + \sin \frac{\pi}{4} \sin x \right)$

Donc $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$

$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right], \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \in \left[-\frac{3\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right]$



$\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \leq 0$

$\Leftrightarrow \frac{-3\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} \leq -\frac{\pi}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{-\pi}{2} \leq x \leq -\frac{\pi}{4}$

$\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \geq 0$

$\Leftrightarrow \frac{-\pi}{2} \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{4}$

$\Leftrightarrow \frac{-\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

$f'(x) = -\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$

Par conséquent :

$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{-\pi}{4} \right], f'(x) \geq 0$

$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right], f'(x) \leq 0$

On en déduit que :

Sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{-\pi}{4} \right], f$ est croissante


Sur $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right], f$ est décroissante

3. Tableau de variations

| | | | |
|---------|------------------|--|-----------------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | 0 | $\frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{\pi}{4}}$ | 0 |

Les coefficients directeurs des tangentes :

| | | | | |
|---------|---------------------|------------------|----|-----------------------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ |
| $f'(x)$ | $e^{\frac{\pi}{2}}$ | 0 | -1 | $-e^{-\frac{\pi}{2}}$ |



4.

a. $F'(x) = f(x)$

$\Leftrightarrow [(b - a) \cos x - (b + a) \sin x] e^{-x} = e^{-x} \cos x$

Par identification on a :

$\begin{cases} b - a = 1 \\ b + a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$

$F(x) = \frac{e^{-x}}{2} (-\cos x + \sin x)$

b. $\mathcal{A} = ua \times \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

$\mathcal{A} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

$\mathcal{A} = 25 \left(F \left(\frac{\pi}{2} \right) - F \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) cm^2$

$\mathcal{A} = 25 \times \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}}{2} cm^2$

Ou encore

$\mathcal{A} = 25sh \left(\frac{\pi}{2} \right) cm^2$

PARTIE B

$$1. f\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right] = \left]0; \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}\right[$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[,$$

$$x < 0 < f(x) < \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[, f(x) \neq x$$

D'autres parts :

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow f\left(-\frac{\pi}{2}\right) \neq -\frac{\pi}{2}$$

$$f(0) = 1 \Leftrightarrow f(0) \neq 0$$

On conclut donc que :

$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[, f(x) \neq x$$

C'est-à-dire que sur l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; 0\right]$, il n'existe pas de point d'intersection de (Γ) avec la droite $(\Delta) : y = x$

$$2. \varphi(x) = e^{-x} \cos x - x; D_\varphi = \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$a. \varphi(0) = 1 \text{ et } \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$b. \varphi'(x) = f'(x) - 1$$

$$\forall x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[, f'(x) < 0 \Leftrightarrow \varphi'(x) < 0$$

Sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$, φ est décroissante

Tableau de variation de φ

| | | |
|---------------|---|------------------|
| x | 0 | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\varphi'(x)$ | - | |
| $\varphi(x)$ | 1 | $-\frac{\pi}{2}$ |

c. φ est continue car dérivable sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$ et est strictement décroissante sur cet intervalle. φ réalise alors une bijection de $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}; 1\right]$ et $0 \in \left]-\frac{\pi}{2}; 1\right]$.

Donc l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$

$$\varphi(\alpha) = 0 \Leftrightarrow f(\alpha) = \alpha$$

$$d. \beta = f(1) = e^{-1} \cos 1$$

$$\left]0; 1\right[\subset \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\begin{cases} \varphi(0) = 1 > 0 \\ \varphi(1) = \beta - 1 < 0 \end{cases}$$

On a : $\varphi(0) \times \varphi(1) < 0$

D'où $\alpha \in \left]0; 1\right[$ c'est-à-dire $\alpha < 1$

D'autres parts :

f étant décroissante sur $\left]0; 1\right[$

On a :

$$\alpha < 1 \Leftrightarrow f(1) < f(\alpha)$$

$$\text{Or } f(\alpha) = \alpha \text{ et } \beta = f(1)$$

D'où $\beta < \alpha$

On a : $\beta < \alpha$ et $\alpha < 1$

Donc $\beta < \alpha < 1$

3. On considère la suite (U_n) définie par son premier terme $U_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = f(U_n)$$

a. $U_0 = 1$ donc on a : $\beta \leq U_0 \leq 1$.

Supposons $\beta \leq U_n \leq 1$ pour tout entier n puis montrons que

$$\beta \leq U_{n+1} \leq 1$$

En effet :

$$\beta \leq U_n \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \beta \leq U_n \leq 1$$

$$\Rightarrow f(1) \leq f(U_n) \leq f(0)$$

Car f est décroissante sur $\left]0; 1\right]$

Or par définition $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où $\beta \leq U_{n+1} \leq 1$ si $\beta \leq U_n \leq 1$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \beta \leq U_n \leq 1$$

b. On pose $k = |f'(\beta)|$

$$f''(x) = 2e^{-x} \sin x > 0 \forall x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$$

On en déduit que :

Sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$, f' est croissante

Par conséquent :

$$\beta \in \left]0; 1\right[\subset \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\Leftrightarrow f'(0) < f'(\beta) \leq f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow -1 < f'(\beta) \leq -e^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{\pi}{2}} \leq |f'(\beta)| < 1$$

On a donc : $|f'(\beta)| < 1$

Ce qui montre que : $k < 1$

D'autres parts :

$\forall x \in [\beta; 1]$, on a :

$$f'(\beta) \leq f'(x) \leq f'(1) < 0$$

$$\Leftrightarrow |f'(x)| \leq |f'(\beta)|$$

$$\text{Donc } \forall x \in [\beta; 1], |f'(x)| \leq k$$

- c. Appliquons l'inégalité des accroissements finis à l'intervalle de bornes $(\alpha; U_n)$

On a :

$$|f(U_n) - f(\alpha)| \leq k|U_n - \alpha|.$$

$$\text{Or } U_{n+1} = f(U_n) \text{ et } f(\alpha) = \alpha$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, \\ |U_{n+1} - \alpha| \leq k|U_n - \alpha|$$

En partant de cette inégalité, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq k|U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq k|U_1 - \alpha|$$

$$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq k|U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq k|U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq k^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |1 - \alpha|$$

$$0 < \alpha < 1$$

$$\Leftrightarrow -1 < U_0 - \alpha < 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| < 1$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq k^n |U_0 - \alpha| \leq 1 \times k^n$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq k^n$$

- d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} k^n = 0$ car $k < 1$

On n'en déduit que la suite (U_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

PROBLEME 12

PARTIE A

$$u(x) = 2x - \sqrt{1+x^2}; D_u = \mathbb{R}$$

$$1. u(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - \sqrt{1+x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1+x^2} = 2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x \geq 0 \\ 1+x^2 = 4x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{3} \right\}$$

2. $u(0) = -1 < 0$ d'où le tableau de signe suivant :

| | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $+\infty$ |
| $u(x)$ | - | 0 | + |

$$\forall x \in \left] -\infty; \frac{\sqrt{3}}{3} \right[, u(x) < 0$$

$$\forall x \in \left] \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty \right[, u(x) > 0$$

PARTIE B

$$1. g(x) = x - 2\sqrt{1+x^2}; D_g = \mathbb{R}$$

- a. Les fonctions $x \mapsto x$ et

$x \mapsto 1+x^2$ sont dérivables sur \mathbb{R} car ce sont des fonctions polynômes

D'autres parts :

$$\forall x \in \mathbb{R}, 1+x^2 > 0$$

Alors la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur \mathbb{R}

On conclut donc que :

$g: x \mapsto x - 2\sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur \mathbb{R} comme combinaison linéaire de deux fonctions dérivables sur \mathbb{R}

$$b. g'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-2x}{\sqrt{1+x^2}} = -\frac{u(x)}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$c. \forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{1+x^2} > 0$$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $-u(x)$

Par conséquent :

$$\forall x \in \left] -\infty; \frac{\sqrt{3}}{3} \right[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in \left] \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty \right[, g'(x) < 0$$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 + 2\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - 2\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

Tableau de variations de g

| | | | |
|---------|-----------|----------------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | + | 0 | - |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $-\sqrt{3}$ | $-\infty$ |

3.

a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + 2\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = 3$

Et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x) - 3x)$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x - 2\sqrt{1 + x^2})$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}})} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x) - 3x) = 0$

Alors la droite d'équation $y = 3x$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - 2\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = -1$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) + x)$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 2\sqrt{1 + x^2})$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{x(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}})} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) + x) = 0$

Alors la droite d'équation $y = -x$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$

b. $\forall x \leq 0, y = 3x$ et

$g(x) - y = \frac{-2}{-x + \sqrt{1 + x^2}} < 0$

On n'en déduit que :

(C) est en dessous de l'asymptote d'équation $y = 3x$.


$\forall x \geq 0, y = -x$ et

$g(x) - y = \frac{-2}{x + \sqrt{1 + x^2}} < 0$

On en déduit que :

(C) est en dessous de l'asymptote d'équation $y = -x$

c. Représentation graphique



PARTIE C

1. $h(-x) = -g(x)$

$\Leftrightarrow h(-x) = -x + 2\sqrt{1 + x^2}$

$\Leftrightarrow h(-x) = -x + 2\sqrt{1 + (-x)^2}$

D'où $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = x + 2\sqrt{1 + x^2}$

2. (C) : $y = x - 2\sqrt{1 + x^2}$

$\Leftrightarrow y - x = -2\sqrt{1 + x^2} \leq 0$

$\Leftrightarrow (y - x)^2 = 4(1 + x^2); y - x \leq 0$

$\Leftrightarrow (C) : (y - x)^2 = 4(1 + x^2); y \leq x$

(Γ) : $y = x + 2\sqrt{1 + x^2}$

$\Leftrightarrow y - x = 2\sqrt{1 + x^2} \geq 0$

$\Leftrightarrow (y - x)^2 = 4(1 + x^2); y - x \geq 0$

$\Leftrightarrow (\Gamma) : (y - x)^2 = 4(1 + x^2); y \geq x$

Or

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \leq x \text{ ou } y \geq x\} = \mathbb{R}^2$.

D'où (C) \cup (Γ) : $(y - x)^2 = 4(1 + x^2)$

On a donc

(C) \cup (Γ) : $y^2 - 2xy - 3x^2 - 4 = 0$

3. $(-y)^2 - 2(-x)(-y) - 3(-x)^2 - 4 = y^2 - 2xy - 3x^2 - 4.$

Donc si le point $M(x, y) \in (C) \cup (\Gamma)$ alors le point $M'(-x, -y) \in (C) \cup (\Gamma)$

On en déduit que :

L'origine O du repère est un centre de symétrie de $(C) \cup (\Gamma)$

4. (Γ) est donc la réunion de (C) et de sa symétrique de par rapport à l'origine O du repère.

$$(\Gamma) = (C) \cup \mathcal{S}_O((C))$$

(Voir le graphique)

PARTIE D

$$f(x) = x\sqrt{1+x^2} + \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

1.

a. $\forall x \in \mathbb{R}, 1+x^2 > x^2$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2}$$

Or $\sqrt{x^2} = |x|$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{1+x^2} > |x|$$

b. $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x + \sqrt{1+x^2} > 0\}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{1+x^2} > |x| \geq -x$$

$$\Leftrightarrow x + \sqrt{1+x^2} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{On en déduit que : } D_f = \mathbb{R}$$

2. $f'(x) = \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}$
 $= \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}}$

$$f'(x) = 2\sqrt{1+x^2}$$

$$g(x) = x - 2\sqrt{1+x^2} = x - f'(x)$$

D'où une primitive de g sur \mathbb{R} est par exemple la fonction G définie

$$\text{par : } G(x) = \frac{1}{2}x^2 - f(x)$$

3. $\mathcal{A} = ua \times \int_0^1 (-x - g(x)) dx$

$$= ua \times \left[-\frac{1}{2}x^2 - G(x) \right]_0^1$$

$$ua = 4cm^2$$

$$\mathcal{A} = 4(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))cm^2$$

PROBLEME 13

PARTIE A

$$f(x) = \frac{1-x^2}{2+x}; D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

1. $\forall x \in D_f,$

$$-x + 2 - \frac{3}{x+2} = \frac{-x^2+4-3}{x+2} = \frac{1-x^2}{x+2} = f(x)$$

$$\text{D'où } \forall x \in D_f, f(x) = -x + 2 - \frac{3}{x+2}$$

2. $f'(x) = \frac{-(x^2+4x+1)}{(x+2)^2}$

$$\forall x \in D_f, (x+2)^2 > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $-x^2 - 4x - 1$

$$-x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$\Delta' = 3$$

$$x_1 = -2 - \sqrt{3}; x_2 = -2 + \sqrt{3}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; -2 - \sqrt{3}[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]-2 - \sqrt{3}; -2 + \sqrt{3}[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]-2 + \sqrt{3}; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

$$\text{Sur }]-\infty; -2 - \sqrt{3}[,$$

f est décroissante

$$\text{Sur }]-2 - \sqrt{3}; -2 + \sqrt{3}[,$$

f est croissante

$$\text{Sur }]-2 + \sqrt{3}; +\infty[,$$

f est décroissante

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Tableau de variation de f

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|------|-----------------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $-2 - \sqrt{3}$ | -2 | $-2 + \sqrt{3}$ | $+\infty$ | |
| $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | $+$ | 0 | $-$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $4 + 2\sqrt{3}$ | | $4 - 2\sqrt{3}$ | $-\infty$ | $-\infty$ |


La droite d'équation $x = -2$ est une asymptote verticale à (C)

D'autres parts :

Posons $y = -x + 2$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = 0$$

Alors la droite d'équation $y = -x + 2$ est une asymptote oblique de (C).
Tracer de (C)



3. Soit I le point d'intersection des 2 asymptotes :

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Alors $I(-2; 4)$

$$\begin{aligned} f(2 \times (-2) - x) + f(x) &= f(-4 - x) + f(x) \\ &= x + 4 + 2 - \frac{3}{-x-2} - x + 2 - \frac{3}{x+2} = 8 \end{aligned}$$

$f(2 \times (-2) - x) + f(x) = 8 = 2 \times 4$
Alors $I(-2; 4)$ est un centre de symétrie de (C)

4. $\mathcal{A} = ua \times \int_{-1}^2 (y - f(x)) dx$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 (y - f(x)) dx &= \int_{-1}^2 \frac{3}{x+2} dx \\ &= [3 \ln(x+2)]_{-1}^2 \end{aligned}$$

$$\int_{-1}^2 (y - f(x)) dx = 6 \ln 2$$

$$ua = 1 \text{ cm}^2$$

$\mathcal{A} = 6 \ln 2 \text{ cm}^2$

PARTIE B

$$\varphi(t) = \frac{1 - \sin^2 t}{2 + \sin t}; D_\varphi = \mathbb{R}$$

1. $\varphi(\pi - t) = \frac{1 - \sin^2(\pi - t)}{2 + \sin(\pi - t)} = \varphi(t)$

Car $\sin(\pi - t) = \sin t$

φ est périodique de période 2π donc l'étude de φ peut se faire sur un intervalle d'amplitude 2π et on complète la courbe représentative

de φ par des translations de vecteur $k2\pi\vec{i}$; k étant un entier relatif.

D'autres parts :

$$\varphi(\pi - t) = \varphi(t)$$

$$\text{Or } \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right] = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right] \text{ et}$$

$$\forall t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]; (\pi - t) \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$$

D'où une étude des variations de φ sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ permet de construire entièrement la courbe représentative de φ

2.

a. $f''(x) = \frac{-6}{(x+2)^3} < 0, \forall x \in]-2; +\infty[$

Sur $] -2; +\infty[$, f' est décroissante

On en déduit que :

Sur $[-1; 1]$, f' est décroissante

$$f'([-1; 1]) = [f'(1); f'(-1)]$$

Alors $f'([-1; 1]) = \left[-\frac{2}{3}; 2\right]$

b. $\varphi(t) = f(\sin t)$

$$\Leftrightarrow \varphi'(t) = \cos t \times f'(\sin t)$$

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = f'(\sin t) \cos t$

c. f' est continue car dérivable et est strictement décroissante sur $] -1; 1[$

Alors f' réalise une bijection de

$$]-1; 1[\text{ sur } \left]-\frac{2}{3}; 2\right[\text{ et } 0 \in \left]-\frac{2}{3}; 2\right[$$

Donc l'équation $f'(t) = 0$ admet une unique solution t_0 dans $] -1; 1[$.

$$-1 < t_0 < 1$$

$$\Leftrightarrow \exists! \alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[/ \sin \alpha = t_0$$

On a donc :

$$\varphi'(\alpha) = f'(\sin \alpha) \cos \alpha$$

$$= f'(t_0) \cos \alpha$$

$$\varphi'(\alpha) = 0$$

$$\text{Car } \forall \alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\cos \alpha > 0 \text{ et}$$

$$f'(t_0) = 0$$

On conclut donc que :

α est l'unique solution de

l'équation $\varphi'(t) = 0$ dans $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

d. $\varphi(\alpha) = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{2 + \sin \alpha}$

Or $\varphi'(\alpha) = 0$

$\Leftrightarrow f'(\sin \alpha) = 0$

$\Leftrightarrow \sin \alpha = -2 + \sqrt{3}$

Car $-2 - \sqrt{3} < -1$

D'où $\varphi(\alpha) = f(-2 + \sqrt{3})$

On a donc $\varphi(\alpha) = 4 - 2\sqrt{3}$

3.

a.

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| t | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ |
| $\varphi(t)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{4 - \sqrt{2}}{14}$ | $\frac{4 - \sqrt{3}}{26}$ |

$\varphi'(0) = -\frac{1}{4}$

b. $\varphi'(t) = f'(\sin t) \cos t$

$\forall t \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $\cos t \geq 0$ et d'après les variations de f ,

$0 \leq \sin t \leq 1 \Rightarrow f'(\sin t) < 0$

Car $[0; 1] \subset]-2 + \sqrt{3}; +\infty[$



Par conséquent :

$\forall t \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $\varphi'(t) \leq 0$

On en déduit que :

Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, φ est décroissante

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| t | 0 | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\varphi'(t)$ | | - |
| $\varphi(t)$ | $\frac{1}{2}$ | |

4. $h(t) = \varphi(t) - t$ et $D_h = \mathbb{R}$

$h'(t) = \varphi'(t) - 1 < 0 \forall t \in [0; \frac{\pi}{2}]$

On en déduit que :

Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, h est décroissante

h étant continue et strictement

décroissante sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, alors

h réalise une bijection de $[0; \frac{\pi}{2}]$

dans $[-\frac{\pi}{2}; \frac{1}{4}]$ et $0 \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{1}{4}]$

Donc l'équation $h(t) = 0$ admet

une unique solution $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}]$

$h(\theta) = 0 \Leftrightarrow \varphi(\theta) = \theta$

D'où θ est aussi l'unique solution de l'équation $\varphi(t) = t$ sur $[0; \frac{\pi}{2}]$

PARTIE C

1. $U_0 = 0$ et $0 \in [0; \frac{1}{2}]$ donc $U_0 \in [0; \frac{1}{2}]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in [0; \frac{1}{2}]$

puis montrons que $U_{n+1} \in [0; \frac{1}{2}]$

En effet :

$0 \leq U_n \leq \frac{1}{2} \leq \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \varphi(\frac{\pi}{2}) \leq \varphi(U_n) \leq \varphi(0)$

Car φ est décroissante

On a alors $0 \leq \varphi(U_n) \leq \frac{1}{2}$

Or par définition $\varphi(U_n) = U_{n+1}$

D'où $U_{n+1} \in [0; \frac{1}{2}]$ si $U_n \in [0; \frac{1}{2}]$

On conclut donc que :

$\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n \in [0; \frac{1}{2}]$

2. f' étant décroissante sur $]-2; +\infty[$ alors elle est décroissante sur $[0; 1]$

On a : $f'([0; 1]) = [-\frac{2}{3}; -\frac{1}{4}]$

$\Leftrightarrow \forall x \in [0; 1]$, $-\frac{2}{3} \leq f'(x) \leq -\frac{1}{4}$

$\Leftrightarrow \forall x \in [0; 1]$, $\frac{1}{4} \leq |f'(x)| \leq \frac{2}{3}$

Donc $\forall x \in [0; 1]$, $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$

Par ailleurs :

$\varphi'(t) = \cos t \times f'(\sin t)$

$\Leftrightarrow |\varphi'(t)| \leq |f'(\sin t)|$

Car $\forall t \in \left[0; \frac{1}{2}\right] \subset \left[0; \frac{\pi}{2}\right], |\cos t| \leq 1$

Or $\forall t \in \left[0; \frac{1}{2}\right], \sin t \in [0; 1]$

D'où

$\forall t \in \left[0; \frac{1}{2}\right], |\varphi'(t)| \leq |f'(\sin t)| \leq \frac{2}{3}$

On en déduit que :

$$\forall t \in \left[0; \frac{1}{2}\right], |\varphi'(t)| \leq \frac{2}{3}$$

3. $\forall t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]; |\varphi'(t)| \leq \frac{2}{3}$ et

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right].$

Appliquons l'inégalité des accroissements finis à l'intervalle de bornes $(\theta; U_n)$.

On a :

$$|\varphi(U_n) - \varphi(\theta)| \leq \frac{2}{3}|U_n - \theta|$$

Or $\varphi(U_n) = U_{n+1}$ et $\varphi(\theta) = \theta$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \theta| \leq \frac{2}{3}|U_n - \theta|$

4. En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \theta| \leq \frac{2}{3}|U_0 - \theta|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \theta| \leq \frac{2}{3}|U_1 - \theta|$$

$$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \theta| \leq \frac{2}{3}|U_2 - \theta|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \theta| \leq \frac{2}{3}|U_{n-1} - \theta|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \theta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |U_0 - \theta|$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{1}{2} \text{ et } U_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq U_0 - \theta \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \theta| \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \theta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |U_0 - \theta| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \theta| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

Car $0 < \frac{2}{3} < 1$

On en déduit que la suite (U_n) converge vers θ

PROBLEME 14

PARTIE A

$$(E): y' - 2y = 2(e^{2x} - 1)$$

1. $g(x) = axe^{2x} + b$

$$g'(x) = (2ax + a)e^{2x}$$

$$g'(x) - 2g(x) = 2(e^{2x} - 1)$$

$$\Leftrightarrow ae^{2x} - 2b = 2e^{2x} - 2$$

Par identification :

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases} \text{ et } g(x) = 2xe^{2x} + 1$$

2. $y = z + g$

Supposons que y est solution de (E)

On a : $y' - 2y = 2(e^{2x} - 1)$

$$\Rightarrow (z + g)' - 2(z + g) = 2(e^{2x} - 1)$$

$$\Rightarrow z' - 2z = 2(e^{2x} - 1) - (g' - 2g)$$

$$\Rightarrow z' - 2z = 0$$

Car $g' - 2g = 2(e^{2x} - 1)$

Alors z est solution de (E') si y est solution de (E)

Réciproquement

Supposons que z est solution de (E')

On a : $g' - 2z = 0$

$$\Rightarrow z' - 2z = 0 \text{ et } g' - 2g =$$

$$2(e^{2x} - 1)$$

$$\Rightarrow z' + g' - 2(z + g) = 2(e^{2x} - 1)$$

$$\Rightarrow (z + g)' - 2(z + g) = 2(e^{2x} - 1)$$

$$\Rightarrow y' - 2y = 2(e^{2x} - 1)$$

Alors y est solution de (E) si z est solution de (E')

On vient ainsi de montrer que :

y est solution de (E) si et seulement si z est solution de (E')

3. $z' - 2z = 0 \Leftrightarrow z' = 2z$

Alors $z = ke^{2x}; k \in \mathbb{R}$

Déduction :

Soit y une solution de (E)

$$y = z + g$$

Alors $y = ke^{2x} + 2xe^{2x} + 1; k \in \mathbb{R}$

4. $f(x) = ke^{2x} + 2xe^{2x} + 1$ et $f(0) = 0$

$$f(0) = 0 \Leftrightarrow k = -1$$

On a donc $f(x) = (2x - 1)e^{2x} + 1$

PARTIE B

$$f(x) = (2x - 1)e^{2x} + 1; D_f = \mathbb{R}$$

1.

$$\text{a. } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

On en déduit que :

La courbe (C) admet une asymptote horizontale (Δ) d'équation $y = 1$ au voisinage de $-\infty$

b. (Δ): $y = 1$

$$f(x) - y = (2x - 1)e^{2x}$$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{2x} > 0$; alors le signe dépend de celui de $(2x - 1)$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; \frac{1}{2}[, f(x) - y < 0$$

$$\forall x \in]\frac{1}{2}; +\infty[, f(x) - y > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; \frac{1}{2}[$, (C) est en dessous de (Δ)

Sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$, (C) est en dessus de (Δ)

$$(C) = (\Delta) \Leftrightarrow f(x) = y$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \text{ et } y = 1$$

$$\text{Alors } A\left(\frac{1}{2}; 1\right)$$

$$\text{2. } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

D'autres parts :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-1}{x}\right) = 2 \end{cases}$$

Alors la courbe (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées

3. $f'(x) = 4xe^{2x}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{2x} > 0$$

Alors le signe dépend de celui de $4x$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0$$


On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[$, f est décroissante

Sur $]0; +\infty[$, f est croissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ |
| $f(x)$ | 1 | 0 | $+\infty$ |

4. Tracer de (C) et (Δ)

5.

$$\text{a. } I = \int_0^{\frac{1}{2}} [1 - f(x)] dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - 2x)e^{2x} dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = 1 - 2x \\ v'(x) = e^{2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = -2 \\ v(x) = \frac{1}{2}e^{2x} \end{cases}$$

$$I = \left[\frac{1}{2}(1 - 2x)e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} e^{2x} dx$$

$$I = [(1 - x)e^{2x}]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$I = \frac{e-2}{2}$$

b. I est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C), la droite (Δ) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$

PARTIE C

$$1. J = \int_{-1}^0 (2x - 1)e^{2x} dx = [(x - 1)e^{2x}]_{-1}^0$$

D'après PARTIE B5)

$$\text{Donc } J = 2e^{-2} - 1$$

$$2. K = \int_{-1}^0 (2x - 1)^2 e^{4x} dx$$

1^{ère} Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = (2x - 1)^2 \\ v'(x) = e^{4x} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u'(x) = 2(2x - 1) \\ v(x) = \frac{1}{4}e^{4x} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} u'(x) = 2(2x - 1) \\ v(x) = \frac{1}{4}e^{4x} \end{array} \right\}$$

$$K = \left[\frac{1}{4} (2x - 1)^2 e^{4x} \right]_{-1}^0 -$$

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^0 (2x - 1) e^{4x} dx$$

2^{ème} Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = 2x - 1 \\ v'(x) = e^{4x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 2 \\ v(x) = \frac{1}{4}e^{4x} \end{cases}$$

$$\int_{-1}^0 (2x - 1) e^{4x} dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} (2x - 1) e^{4x} \right]_{-1}^0 - \frac{1}{2} \int_{-1}^0 e^{4x} dx$$

On a donc

$$K = \left[\frac{1}{4} (2x - 1)^2 e^{4x} - \frac{1}{4} (2x - 1) e^{4x} + \frac{1}{8} e^{4x} \right]_{-1}^0$$

$$K = \left[\left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{5}{8} \right) e^{4x} \right]_{-1}^0$$

$$K = \frac{5 - 25e^{-4}}{8}$$

$$3. \mathcal{V} = uv \times \pi \int_{-1}^0 f^2(x) dx$$

$$\int_{-1}^0 f^2(x) dx$$

$$= \int_{-1}^0 [(2x - 1)^2 e^{4x} + 2(2x - 1)e^{2x} + 1] dx$$

$$= \int_{-1}^0 (2x - 1)^2 e^{4x} dx$$

$$+ 2 \int_{-1}^0 (2x - 1) e^{2x} dx + \int_{-1}^0 dx$$

$$\int_{-1}^0 f^2(x) dx = K + 2J + 1$$

$$\int_{-1}^0 f^2(x) dx = 4e^{-2} - \frac{25}{8}e^{-4} - \frac{3}{8}$$

$$uv = 8 \text{ cm}^3$$

$$\mathcal{V} = \pi(-25e^{-4} + 32e^{-2} - 3) \text{ cm}^3$$

PARTIE D

$$1. x = \frac{\ln t}{2} \Leftrightarrow \ln t = 2x \text{ et } t = e^{2x}$$

On en déduit que :

$$y = 1 - (2x + 1)e^{-2x}$$

D'autre part :

$$t \geq 1 \Rightarrow \ln t \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{\ln t}{2} \geq 0$$

$$\Rightarrow x \geq 0$$

$$(\Gamma): y = -(2x + 1)e^{-2x} + 1; x \geq 0$$

$$2. (\Gamma): y = (-2x - 1)e^{-2x} + 1; x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (\Gamma): y = f(-x); x \geq 0$$

Construction

$$\forall x \geq 0; -x \leq 0$$

(Γ) est donc la symétrique de la partie de (\mathcal{C}) correspondant à $] -\infty; 0]$ par rapport à l'axe des ordonnées

PROBLEME 15

$$f(x) = 1 + e^{-x} - 2e^{-2x}; D_f = \mathbb{R}$$

PARTIE A

$$P(X) = 1 + X - 2X^2; D_p = \mathbb{R}$$

1. $\Delta = 9$

$$X_1 = -\frac{1}{2}; X_2 = 1$$

$$\forall X \in]-\infty; -\frac{1}{2}[, P(X) < 0$$

$$\forall X \in]-\frac{1}{2}; 1[, P(X) > 0$$

$$\forall X \in]1; +\infty[, P(X) < 0$$

2. $P(X) = -2\left(X + \frac{1}{2}\right)(X - 1)$

$$\Leftrightarrow P(X) = (2X + 1)(1 - X)$$

Or $f(x) = P(e^{-x})$ d'où

$$f(x) = (2e^{-x} + 1)(1 - e^{-x})$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2e^{-x} + 1 > 0$$

Alors le signe de $f(x)$ dépend de celui de $1 - e^{-x}$

$$1 - e^{-x} > 0 \Rightarrow x > 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, f(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, f(x) > 0$$

3. **On en déduit que :**

Sur $]-\infty; 0[$, (C) est en dessous de l'axe des abscisses

Sur $]0; +\infty[$, (C) est au dessus de l'axe des abscisses

PARTIE B

1.
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

On en déduit que :

(C) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

2. $f(x) = 1 + e^{-x} - 2e^{-2x}$

$$= e^{-2x} \left(\frac{1}{e^{-2x}} + \frac{e^{-x}}{e^{-2x}} - 2 \right)$$

$$\text{Donc } f(x) = e^{-2x}(e^{2x} + e^x - 2)$$

$$\text{On en déduit que : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

3.

a. $f'(x) = -e^{-x} + 4e^{-2x}$

b. $f'(x) = e^{-2x}(-e^x + 4)$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-2x} > 0$$

Alors $f'(x)$ a le même signe que $(4 - e^x)$

$$4 - e^x > 0 \Rightarrow x < 2 \ln 2$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 2 \ln 2[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]2 \ln 2; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :Sur $]-\infty; 2 \ln 2[$, f est croissanteSur $]2 \ln 2; +\infty[$, f est décroissantec. **Tableau de variation de f**

| x | $-\infty$ | $2 \ln 2$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\frac{9}{8}$ | 1 |

$$f(2 \ln 2) = \frac{9}{8}$$

4.

a. $(T_0): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

$$\text{Alors } (T_0): y = 3x$$

b. $(D): y = 1$

$(C) = (D)$

$$\Leftrightarrow e^{-x} - 2e^{-2x} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-2x}(e^x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 2 \text{ car } \forall x \in \mathbb{R}, e^{-2x} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = \ln 2 \text{ et } y = f(\ln 2) = 1$$

$$\text{Et donc } A(\ln 2; 1)$$

c. $f(x) - y = e^{-2x}(e^x - 2)$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-2x} > 0$$

Alors le signe dépend de celui de $e^x - 2$

$$e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > \ln 2$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; \ln 2[, f(x) - y < 0$$

$$\forall x \in]\ln 2; +\infty[, f(x) - y > 0$$

On en déduit que :

Sur $] -\infty; \ln 2[$, (C) est en dessous de (D)

Sur $]\ln 2; +\infty[$, (C) est au dessus de (D)


5. $(T): y = f'(\ln 2)(x - \ln 2) + f(\ln 2)$

$$\text{Donc } (T): y = \frac{1}{2}x + 1 - \frac{\ln 2}{2}$$

6. $f(-\ln 2) = -5$

(C) passe par le point de coordonnées $(-\ln 2; -5)$

Tracer de (C)



PARTIE C

1. $\mathcal{A} = ua \times \int_0^{\ln 2} (1 - f(x)) dx$

$$\int_0^{\ln 2} (1 - f(x)) dx = [e^{-x} - e^{-2x}]_0^{\ln 2}$$

$$\int_0^{\ln 2} (1 - f(x)) dx = \frac{1}{4}$$

$$ua = 4cm^2$$

$$\text{On a donc } \mathcal{A} = 1 cm^2$$

2. $\lambda > \ln 2$; $\mathcal{A}(\lambda) = 4 \int_{\ln 2}^{\lambda} [f(x) - 1] dx$

a. $\mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire en cm^2 du domaine plan délimité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = \ln 2$ et $x = \lambda$

b. $\mathcal{A}(\lambda) = 4[-e^{-x} + e^{-2x}]_{\ln 2}^{\lambda}$

$$\mathcal{A}(\lambda) = (1 - 4e^{-\lambda} + 4e^{-2\lambda})cm^2$$

$$\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-2\lambda} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$$

3. $V = \pi \int_{-\ln 2}^0 f^2(x) dx$

$$f^2(x)$$

$$= (1 + 2e^{-x} - 3e^{-2x} - 4e^{-3x} + 4e^{-4x})dx$$

$$V = \pi \left[x - 2e^{-x} + \frac{3}{2}e^{-2x} + \frac{4}{3}e^{-3x} - e^{-4x} \right]_{-\ln 2}^0$$

$$V = \pi \left(\frac{19}{6} + \ln 2 \right) uv$$

PROBLEME 16**PARTIE A**

$$g(x) = -3 - \ln x + \frac{1}{x}; D_g =]0; +\infty[$$

$$1. \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$2. g'(x) = -\frac{x+1}{x^2}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x^2 > 0 \text{ et } x+1 > 0$$

$$\text{Alors } \forall x \in]0; +\infty[, g'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, g est décroissante

Tableau de variation de g

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | - |
| $g(x)$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

3. Sur $]0; +\infty[$, g est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors g réalise une bijection de

$]0; +\infty[$ sur $]-\infty; +\infty[$ et

$0 \in]-\infty; +\infty[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans

$]0; +\infty[$

Montrons que $\alpha \in [0,4 ; 0,5]$

$$\begin{cases} g(0,4) = 0,4 > 0 \\ g(0,5) = -0,3 < 0 \end{cases}$$

$$\text{On a : } g(0,4) \times g(0,5) < 0$$

$$\text{Alors } \alpha \in [0,4 ; 0,5]$$

4. g est décroissante et $g(\alpha) = 0$

On en déduit que :

$$\forall x \in]0; \alpha[, g(x) > 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$$

$$5. I = \int_{\frac{1}{4}}^{\alpha} g(x) dx$$

$$a. \forall x \in \left[\frac{1}{4}; \alpha\right], g(x) \geq 0$$

On en déduit que :

I est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe de g , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \frac{1}{4}$ et $x = \alpha$

$$b. I = [-3x + \ln x]_{\frac{1}{4}}^{\alpha} - \int_{\frac{1}{4}}^{\alpha} \ln x dx$$

$$\text{Calculons } \int_{\frac{1}{4}}^{\alpha} \ln x dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = 1 \Rightarrow v(x) = x \end{cases}$$

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\alpha} \ln x dx = [x \ln x]_{\frac{1}{4}}^{\alpha} - \int_{\frac{1}{4}}^{\alpha} dx$$

$$\text{Donc } I = [-2x + (1-x) \ln x]_{\frac{1}{4}}^{\alpha}$$

$$I = -2\alpha + (1-\alpha) \ln \alpha + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln 2$$

$$\text{Or } g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = -3 + \frac{1}{\alpha}$$

$$\text{D'où } I = \alpha + \frac{1}{\alpha} - \frac{7}{2} + \frac{3}{2} \ln 2$$

PARTIE B

$$f(x) = e^{-x}(3 + \ln x); D_f =]0; +\infty[$$

1.

$$a. \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ e^0 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$$b. \begin{aligned} f(x) &= e^{-x}(3 + \ln x) \\ &= 3e^{-x} + e^{-x} \ln x \\ &= 3e^{-x} + \frac{1}{e^x} \cdot \ln x \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f(x) = 3e^{-x} + \frac{x}{e^x} \cdot \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{ca } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

c. **Déduction**

(\mathcal{C}) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ et une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

$$2. \begin{aligned} f'(x) &= -e^{-x}(3 + \ln x) + \frac{e^{-x}}{x} \\ f'(x) &= e^{-x} \left(-3 - \ln x + \frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc on a : } f'(x) = e^{-x} \cdot g(x)$$

3. $f(\alpha) = e^{-\alpha}(3 + \ln \alpha)$

Or $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = -3 + \frac{1}{\alpha}$

D'où $f(\alpha) = \frac{e^{-\alpha}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha e^\alpha}$

Encadrement de $f(\alpha)$

$0,4 \leq \alpha \leq 0,5$

$\Leftrightarrow 1,49 \leq e^\alpha \leq 1,64$

$\Leftrightarrow 0,59 \leq \alpha e^\alpha \leq 0,82$

$\Leftrightarrow 1,21 \leq \frac{1}{\alpha e^\alpha} \leq 1,69$

On en déduit que :

$1,2 \leq f(\alpha) \leq 1,7$ à 5×10^{-1} près

4. $\forall x \in]0; +\infty[, e^{-x} > 0$

Donc le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $g(x)$

Par conséquent :

$\forall x \in]0; \alpha[, f'(x) > 0$

$\forall x \in]\alpha; +\infty[, f'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]0; \alpha[, f$ est croissante

Sur $]\alpha; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| x | 0 | α | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $f(\alpha)$ | 0 |

5. $f(x) = 0$


$\Leftrightarrow e^{-x}(3 + \ln x) = 0$

$\Leftrightarrow \ln x = -3$ car $e^{-x} \neq 0$

$\Leftrightarrow x = e^{-3}$

Alors (C) coupe l'axe des abscisses aux points de coordonnées $(e^{-3}; 0)$

6. Tracer de (C)



PARTIE C

$h(x) = \frac{1}{3 + \ln x}; D_h = [0,4; 0,5]$

1. $g(x) = 0$

$\Leftrightarrow -3 - \ln x + \frac{1}{x} = 0$

$\Leftrightarrow 3 + \ln x = \frac{1}{x}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{3 + \ln x} = x$

$\Leftrightarrow h(x) = x$

On en déduit que :

α est l'unique solution de l'équation

$h(x) = x$ d'après PARTIE A, α est

l'unique solution de l'équation

$g(x) = 0$

2. $h'(x) = \frac{-1}{x(3 + \ln x)^2} < 0 \forall x \in [0,4; 0,5]$

On en déduit que :

Sur $[0,4; 0,5], h$ est décroissante

| | | |
|---------|------|------|
| x | 0,4 | 0,5 |
| $h'(x)$ | - | |
| $h(x)$ | 0,47 | 0,43 |

Déduction

D'après les variations de h ,

$\forall x \in [0,4; 0,5], h(x) \in [0,43; 0,47]$

Or $[0,43; 0,47] \subset [0,4; 0,5]$

D'où

$\forall x \in [0,4; 0,5], h(x) \in [0,4; 0,5]$

3. $\forall x \in [0,4; 0,5], 0,4 \leq x \leq 0,5$

$\Leftrightarrow -0,91 \leq \ln x \leq -0,69$

$\Leftrightarrow 2,09 \leq 3 + \ln x \leq 2,31$

$\Leftrightarrow 4,36 \leq (3 + \ln x)^2 \leq 5,33$

$\Leftrightarrow 1,74 \leq x(3 + \ln x)^2 \leq 2,66$

$\Leftrightarrow 0,37 \leq \frac{1}{x(3 + \ln x)^2} \leq 0,57$

$\Leftrightarrow -0,57 \leq h'(x) \leq -0,37$

$\Leftrightarrow 0,37 \leq |h'(x)| \leq 0,57 \leq \frac{3}{5}$

Donc $\forall x \in [0,4; 0,5], |h'(x)| \leq \frac{3}{5}$

4. $U_0 = 0,45$ et $U_{n+1} = h(U_n) \forall n \in \mathbb{N}$

a. $U_0 = 0,45 \in [0,4 ; 0,5]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que

$U_n \in [0,4 ; 0,5]$ et montrons que

$U_{n+1} \in [0,4 ; 0,5]$

$U_n \in [0,4 ; 0,5] \Rightarrow h(U_n) \in [0,4 ; 0,5]$

Car $\forall x \in [0,4 ; 0,5], h(x) \in [0,4 ; 0,5]$

Or par définition $U_{n+1} = h(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [0,4 ; 0,5]$ si $U_n \in [0,4 ; 0,5]$

On conclut donc que :

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [0,4 ; 0,5]$

b. $\alpha \in [0,4 ; 0,5] ; U_n \in [0,4 ; 0,5]$ et

On sait que

$\forall x \in [0,4 ; 0,5], |h'(x)| \leq \frac{3}{5}$

D'où d'après l'inégalité de la moyenne on a :

$\left| \int_{\alpha}^{U_n} h'(x) dx \right| \leq \frac{3}{5} |U_n - \alpha|$

$\Rightarrow |[h(x)]_{\alpha}^{U_n}| \leq \frac{3}{5} |U_n - \alpha|$

$\Rightarrow |h(U_n) - h(\alpha)| \leq \frac{3}{5} |U_n - \alpha|$

Or $U_{n+1} = h(U_n)$ et $h(\alpha) = \alpha$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$,

$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{3}{5} |U_n - \alpha|$

c. En partant de cette inégalité on a :

$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{3}{5} |U_0 - \alpha|$

$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{3}{5} |U_1 - \alpha|$

$n = 3 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{3}{5} |U_2 - \alpha|$

⋮

$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{3}{5} |U_{n-1} - \alpha|$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{3}{5}\right)^n |U_0 - \alpha|$

$|U_0 - \alpha| = |0,45 - \alpha|$

$0,4 \leq \alpha \leq 0,5$

$\Leftrightarrow -0,05 \leq U_0 - \alpha \leq 0,05$

$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{20}$

$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{3}{5}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^n$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^n$

d. **Déduction**

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{3}{5} < 1$

On en déduit que :

La suite (U_n) est convergente et

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

e. On sait que :

$\frac{1}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 10^{-5} \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-5}$

Or $\frac{1}{20} \times \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 10^{-5}$

$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 2 \times 10^{-5}$

$\Leftrightarrow -n \ln\left(\frac{5}{3}\right) \leq \ln 2 - 5 \ln 10$

$\Leftrightarrow n \geq \frac{5 \ln 10 - \ln 2}{\ln 5 - \ln 3}$

$\Leftrightarrow n \geq 21,18$

D'où $|U_n - \alpha| \leq 10^{-5} \forall n \geq 22$

A partir de la valeur $n_0 = 22$ de n on est sûr que U_n représente une valeur approchée de α à 10^{-5} près

PROBLEME 17

PARTIE A

$f(x) = x^2e^{-x}; D_f = \mathbb{R}$

1. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2. $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$

3. $\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $(2x - x^2)$

$2x - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 2$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; 0[, f'(x) < 0$

$\forall x \in]0; 2[, f'(x) > 0$

$\forall x \in]2; +\infty[, f'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[, f$ est croissante

Sur $]0; 2[, f$ est décroissante

Sur $]2; +\infty[, f$ est croissante


Tableau de variation de f

| | | | | |
|---------|-----------|--------|----------------|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | - | 0 | + | 0 |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ 0 | ↗ $4e^{-2}$ | ↘ 0 |

4. $(T): y = f'(-1)(x + 1) + f(-1)$

Alors (T): $y = e(3x - 2)$

5. Tracer de (T) et (C)



PARTIE B

1. $J = \int_0^1 xe^{-x} dx$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

$J = [-xe^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx$

$J = [-(x + 1)e^{-x}]_0^1$

$J = 1 - \frac{2}{e}$

2. $f'(x) + f(x) = (2x - x^2)e^{-x} + x^2e^{-x}$

On a donc $f'(x) + f(x) = 2xe^{-x}$

3. Dédution

$f'(x) + f(x) = 2xe^{-x}$

$\Leftrightarrow f(x) = 2xe^{-x} - f'(x)$

$\Leftrightarrow \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (2xe^{-x} - f'(x)) dx$

$\Leftrightarrow \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 2xe^{-x} dx -$

$\int_0^1 f'(x) dx$

$\Leftrightarrow \int_0^1 f(x)dx = 2 \int_0^1 xe^{-x} dx -$

$[f(x)]_0^1$

On en déduit que :

$\int_0^1 f(x)dx = 2J - f(1)$

Car $f(0) = 0$

4. $\mathcal{A} = ua \times \int_0^1 f(x)dx$

$\int_0^1 f(x)dx = 2 - \frac{5}{e}$

$ua = 16 \text{ cm}^2$

$\mathcal{A} = 16 \left(2 - \frac{5}{e} \right) \text{ cm}^2$

PARTIE C

1. La droite d'équation $y = f(2)$ coupe (C) en deux points d'abscisses respectives 2 et α comme l'indique le graphique et on a : $\alpha \in I = [-1; 0]$

2. $g(x) = \left(-\frac{2}{e}\right)e^{\frac{x}{2}}; D_g = I = [-1; 0]$

$g(x) = x$

$\Leftrightarrow \left(-\frac{2}{e}\right)e^{\frac{x}{2}} = x$

$\Leftrightarrow xe^{-\frac{x}{2}} = -\frac{2}{e}$

$\Leftrightarrow x^2e^{-x} = \frac{4}{e^2} = 4e^{-2}$

$\Leftrightarrow f(x) = f(2)$

On en déduit que :

α est l'unique solution de l'équation $g(x) = x$ car d'après 1.), α est l'unique solution de l'équation $f(x) = f(2)$ sur I

$$3. \forall x \in [-1; 0], -\frac{1}{2} \leq \frac{x}{2} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{2}} \leq e^{\frac{x}{2}} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -\frac{2}{e} \leq \left(-\frac{2}{e}\right) e^{\frac{x}{2}} \leq -\frac{2}{e^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{Or } \left[-\frac{2}{e}; -\frac{2}{e^{\frac{3}{2}}}\right] \subset [-1; 0]$$

$$\text{D'où } \forall x \in [-1; 0], g(x) \in [-1; 0]$$

$$4. g'(x) = \left(-\frac{1}{e}\right) e^{\frac{x}{2}}$$

$$\forall x \in [-1; 0], -\frac{1}{2} \leq \frac{x}{2} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{2}} \leq e^{\frac{x}{2}} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{e} \leq \left(-\frac{1}{e}\right) e^{\frac{x}{2}} \leq -\frac{1}{e^{\frac{3}{2}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{e^{\frac{3}{2}}} \leq |g'(x)| \leq \frac{1}{e}$$

$$\text{Donc } \forall x \in [-1; 0], |g'(x)| \leq \frac{1}{e}$$

5. Dédution

On sait que $\alpha \in [-1; 0]$ et

$$\forall x \in [-1; 0], |g'(x)| \leq \frac{1}{e}$$

D'après l'inégalité de la moyenne, on a :

$$\left| \int_{\alpha}^x g'(t) dt \right| \leq \frac{1}{e} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |[g(t)]_{\alpha}^x| \leq \frac{1}{e} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{1}{e} |x - \alpha|$$

Or $g(\alpha) = \alpha$ d'après PARTIE C 2.)

D'où

$$\forall x \in [-1; 0], |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{e} |x - \alpha|$$

$$6. U_0 = -0,5 \text{ et } U_{n+1} = g(U_n) \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a. U_0 = -0,5 \in [-1; 0]$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in [-1; 0]$

et montrons que $U_{n+1} \in [-1; 0]$

En effet :

$$U_n \in [-1; 0] \Rightarrow g(U_n) \in [-1; 0]$$

Car $\forall x \in [-1; 0], g(x) \in [-1; 0]$

Or par définition $U_{n+1} = g(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [-1; 0]$ si $U_n \in [-1; 0]$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [-1; 0]$$

b. On sait que :

$$\forall x \in [-1; 0], |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{e} |x - \alpha|$$

Remplaçons x par U_n dans cette inégalité

$$\text{On a : } |g(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{e} |U_n - \alpha|$$

Or par définition $U_{n+1} = g(U_n)$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{e} |U_n - \alpha|$$

c. En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{e} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{e} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{e} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{e} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{e}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |-0,5 - \alpha|$$

$$-1 \leq \alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -0,5 \leq U_0 - \alpha \leq 0,5$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{e}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{e}\right)^n$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2e^n}$$

$$d. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2e^n} = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{e} < 1$$

On en déduit que :

La suite (U_n) est convergente et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

$$e. \text{ On sait que : } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2e^n}$$

$$\text{Donc } \frac{1}{2e^n} \leq 10^{-6} \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-6}$$

$$\text{Or } \frac{1}{2e^n} \leq 10^{-6}$$

$$\Leftrightarrow -n \leq -6 \ln 10 + \ln 2$$

$$\Leftrightarrow n \geq 6 \ln 10 - \ln 2$$

$$\Leftrightarrow n \geq 13,12$$

$$\text{D'où } |U_n - \alpha| \leq 10^{-6} \forall n \geq 14$$

On conclut donc que :

La plus petite valeur de n cherché est donc $n_0 = 14$

PROBLEME 18

PARTIE A

$$g(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln x ;$$

$$D_g =]0; +\infty[$$

1. $g'(x) = -4x^2 \ln x$

$$\forall x \in]0; +\infty[, 4x^2 > 0$$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $-\ln x$

$$-\ln x > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) < 0$$

Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{cases}$$

Tableau de variations de g

| | | | |
|---------|---|-------|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | + | 0 - |
| $g(x)$ | 1 | ↗ 2 ↘ | $-\infty$ |

2. Sur $]0; 1]$, $g(x) > 0$ car $g(x) \in]1; 2]$
 Sur $]1; +\infty[$, g est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors g réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur $] -\infty; 2[$ et $0 \in] -\infty; 2[$.

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]1; +\infty[$

$$\begin{cases} g(1,89) = 0,02 > 0 \\ g(1,90) = -0,02 < 0 \end{cases}$$

$$\text{On a : } g(1,89) \times g(1,90) < 0$$

$$\text{Donc } 1,89 < \alpha < 1,90$$

3. Signe de $g(x)$

$$\forall x \in]0; \alpha[, g(x) > 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$$

PARTIE B

$$f(x) = \frac{\ln x}{1+x^2}; D_f =]0; +\infty[$$

1. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2+1} = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{1+x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x^2+1} = 0 \end{cases}$$

Déduction

(\mathcal{C}) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ et une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

2. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2) - 2x \ln x}{(1+x^2)^2}$
 $\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1+x^2 - 2x^2 \ln x}{x(1+x^2)^2}$

$$\text{Alors } f'(x) = \frac{g(x)}{x(1+x^2)^2}$$

D'après PARTIE A

$$\forall x \in]0; \alpha[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; \alpha[$, f est croissante

Sur $]\alpha; +\infty[$, f est décroissante

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| x | 0 | α | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + | 0 - |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ $f(\alpha)$ ↘ | 0 |

3. $f(\alpha) = \frac{\ln \alpha}{1+\alpha^2}$

$$\text{Or } g(\alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 + \alpha^2 - 2\alpha^2 \ln \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln \alpha = \frac{1+\alpha^2}{2\alpha^2}$$

$$\text{D'où } f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$$

Encadrement de $f(\alpha)$

$$1,89 < \alpha < 1,90$$

$$\Leftrightarrow 7,1442 < 2\alpha^2 < 7,22$$


$$\Leftrightarrow 0,1385 < \frac{1}{2\alpha^2} < 0,1399$$

Donc à 2×10^{-3} près on a :
 $0,138 < f(\alpha) < 0,140$

4. (T): $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

Alors (T): $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

5. Tracer de (T) et (C)



PARTIE C

$$F(x) = \int_1^x f(t)dt; D_F =]0; +\infty[$$

1. F est la primitive de f sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1.

**Donc F est dérivable sur $]0; +\infty[$
 $\forall x \in]0; +\infty[, F'(x) = f(x)$**

2. $\forall t \geq 1, (1+t)^2 = 1 + 2t + t^2$

$$\Leftrightarrow t^2 \leq 1 + t^2 \leq (1+t)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(1+t)^2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq \frac{1}{t^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln t}{(1+t)^2} \leq \frac{\ln t}{1+t^2} \leq \frac{\ln t}{t^2}$$

Car $\forall t \geq 1, \ln t \geq 0$

Donc $\forall t \geq 1, \frac{\ln t}{(1+t)^2} \leq f(t) \leq \frac{\ln t}{t^2}$

3. $I(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt$ et $J(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$

a. Calcul de $I(x)$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(t) = \ln t \\ v'(t) = \frac{1}{t^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(t) = \frac{1}{t} \\ v(t) = -\frac{1}{t} \end{cases}$$

$$I(x) = \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} dt$$

$$I(x) = \left[-\frac{\ln t}{t} - \frac{1}{t} \right]_1^x$$

$$I(x) = 1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$$

b. Calcul de $J(x)$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(t) = \ln t \\ v'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(t) = \frac{1}{t} \\ v(t) = -\frac{1}{1+t} \end{cases}$$

$$J(x) = \left[-\frac{\ln t}{1+t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t(1+t)} dt$$

Or $\frac{1}{t(1+t)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}$ et $t > 0$

D'où $J(x) = \left[-\frac{\ln t}{1+t} + \ln\left(\frac{t}{1+t}\right) \right]_1^x$

$$J(x) = \ln 2 + \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) - \frac{\ln x}{1+x}$$

c. On sait que :

$$\forall t \geq 1, \frac{\ln t}{(1+t)^2} \leq f(t) \leq \frac{\ln t}{t^2}$$

$$\Leftrightarrow \int_1^x \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt \leq \int_1^x f(t)dt \leq \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt$$

$$\Leftrightarrow J(x) \leq F(x) \leq I(x)$$

On en déduit que : $\forall x > 1$

$$\begin{aligned} \ln 2 + \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) - \frac{\ln x}{1+x} &\leq F(x) \\ &\leq 1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

4. Soit $x > 1$

a. **Interprétation graphique de $F(x)$**

$F(x)$ est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $t = 1$ et $t = x$

b. $\mathcal{A} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

$$J(x) \leq F(x) \leq I(x)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} J(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} I(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} J(x) = \ln 2 \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{1+x} = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} I(x) = 1 \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$$

On en déduit que :
 $\ln 2 \leq \mathcal{A} \leq 1$

PARTIE D

$$1. G'(x) = -\frac{1}{x^2}F'\left(\frac{1}{x}\right) - F'(x); x > 0$$

$$\Leftrightarrow G'(x) = -\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right) - f(x)$$

$$\Leftrightarrow G'(x) = -\frac{1}{x^2}\left[f\left(\frac{1}{x}\right) + x^2f(x)\right]$$

$$\text{Donc } \forall x > 0; G'(x) = 0$$

$$\text{Car } f\left(\frac{1}{x}\right) = -x^2f(x)$$

$$2. G'(x) = 0 \Leftrightarrow G(x) = K; K \in \mathbb{R}$$

$$\text{On a } G(1) = K = F(1) - F(1) = 0$$

$$\text{Donc } \forall x > 0; G(x) = 0$$

$$3. \forall x > 0; G(x) = 0 \Leftrightarrow F(x) = F\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\text{Posons } X = \frac{1}{x}$$

$$\text{Si } x \rightarrow 0^+, X \rightarrow +\infty$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} F(X) = \mathcal{A}$$

PROBLEME 19

PARTIE A

$$g(x) = x - e^{x-1}; D_g = \mathbb{R}$$

1.

$$a. g'(x) = 1 - e^{x-1}$$

$$1 - e^{x-1} > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

$$\forall x \in]-\infty; 1[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 1[$, g est croissanteSur $]1; +\infty[$, g est décroissante

$$b. g(1) = 0$$

 $g(1)$ est le maximum de g sur \mathbb{R}

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq g(1) = 0$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq 0$$

$$c. \forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x - e^{x-1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow xe^{-x} - e^{-1} \leq 0$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, xe^{-x} \leq \frac{1}{e}$$

D'autres parts :

$$xe^{-x} \leq \frac{1}{e} \Leftrightarrow xe^{-x} \leq \frac{1}{e} < 1$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, 1 - xe^{-x} > 0$$

$$2. f(x) = \frac{1}{1 - xe^{-x}};$$

$$a. D_f = \{x \in \mathbb{R} / 1 - xe^{-x} \neq 0\}$$

 $1 - xe^{-x} \neq 0$ est toujours vrai car

$$\forall x \in \mathbb{R}, 1 - xe^{-x} > 0$$

$$\text{Et donc } D_f = \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{1}{1 - xe^{-x}} = \frac{1}{1 - \frac{x}{e^x}}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$$

b. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} -x = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$$

$$c. f'(x) = \frac{e^{-x}(1-x)}{(1-xe^{-x})^2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0 \text{ et } (1 - xe^{-x})^2 > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $1 - x$

$$1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 1[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 1[$, f est croissante

Sur $]1; +\infty[$, f est décroissante


Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ |
| $f(x)$ | | $\frac{e}{e-1}$ | |
| | 0 | | 1 |

d. $(T): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

Alors $(T): y = x + 1$

e. Tracer de (T) et (C)



3.

a. Image de $[0; 1]$ et $[1; +\infty[$ par f

$f([0; 1]) = \left[1; \frac{e}{e-1}\right]$

$f([1; +\infty[) = \left]1; \frac{e}{e-1}\right]$

b. **Déduction**

$\forall x \in [0; 1], 1 \leq f(x) \leq \frac{e}{e-1}$

$\forall x \in [1; +\infty[, 1 < f(x) \leq \frac{e}{e-1}$

On en déduit que :

$\forall x \in [0; +\infty[, 1 \leq f(x) \leq \frac{e}{e-1}$

PARTIE B

1. $I = \int_0^1 f(x) dx$

Interprétation graphique

I est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations

$x = 0$ et $x = 1$

2. $J_n = \int_0^1 x^n e^{-nx} dx; n$ entier non nul

a. $J_1 = \int_0^1 x e^{-x} dx$

Intégration par parties

$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$

$J_1 = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx$

$J_1 = [-(x+1)e^{-x}]_0^1$

$J_1 = 1 - \frac{2}{e}$

b. $H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$

$h(x) = x^2 e^{-2x}$

$H'(x) = [-2ax^2 + (2a - 2b)x + b - 2c]e^{-2x}$

$H'(x) = h(x)$

$\Leftrightarrow -2ax^2 + (2a - 2b)x + b - 2c = x^2$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -\frac{1}{2} \\ c = -\frac{1}{4} \end{cases}$

Et $H(x) = -\frac{1}{4}(2x^2 + 2x + 1)e^{-2x}$

Déduction

$J_2 = \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx = \int_0^1 h(x) dx$

$J_2 = [H(x)]_0^1$

On en déduit que :

$J_2 = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{5}{e^2}\right)$

3. $U_n = 1 + J_1 + J_2 + \dots + J_n; \forall n \in \mathbb{N}^*$

a. $\forall x \in \mathbb{R},$

$1 + x e^{-x} + x^2 e^{-2x} + \dots + x^n e^{-nx}$
 $= 1 + x e^{-x} + (x e^{-x})^2 + \dots + (x e^{-x})^n$

Or $1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$

Donc $\forall x \in \mathbb{R},$

**$1 + x e^{-x} + x^2 e^{-2x} + \dots + x^n e^{-nx}$
 $= \frac{1 - (x e^{-x})^{n+1}}{1 - x e^{-x}}$**

b. **Déduction**

$1 + x e^{-x} + x^2 e^{-2x} + \dots + x^n e^{-nx}$

$= \frac{1}{1 - x e^{-x}} - \frac{x^{n+1} e^{-(n+1)x}}{1 - x e^{-x}}$

$= f(x) - x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x)$

D'après la linéarité de l'intégrale, on a :

$\int_0^1 dx + \int_0^1 x e^{-x} dx + \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx +$

$\dots + \int_0^1 x^n e^{-nx} dx$

$= \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$

$\Leftrightarrow 1 + J_1 + J_2 + \dots + J_n$

$= I - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$

$\Leftrightarrow U_n = I - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$I - U_n = \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$

c. D'après A 1.c, on a :

$$\forall x \geq 0, 0 \leq x e^{-x} \leq \frac{1}{e}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} \leq \frac{1}{e^{n+1}}$$

Et D'après A 3.b, on a :

$$1 \leq f(x) \leq \frac{e}{e-1}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) \leq \frac{e}{e^{n+1}(e-1)}$$

Donc $\forall x \geq 0$,

$$0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

d. **Déduction**

$$0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx \leq \int_0^1 \frac{1}{e^n(e-1)} dx$$

On en déduit que :

$$0 \leq I - U_n \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

Convergence de la suite (U_n)

$$0 \leq I - U_n \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\Leftrightarrow I - \frac{1}{e^n(e-1)} \leq U_n \leq I$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^n(e-1)} = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{e} < 1$$

On conclut donc que la suite (U_n) converge vers I

4. $0 \leq I - U_2 \leq \frac{1}{e^2(e-1)}$

$$\text{Alors } U_2 \leq I \leq U_2 + \frac{1}{e^2(e-1)}$$

PROBLEME 20

$$\begin{cases} f(x) = (x+1)e^{1-x} & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = \frac{2}{x} - \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}; D_f = \mathbb{R}$$

PARTIE A

1. Continuité en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1)e^{1-x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x} - \ln x = 2$$

$$f(1) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

Alors f est continue en 1

Dérivabilité en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+1)e^{1-x} - 2}{x-1}$$

Posons $X = 1 - x$

Si $x \rightarrow 1^-$ alors $X \rightarrow 0^+$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2-X)e^{X-2} - 2}{-X} = e^X - 2 \cdot \frac{e^{X-1}}{X} = -1$$

$$\text{Car } \begin{cases} e^0 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{X-1}}{X} = 1 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{x} - \ln x - 2}{x-1}$$

Posons $X = x - 1$

Si $x \rightarrow 1^+$ alors $X \rightarrow 0^+$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 - (X+1) \ln(X+1) - 2(X+1)}{X(X+1)}$$

$$= \lim_{X \rightarrow 0^+} -\frac{2}{X+1} - \frac{\ln(X+1)}{X} = -3$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{X+1} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(X+1)}{X} = 1 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$$

Alors f n'est pas dérivable en 1

Interprétation graphique

Au point $(1; 2)$, (C) admet deux demi-tangentes d'équations :

$$(T_g): y = -x + 3$$

$$(T_d): y = -3x + 5$$

Le point $(1; 2)$ est donc un point anguleux pour (C)

2.

a. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-x} = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln x = +\infty \end{cases}$$

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right) e^{1-x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-x} = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$$

Interprétation graphique

(C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $-\infty$ et une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

3. Cas où $x < 1$

$$f'(x) = -xe^{1-x}$$

$$\forall x \in]-\infty; 1[, e^{1-x} > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $-x$

$$-x > 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]0; 1[, f'(x) < 0$$

Cas où $x \geq 1$

$$f'(x) = -\frac{2+x}{x^2}$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, x^2 > 0 \text{ et } 2+x > 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[, f$ est croissante

Sur $]0; 1[, f$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | | |
|---------|-----------|-----|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | $-$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ | e | 2 | $-\infty$ |

4. Sur $]1; +\infty[, f$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors f réalise une bijection de

$]1; +\infty[$ sur $] -\infty; 2[$ et $0 \in] -\infty; 2[$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet

une unique solution α sur $]1; +\infty[$

$$\begin{cases} f(2,3) = 0,03 > 0 \\ f(2,4) = -0,04 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(2,3) = 0,03 > 0 \\ f(2,4) = -0,04 < 0 \end{cases}$$

$$\text{On a : } f(2,3) \times f(2,4) < 0$$


$$\text{Donc } 2,3 < \alpha < 2,4$$

D'autres parts :

Sur $]-\infty; 1[, f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$

Donc l'autre point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses est le point de coordonnées $(-1; 0)$

5. Tracer de (C)



PARTIE B

1.

a. $\mathcal{A} = \int_1^\alpha f(x) dx$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \int_1^\alpha \left(\frac{2}{x} - \ln x\right) dx$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \int_1^\alpha \frac{2}{x} dx - \int_1^\alpha \ln x dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = x \end{cases}$$

$$\int_1^\alpha \ln x \, dx = [x \ln x]_1^\alpha - \int_1^\alpha dx$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = [(2-x) \ln x + x]_1^\alpha$$

On a donc :

$$\mathcal{A} = \alpha - 1 + (2 - \alpha) \ln \alpha$$

b. On sait que :

$$f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = \frac{2}{\alpha}$$

$$\text{D'où } \mathcal{A} = \alpha - 3 + \frac{4}{\alpha}$$

$$\text{Avec } p = 1; q = -3 \text{ et } r = 4$$

c. $2,3 < \alpha < 2,4$

$$\Leftrightarrow -0,7 < \alpha - 3 < -0,6 \text{ et}$$

$$1,66 < \frac{4}{\alpha} < 1,73$$

$$\text{Donc on a : } 0,9 < \mathcal{A} < 1,1$$

2. $\mathcal{V} = \pi \int_{-1}^0 f^2(x) dx$

$$\int_{-1}^0 f^2(x) dx = \int_{-1}^0 (x+1)^2 e^{2-2x} dx$$

1^{ère} intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = (x+1)^2 \\ v'(x) = e^{2-2x} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u'(x) = 2(x+1) \\ v(x) = -\frac{1}{2} e^{2-2x} \end{cases}$$

$$\int_{-1}^0 f^2(x) dx = \left[-\frac{1}{2} (x+1)^2 e^{2-2x} \right]_{-1}^0 +$$

$$\int_{-1}^0 (x+1) e^{2-2x} dx$$

$$\int_{-1}^0 (x+1) e^{2-2x} dx$$

2^{ème} Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = (x+1) \\ v'(x) = e^{2-2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -\frac{1}{2} e^{2-2x} \end{cases}$$

$$\int_{-1}^0 (x+1) e^{2-2x} dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2} (x+1) e^{2-2x} \right]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 \frac{1}{2} e^{2-2x} dx$$

$$\text{Donc on a : } \int_{-1}^0 f^2(x) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4} (2x^2 + 6x + 5) e^{2-2x} \right]_{-1}^0$$

$$\Leftrightarrow \int_{-1}^0 f^2(x) dx = \frac{e^4 - 5e^2}{4}$$

$$\text{Donc : } \mathcal{V} = \frac{\pi e^2}{4} (e^2 - 5) uv$$

PARTIE C

$$\begin{cases} x(t) = e^{-t} \\ y(t) = t + 2e^t, t < 0 \end{cases}$$

1. $x = e^{-t} \Leftrightarrow t = -\ln x$ et

$$y = -\ln x + 2e^{-\ln x} = -\ln x + \frac{2}{x}$$

Par ailleurs :

$$t < 0 \Leftrightarrow -t > 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-t} > 1$$

$$\Leftrightarrow x > 1$$

On a : $(\Gamma): y = f(x); x > 1$

On conclut donc que :

(Γ) est la partie de (C)

correspondant à $x > 1$

2. $\vec{V}(t) \begin{cases} x'(t) = -e^{-t} \\ y'(t) = 1 + 2e^t, t < 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x'(-\ln 2) = -2 \\ y'(-\ln 2) = 2 \end{cases}$$

$$\vec{V}(-\ln 2) \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Représentation graphique

$$M(-\ln 2)(2; 1 - \ln 2)$$

(Voir graphique)

PROBLEME 21

$$\begin{cases} f(x) = (x + 1) \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) & \text{si } x > -1; \\ f(-1) = 0 \end{cases}$$

$$D_f = [-1; +\infty[$$

PARTIE A

1. Continuité en -1

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x + 1) \ln\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

Posons $X = \frac{x+1}{2}$

Si $x \rightarrow -1^+$, alors $X \rightarrow 0^+$ et

$$\lim_{X \rightarrow 0^+} 2X \ln X = 0$$

Donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$$

Alors f est continue en -1

Dérivabilité en -1

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) = \lim_{X \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = -\infty$$

Alors f n'est pas dérivable en -1

Interprétation graphique

Au point de coordonnées $(-1; 0)$, (C) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas

2. $\forall x > -1, f'(x) = \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) + 1$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{e} - 1$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) > -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+1}{2} > e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{2}{e} - 1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in \left] -1; \frac{2}{e} - 1 \right[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in \left] \frac{2}{e} - 1; +\infty \right[, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $\left] -1; \frac{2}{e} - 1 \right[, f$ est décroissante

Sur $\left] \frac{2}{e} - 1; +\infty \right[, f$ est croissante

3.

a. $(T_0): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

Alors $(T_0): y = (1 - \ln 2)x - \ln 2$


$(T_1): y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

Alors $(T_1): y = x - 1$

b. Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|----|-------------------|-----------|
| x | -1 | $\frac{2}{e} - 1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | - | 0 |
| | | | + |
| $f(x)$ | 0 | | $+\infty$ |

4. Tracer de (C)



PARTIE B

$\forall t > -1,$

On pose $\mathcal{A}(t) = \int_0^t f(x) dx$

1. Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) \Rightarrow \\ v'(x) = x + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x+1} \\ v(x) = \frac{1}{2}(x + 1)^2 \end{cases}$$

$$\mathcal{A}(t) = \left[\frac{1}{2}(x + 1)^2 \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) \right]_0^t -$$

$$\int_0^t \frac{1}{2}(x + 1) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}(x+1)^2 \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) - \frac{1}{4}(x+1)^2 \right]_0^t$$

$$\mathcal{A}(t) = \frac{1}{2}(t+1)^2 \ln\left(\frac{t+1}{2}\right) - \frac{1}{4}(t+1)^2 + \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2}$$

2. Posons $u = \frac{t+1}{2}$

Si $t \rightarrow -1^+$ alors $u \rightarrow 0^+$ et

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} 2u^2 \ln u - u^2 + \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2} = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2}$$

Car $\lim_{u \rightarrow 0^+} u^2 \ln u = 0$ et $\lim_{u \rightarrow 0^+} u^2 = 0$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} \mathcal{A}(t) = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2}$$

3.

a. $\mathcal{A}_1 = ua \times \left(\lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} - \int_t^1 f(x) dx \right)$

$$\lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} - \int_t^1 f(x) dx$$

$$= \lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} \left(- \int_t^0 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right)$$

$$= \lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} \left(\int_0^t f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right)$$

$$= \lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} (\mathcal{A}(t) - \mathcal{A}(1))$$

$$ua = 4 \text{ cm}^2$$

Donc on a :

$$\mathcal{A}_1 = 4 \left(\lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} \mathcal{A}(t) - \mathcal{A}(1) \right)$$

b. $\lim_{\substack{t \rightarrow -1 \\ t > -1}} \mathcal{A}(t) = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2}$

$$\mathcal{A}(1) = -\frac{3}{4} + \frac{\ln 2}{2}$$

On en déduit que :

$$\mathcal{A}_1 = 4 \text{ cm}^2$$

PARTIE C

1. Sur $[0; +\infty[$, g est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors g réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $I = [-\ln 2; +\infty[$

2. (C') est la symétrique de la partie de (C) correspondant à $[0; +\infty[$ par rapport à la droite d'équation $y = x$ (Voir le graphique)

3. $\mathcal{A}_2 = ua \times \int_{-\ln 2}^0 (g^{-1}(x) - f(x)) dx$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A}_2 = 4 \left(- \int_{-\ln 2}^0 f(x) dx + \int_{-\ln 2}^0 g^{-1}(x) dx \right)$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A}_2 = 4 \left(\int_0^{-\ln 2} f(x) dx + \int_{-\ln 2}^0 g^{-1}(x) dx \right)$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A}_2 = 4 \left(\int_0^{-\ln 2} f(x) dx + \int_{-\ln 2}^0 g^{-1}(x) dx \right)$$

$$\int_{-\ln 2}^0 g^{-1}(x) dx$$

Or par symétrie :

$$\int_{-\ln 2}^0 g^{-1}(x) dx = - \int_0^1 f(x) dx$$

D'où

$$\mathcal{A}_2 = 4 \left(\int_0^{-\ln 2} f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right)$$

On a donc :

$$\mathcal{A}_2 = 4(\mathcal{A}(-\ln 2) - \mathcal{A}(1))$$

PARTIE D

$$\begin{cases} x(t) = 2e^{-t} - 1 \\ y(t) = -2te^{-t} \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

1. $x = 2e^{-t} - 1 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{x+1}{2}$ et

$$\Leftrightarrow t = \ln\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

Par conséquent :

$$y = -(x+1) \ln\left(\frac{x+1}{2}\right) = -f(x)$$

Par ailleurs :

$$t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e^{-t} > 0$$

$$\Leftrightarrow 2e^{-t} - 1 > -1$$

$$\Leftrightarrow x > -1$$

En conclusion :

$$(\Gamma): y = -f(x); x > -1$$

(\Gamma) et (C) sont donc symétriques par rapport à l'axe des abscisses

2. Pour la construction, voir graphique

PROBLEME 22

PARTIE A

1. $g(x) = \frac{(x+1)^2}{x^2+1}; D_g = \mathbb{R}$

a. $g'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$

$\forall x \in \mathbb{R}, (1+x^2)^2 > 0$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $1-x^2$

$1-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; -1[, g'(x) < 0$

$\forall x \in]-1; 1[, g'(x) > 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; -1[, g$ est décroissante

Sur $]-1; 1[, g$ est croissante

Sur $]1; +\infty[, g$ est décroissante

Tableau de variations de g

| | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| x | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ | |
| $g'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ |
| $g(x)$ | | | | | |

b. D'après ce tableau de variation

0 est le minimum de g sur \mathbb{R}

2 est le maximum de g sur \mathbb{R}

Par conséquent :

$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq g(x) \leq 2$

c. $g''(x) = \frac{4x(x^4-2x^2-3)}{(1+x^2)^4}$

$g''(x) = \frac{4x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}$

$\forall x \in [1; +\infty[, 4x > 0$ et

$(1+x^2)^3 > 0$

Alors le signe de $g''(x)$ dépend de celui de x^2-3

$x^2-3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$

Par conséquent :

$\forall x \in [1; \sqrt{3}[, g''(x) < 0$

$\forall x \in]\sqrt{3}; +\infty[, g''(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $[1; \sqrt{3}[, g'$ est décroissante

Sur $]\sqrt{3}; +\infty[, g'$ est croissante

d. Dédution

Tableau de variations de g'

| | | | |
|----------|-----|------------|-----------|
| x | 1 | $\sqrt{3}$ | $+\infty$ |
| $g''(x)$ | $-$ | 0 | $+$ |
| $g'(x)$ | | | |

D'après ce tableau :

$\forall x \in [1; +\infty[, -\frac{1}{4} \leq g'(x) \leq 0$

On en déduit que :

$\forall x \in [1; +\infty[, |g'(x)| \leq \frac{1}{4}$

2. $f(x) = 1 + \ln[g(x)]; D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

a. $f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)(x+1)^2}$

$\forall x \in D_f, (1+x^2) > 0$ et

$(x+1)^2 > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $1-x^2$

$1-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; -1[, f'(x) < 0$

$\forall x \in]-1; 1[, f'(x) > 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; -1[, f$ est décroissante


Sur $]-1; 1[, f$ est croissante

Sur $]1; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variations de f

| | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| x | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ | |
| $f'(x)$ | $-$ | | $+$ | 0 | $-$ |
| $f(x)$ | | | | | |

b. Tracer de (C_f)



- c.** Sur $[0; +\infty[$,
 1 est le minimum de f
 $1 + \ln 2$ est le maximum de f

Donc $\forall x \in [0; +\infty[$,
 $1 \leq f(x) \leq 1 + \ln 2 < 2$
car $\ln 2 < 1$

- d.** $f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$
 D'après 1.) $\forall x \in [1; 2]$,
 On a : $|g'(x)| \leq \frac{1}{4}$ et $1 \leq g(x) \leq 2$
 $\Leftrightarrow |g'(x)| \leq \frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{g(x)} \leq 1$
 $\Leftrightarrow \left| \frac{g'(x)}{g(x)} \right| \leq \frac{1}{4}$

Donc $\forall x \in [1; 2]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$

- e.** L'équation $f(x) = m$ admet :
 Deux solutions si $m \in]-\infty; 1[$
 Une solution si $m = 1$
 Deux solutions si $m \in]1; 1 + \ln 2[$
 Une solution si $m = 1 + \ln 2$
 Zéro solution si $m \in]1 + \ln 2; +\infty[$

PARTIE B

$U_0 = \frac{1}{5}$ et $U_{n+1} = f(U_n) \forall n \in \mathbb{N}$

1. Voir figure
2. $U_1 = 1 + \ln\left(\frac{18}{13}\right) \approx 1,32$
 On a : $1 < U_1 < 2$
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, supposons que $1 < U_n < 2$
 et montrons que $1 < U_{n+1} < 2$
 $1 < U_n < 2 \Rightarrow 1 < f(U_n) < 2$
 Car $\forall x \in [1; 2] \subset [0; +\infty[$,
 $1 < f(x) < 2$
 Or par définition $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où $1 < U_{n+1} < 2$ si $1 < U_n < 2$

On conclut donc que :
 $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 < U_n < 2$

- 3.** $h(x) = f(x) - x; D_h = [1; 2]$
a. $h'(x) = f'(x) - 1$
 $\forall x \in [1; 2], f'(x) < 0$
 $\Leftrightarrow f'(x) - 1 < 0$

Par conséquent :

$\forall x \in [1; 2], h'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $[1; 2]$, h est décroissante

b. Déduction

$f(x) = x \Leftrightarrow h(x) = 0$

Sur $[1; 2]$, h est continue car dérivable et est strictement décroissante

$\begin{cases} h(1) = \ln 2 > 0 \\ h(2) = -0,4 < 0 \end{cases}$

On a : $h(1) \times h(2) < 0$

Alors l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α comprise entre 1 et 2 ce qui montre aussi que α est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$

- 4.** On sait que :
 $\forall x \in [1; 2], |f'(x)| \leq \frac{1}{4}$; $\alpha \in [1; 2]$ et
 $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n \in [1; 2]$

D'où d'après l'inégalité de la moyenne on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$\left| \int_{\alpha}^{U_n} f'(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

$\Rightarrow |[f(x)]_{\alpha}^{U_n}| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

$\Rightarrow |f(U_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

Or $f(\alpha) = \alpha$ et $f(U_n) = U_{n+1}$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

Déduction

En partant de cette inégalité on a :

$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_1 - \alpha|$

$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_2 - \alpha|$

$n = 3 \Rightarrow |U_4 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_3 - \alpha|$

⋮

$n = n \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_{n-1} - \alpha|$

Faisons le produit membre à membre de ces $(n - 1)$ inégalités. On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} |U_1 - \alpha|$$

$$|U_1 - \alpha| = \left|1 + \ln\left(\frac{18}{13}\right) - \alpha\right|$$

$$1 < \alpha < 2$$

$$\Leftrightarrow -1 + \ln\left(\frac{18}{13}\right) < U_1 - \alpha < \ln\left(\frac{18}{13}\right)$$

$$\Leftrightarrow -0,68 < U_1 - \alpha < 0,32 < 0,68$$

$$\Leftrightarrow |U_1 - \alpha| < 0,68 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} |U_1 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \times 1$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

Par ailleurs :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{4} < 1$$

Alors la suite (U_n) converge vers α et on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

PROBLEME 23

PARTIE A

$$g(x) = 1 + (1 - x)e^{-x}; D_g = \mathbb{R}$$

1. $g'(x) = (x - 2)e^{-x}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $x - 2$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 2[, g'(x) < 0$$

$$\forall x \in]2; +\infty[, g'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 2[, g$ est décroissante

Sur $]2; +\infty[, g$ est croissante

Tableau de variation de g

| | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| x | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | - | 0 | + |
| $g(x)$ | $+\infty$ | $1 - e^{-2}$ | 1 |

Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0 \end{cases}$$

2. g décroît sur $]-\infty; 2[$ et croît sur $]2; +\infty[$ alors $g(2)$ est le minimum de g sur \mathbb{R}

Par conséquent :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq g(2)$$

$$\text{Or } g(2) = 1 - e^{-2} > 0$$

$$\text{Alors } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) > 0$$

PARTIE B

$$f(x) = x - 1 + xe^{-x}; D_f = \mathbb{R}$$

1. $f'(x) = g(x)$

Donc d'après PARTIE A :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R}, g est croissante

2. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \end{cases}$$

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | - |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

3. Sur \mathbb{R} , f est continue car dérivable et est strictement croissante

Alors f réalise une bijection de \mathbb{R} sur $]-\infty; +\infty[$ et $0 \in]-\infty; +\infty[$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans \mathbb{R}

Vérification

$$\begin{cases} f(0) = -1 < 0 \\ f(1) = e^{-1} > 0 \end{cases}$$

$$\text{On a : } f(0) \times f(1) < 0$$

$$\text{Alors } 0 < \alpha < 1$$

4. (D): $y = x - 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$$

Alors la droite (D) est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$

Position de (C) et (D)

$$f(x) - y = x e^{-x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$$

Alors le signe de $f(x) - y$ dépend de celui de x

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, f(x) - y < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, f(x) - y > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[$, (C) est en dessous de (D)

Sur $]0; +\infty[$, (C) est au dessus de (D)

5. Coordonnées de A

La tangente en A à (C) a pour coefficient directeur $f'(x_A)$ (D) a pour coefficient directeur 1

On a donc :

$$f'(x_A) = 1$$

$$\Leftrightarrow (1 - x_A)e^{-x_A} = 0$$

$$\Leftrightarrow x_A = 1 \text{ car } e^{-x_A} > 0$$


$$y_A = f(1) = e^{-1}$$

$$\text{Donc } A(1; e^{-1})$$

6. (T): $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

$$\text{Alors (T): } y = 2x - 1$$

7. Tracer de (D), (T) et (C) ainsi que la tangente à (C) en A



8. $\mathcal{A}(\lambda) = ua \int_0^\lambda [f(x) - y] dx$

$\int_0^\lambda [f(x) - y] dx = \int_0^\lambda xe^{-x} dx$

Intégration par parties

$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$

$\int_0^\lambda xe^{-x} dx = [-xe^{-x}]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} dx$

$\Leftrightarrow \int_0^\lambda xe^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^\lambda$

$\Leftrightarrow \int_0^\lambda xe^{-x} dx = 1 - (\lambda + 1)e^{-\lambda}$

$ua = 4cm^2$

Donc $\mathcal{A}(\lambda) = 4[1 - (\lambda + 1)e^{-\lambda}] cm^2$

$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} = 0$

$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0$

Alors $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 4$

PARTIE C

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$

$\Leftrightarrow x - 1 + xe^{-x} = 0$

$\Leftrightarrow xe^x - e^x + x = 0$

$\Leftrightarrow e^x = x(e^x + 1)$

$\Leftrightarrow \frac{e^x}{e^x+1} = x$

Alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^x}{e^x+1} = x$

2. $h(x) = \frac{e^x}{e^x+1}; D_h = [0; 1]$

a. $h'(x) = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} > 0 \forall x \in [0; 1]$

On en déduit que :

Sur $[0; 1], h$ est croissante

| | | |
|---------|---------------|-----------------|
| x | 0 | 1 |
| $h'(x)$ | | - |
| $h(x)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{e}{e+1}$ |

b. Déduction

D'après ce tableau de variation,

$\forall x \in [0; 1], h(x) \in \left[\frac{1}{2}; \frac{e}{e+1}\right]$

Or $\left[\frac{1}{2}; \frac{e}{e+1}\right] \subset [0; 1]$

D'où $\forall x \in [0; 1], h(x) \in [0; 1]$

3. $h''(x) = \frac{e^x(1-e^{2x})}{(e^x+1)^4}$

$\forall x \in [0; 1], \frac{e^x}{(e^x+1)^4} > 0$

$0 \leq 2x \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq e^{2x} \leq e^2$

$\Leftrightarrow 1 - e^2 \leq 1 - e^{2x} \leq 0$

Par conséquent :

$\forall x \in [0; 1], h''(x) \leq 0$

On en déduit que :

Sur $[0; 1], h'$ est décroissante

Et $\forall x \in [0; 1], h'(1) \leq h'(x) \leq h'(0)$

$\Leftrightarrow \frac{e}{(e+1)^2} \leq h'(x) \leq \frac{1}{4}$

Donc $\forall x \in [0; 1], 0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{4}$

4. $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = h(U_n) \end{cases}$

a. $U_0 = 0 \in [0; 1]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in [0; 1]$

et montrons que $U_{n+1} \in [0; 1]$

En effet :

$U_n \in [0; 1] \Rightarrow h(U_n) \in [0; 1]$

Car $\forall x \in [0; 1], h(x) \in [0; 1]$

Or par définition $U_{n+1} = h(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [0; 1]$ si $U_n \in [0; 1]$

On conclut donc que :

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [0; 1]$

b. On sait que :

$\forall x \in [1; 2], |h'(x)| \leq \frac{1}{4}; \alpha \in [0; 1]$ et

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [0; 1]$

D'où d'après l'inégalité de la

moyenne on a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$\left| \int_\alpha^{U_n} h'(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

$\Rightarrow |[h(x)]_\alpha^{U_n}| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

$\Rightarrow |h(U_n) - h(\alpha)| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

Or $h(\alpha) = \alpha$ d'après 1.) et

$U_{n+1} = h(U_n)$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_n - \alpha|$

c. Déduction

En partant de cette inégalité on a :

$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_0 - \alpha|$

$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_1 - \alpha|$

$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_2 - \alpha|$

⋮

$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{4} |U_{n-1} - \alpha|$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |-\alpha|$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq -\alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \times 1$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

Par ailleurs :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{4} < 1$$

Alors la suite (U_n) converge et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

Ceci montre que la suite (U_n) converge vers α

d. D'après ce qui précède,

$$\left(\frac{1}{4}\right)^p \leq 10^{-6} \Rightarrow |U_p - \alpha| \leq 10^{-6}$$

$$\text{Or } \left(\frac{1}{4}\right)^p \leq 10^{-6}$$

$$\Leftrightarrow -p \ln 4 \leq -6 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 9,96$$

$$\text{Donc } |U_p - \alpha| \leq 10^{-6} \forall p \geq 10$$

Par exemple, pour $p = 10$, U_p est une valeur approchée à 10^{-6} près de α

PROBLEME 24

PARTIE A

$$f(x) = e^{-x} \sin x; D_f = \mathbb{R}$$

1. On sait que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin x \leq 1 \text{ et } e^{-x} > 0$$

D'où $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$$-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$$

Déduction

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et la courbe

(C_f) admet une asymptote

horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

2. $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$

$$\text{Or } \cos x - \sin x$$

$$= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos x - \sin \frac{\pi}{4} \sin x \right)$$

D'où $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'(x) = \sqrt{2} e^{-x} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$$

3. $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \pi \right], \sqrt{2} e^{-x} > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \pi \right], x + \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right] \text{ et}$$

$$\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 0 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4} \right], f'(x) \geq 0$$

$$\forall x \in \left[\frac{\pi}{4}; \pi \right], f'(x) \leq 0$$

On en déduit que :


Sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4} \right]$, f est croissante

Sur $\left[\frac{\pi}{4}; \pi \right]$, f est décroissante

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|----------------------|---|-------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{4}$ | π |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | $-e^{\frac{\pi}{2}}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}}$ | 0 |

4. Tracer des courbes (C_f) , (C_1) et (C_2)



5.
a. $f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0$
 $\Leftrightarrow x = k\pi$

Sur \mathbb{R} , les points communs de (C_f) et l'axe des abscisses sont les points de coordonnées $(k\pi; 0), k \in \mathbb{Z}$

Sur $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$, les points communs de (C_f) et l'axe des abscisses sont les points de coordonnées $(0; 0)$ et $(\pi; 0)$

b. $f(x) = -e^{-x} \Leftrightarrow \sin x = -1$
 $\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Sur \mathbb{R} , les points communs de (C_f) et (C_1) sont les points de coordonnées $(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi; -e^{\frac{\pi}{2} - 2k\pi}), k \in \mathbb{Z}$

Sur $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$, le point commun de (C_f) et (C_1) est le point de coordonnées $(-\frac{\pi}{2}; -e^{\frac{\pi}{2}})$

c. $f(x) = e^{-x} \Leftrightarrow \sin x = 1$
 $\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Sur \mathbb{R} , les points communs de (C_f) et (C_2) sont les points de coordonnées $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi; e^{-\frac{\pi}{2} - 2k\pi}), k \in \mathbb{Z}$

Sur $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$, le point commun de (C_f) et (C_2) est le point de coordonnées $(\frac{\pi}{2}; e^{-\frac{\pi}{2}})$

6. $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |e^{-x} \sin x| \leq e^{-x}$
Donc $e^{-x} \leq 10^{-2} \Rightarrow |f(x)| \leq 10^{-2}$
Or $e^{-x} \leq 10^{-2} \Leftrightarrow x \geq 2 \ln 10$

D'où $\forall x \geq 2 \ln 10, |f(x)| \leq 10^{-2}$
On en déduit que : $\alpha = 2 \ln 10$

PARTIE B

1. $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$
 $f''(x) = -2e^{-x} \cos x$
 $f^{(3)}(x) = 2e^{-x}(\cos x + \sin x)$
 $f^{(4)}(x) = -4e^{-x} \sin x$

On a donc :

$$f^{(4)}(x) = -4f(x) \Leftrightarrow f(x) = -\frac{1}{4}f^{(4)}(x)$$

2. $f(x) = -\frac{1}{4}f^{(4)}(x)$
 $\Leftrightarrow f(x) = -\frac{1}{4}[f^{(3)}(x)]'$

On en déduit que :

$$F(x) = -\frac{1}{4}f^{(3)}(x)$$

3. $I = \int_0^\pi e^{-x} \sin x \, dx$
 $I = \left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x + \sin x)\right]_0^\pi$

$$I = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$$

PARTIE C

$$I_n = \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} f(x) \, dx$$

1. $I_0 = \int_0^\pi f(x) \, dx = I$

Interprétation graphique

I_0 est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \pi$

2. $I_n = \left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x + \sin x)\right]_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}$
 $I_n = \frac{e^{-(2n+1)\pi} + e^{-2n\pi}}{2}$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \frac{e^{-2n\pi}}{2} (e^{-\pi} + 1)$

$$3. I_{n+1} = \frac{e^{-2(n+1)\pi}}{2} (e^{-\pi} + 1)$$

$$\frac{I_{n+1}}{I_n} = e^{-2\pi} \Leftrightarrow I_{n+1} = e^{-2\pi} \times I_n$$

Alors la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $e^{-2\pi}$ et de premier terme $I_0 = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$

$$4. 0 < e^{-\pi} < 1$$

Alors la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$

PROBLEME 25**PARTIE A**

$$g(x) = (x - 1)e^x + x^2; D_g = \mathbb{R}$$

$$1. g'(x) = x(e^x + 2)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x + 2 > 0$$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de x

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, g'(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, g'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[$, g est décroissante

Sur $]0; +\infty[$, g est croissante

Tableau de variations de g

| | | | |
|---------|-----------|------|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ |
| $g(x)$ | $+\infty$ | -1 | $+\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{cases}$$

2. Sur $[0; +\infty[$, g est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors g réalise une bijection de

$[0; +\infty[$ sur $[-1; +\infty[$ et $0 \in [0; +\infty[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution α et une seule sur l'intervalle $[0; +\infty[$

$$\begin{cases} g\left(\frac{1}{2}\right) = -0,57 < 0 \\ g(1) = 1 > 0 \end{cases}$$

$$\text{On a : } g\left(\frac{1}{2}\right) \times g(1) < 0$$

Donc α est dans l'intervalle

$$I = \left[\frac{1}{2}; 1\right]$$

3. Signe de $g(x)$

$$\forall x \in]0; \alpha[; g(x) < 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[; g(x) > 0$$

PARTIE B

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x+x}; D_f = [0; +\infty[$$

1. $\forall x \geq 0, f(x) = x$

$$\Leftrightarrow \frac{e^x}{e^x+x} = x$$

$$\Leftrightarrow (x-1)e^x + x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow g(x) = 0$$

Donc les équations $f(x) = x$ et $g(x) = 0$ sont équivalentes sur $[0; +\infty[$

D'après PARTIE A 2, α est la seule solution de l'équation $g(x) = 0$ sur $[0; +\infty[$

Par conséquent :
 α est aussi la seule solution de l'équation $f(x) = x$

2.

a. $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{(e^x+x)^2}$

$$\forall x \in [0; +\infty[, e^x > 0, (e^x + x)^2 > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $x - 1$

Par conséquent :

$$\forall x \in [0; 1[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in [1; +\infty[, f'(x) > 0$$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+xe^{-x}}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$$

c. **Tableau de variations de f**


| | | | |
|---------|---|-----------------|--------------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | - | 0 | + |
| $f(x)$ | 1 | \searrow | \nearrow 1 |
| | | $\frac{e}{e+1}$ | |

d. Construction de (\mathcal{C})

$$(T_0): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$\text{Alors } (T_0): y = -x + 1$$

$$(T_1): y = \frac{e}{e+1}$$



PARTIE C

1. f décroît sur $[\frac{1}{2}; 1]$

$$\forall x \in [\frac{1}{2}; 1], \frac{e}{e+1} \leq f(x) \leq \frac{2\sqrt{e}}{2\sqrt{e}+1}$$

$$\Leftrightarrow 0,73 \leq f(x) \leq 0,76$$

$$\Leftrightarrow f(x) \in [0,73; 0,76] \subset [\frac{1}{2}; 1]$$

$$\text{Donc } \forall x \in [\frac{1}{2}; 1], f(x) \in [\frac{1}{2}; 1]$$

2. $\begin{cases} U_1 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = f(U_n), \forall n > 1 \end{cases}$

a. $U_1 = \frac{1}{2} \in [\frac{1}{2}; 1]$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, supposons que $U_n \in [\frac{1}{2}; 1]$

et montrons que $U_{n+1} \in [\frac{1}{2}; 1]$

En effet :

$$U_n \in [\frac{1}{2}; 1] \Rightarrow f(U_n) \in [\frac{1}{2}; 1]$$

$$\text{Car } \forall x \in [\frac{1}{2}; 1], f(x) \in [\frac{1}{2}; 1]$$

Or par définition, $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où $U_{n+1} \in [\frac{1}{2}; 1]$ si $U_n \in [\frac{1}{2}; 1]$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n \in [\frac{1}{2}; 1]$$

b. $f'(x) = -\frac{(1-x)e^x}{(e^x+x)^2}$

$$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 1-x \leq \frac{1}{2} \text{ et } \sqrt{e} \leq e^x \leq e$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (1-x)e^x \leq \frac{e}{2}$$

Par ailleurs :

$$\frac{2\sqrt{e}+1}{2} \leq e^x + x \leq e + 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{(2\sqrt{e}+1)^2}{4} \leq (e^x + x)^2 \leq (e + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(e+1)^2} \leq \frac{1}{(e^x+x)^2} \leq \frac{4}{(2\sqrt{e}+1)^2}$$

D'où on a :

$$0 \leq \frac{(1-x)e^x}{(e^x+x)^2} \leq \frac{2e}{(2\sqrt{e}+1)^2} \leq \frac{2e}{(2\sqrt{e})^2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq 0$$

$$\text{Donc } x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

c. On sait que $x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}; \alpha \in I$

$$\text{et } \forall n > 1, U_{n-1} \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$$

D'après l'inégalité de la moyenne on a $\forall n > 1,$

$$\left| \int_{\alpha}^{U_{n-1}} f'(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha|$$

$$\Rightarrow |[f(x)]_{\alpha}^{U_{n-1}}| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha|$$

$$\Rightarrow |f(U_{n-1}) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha|$$

Or $f(\alpha) = \alpha$ d'après PARTIE B1 et

$$U_n = f(U_{n-1})$$

$$\text{Donc } \forall n > 1,$$

$$|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha|$$

d. Démonstration par récurrence

$$|U_1 - \alpha| = \left| \frac{1}{2} - \alpha \right|$$

$$\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq U_1 - \alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |U_1 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^1$$

$\forall n > 1,$ supposons que

$$|U_{n-1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \text{ et montrons que}$$

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

En effet :

$$|U_{n-1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{Or } |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha| \text{ d'où}$$

$$|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{D'où } |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ si}$$

$$|U_{n-1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{e. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{2} < 1$$

Alors la suite (U_n) converge et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

Ceci montre que (U_n) converge vers α

f. On sait que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$$\text{Donc } \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-7} \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-7}$$

$$\text{Or } \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-7} \Leftrightarrow n \geq \frac{7 \ln 10}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow n \geq 23,25$$

$$\text{Donc } |U_n - \alpha| \leq 10^{-7} \forall n \geq 24$$

A priori il suffit de calculer les 24 premiers termes de la suite pour obtenir une valeur approchée de α à 10^{-7} près

PROBLEME 26

PARTIE A

$g(x) = x^2 - 2 \ln x ; D_g =]0; +\infty[$

1. $g'(x) = \frac{2(x^2-1)}{x}$

$\forall x \in]0; +\infty[, x > 0$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $x^2 - 1$

$x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ et

$-1 \notin]0; +\infty[$

Par conséquent :

$\forall x \in]0; 1[, g'(x) < 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[, g$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, g$ est croissante

2. g croît sur $]0; 1[$ et décroît sur $]1; +\infty[$

Alors $g(1)$ est le minimum de g sur $]0; +\infty[$

Par conséquent :

$\forall x \in]0; +\infty[, g(x) \geq g(1)$

Or $g(1) = 1 > 0$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 0$

PARTIE B

$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1+\ln x}{x}; D_f =]0; +\infty[$

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} + \frac{1}{x}(1 + \ln x)$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{array} \right.$

Interprétation graphique

L'axe des ordonnées est une asymptote à la courbe (C)

2.

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} + \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{array} \right.$

b. $(\Delta): y = \frac{x}{2}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = 0$

Alors la droite (Δ) est une asymptote oblique à la courbe (C)

c. **Position de (C) par rapport à (Δ)**

$f(x) - y = \frac{1+\ln x}{x}$

$\forall x \in]0; +\infty[, x > 0$

Alors le signe de $f(x) - y$ dépend de celui de $1 + \ln x$

$1 + \ln x > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{e}$

Par conséquent :

$\forall x \in]0; \frac{1}{e}[, f(x) - y < 0$

$\forall x \in]\frac{1}{e}; +\infty[, f(x) - y > 0$

On en déduit que :

Sur $]0; \frac{1}{e}[, (C)$ est en dessous de (Δ)

Sur $]\frac{1}{e}; +\infty[, (C)$ est au dessus de (Δ)

$(C) = (\Delta) \Leftrightarrow f(x) = y$

$\Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$

Et $y = f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{2e}$

Donc $A\left(\frac{1}{e}; \frac{1}{2e}\right)$

3. $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{x^2 - 2 \ln x}{2x^2}$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$

$\forall x \in]0; +\infty[, 2x^2 > 0$ et d'après

PARTIE A, $g(x) > 0$ donc

$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[, f$ est croissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

4. La tangente (T) en B a pour coefficient directeur $f'(x_B)$
 (Δ) a pour coefficient directeur $\frac{1}{2}$
 $(T) // (\Delta) \Leftrightarrow f'(x_B) = \frac{1}{2}$
 $\Leftrightarrow \frac{x_B^2 - 2 \ln x_B}{2x_B^2} = \frac{1}{2}$
 $\Leftrightarrow \ln x_B = 0$
 $\Leftrightarrow x_B = 1$ et $y_B = f(1) = \frac{3}{2}$

Donc $B(1; \frac{3}{2})$

5. Sur $]0; +\infty[$, f est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors f réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $] -\infty; +\infty[$ et $0 \in] -\infty; +\infty[$.


Donc l'équation $f(x) = 0$ a une solution unique $\alpha \in]0; +\infty[$

Justification de l'encadrement

$$\begin{cases} g(0,34) = -0,06 < 0 \\ g(0,35) = 0,03 > 0 \end{cases}$$

**On a $g(0,34) \times g(0,35) < 0$
 Donc $0,34 < \alpha < 0,35$**

6. Traçons (C) et les droites (Δ) et (T)



PARTIE C

$$x_n = e^{\frac{n-2}{2}}; n \in \mathbb{N}$$

1.

a. $x_{n+1} = e^{\frac{n-1}{2}}$
 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$

**On a $x_{n+1} = x_n \sqrt{e}$
 Alors (x_n) est une suite géométrique de raison \sqrt{e} et de premier terme $x_0 = \frac{1}{e}$**

- b. $\sqrt{e} > 1$ alors la suite (x_n) est croissante

2. $a_n = 4 \int_{x_n}^{x_{n+1}} (f(x) - \frac{x}{2}) dx; n \in \mathbb{N}$

a. **Interprétation graphique**

a_n est l'aire en cm^2 du domaine plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = x_n$ et $x = x_{n+1}$

b. $a_n = 4 \int_{e^{\frac{n-2}{2}}}^{e^{\frac{n-1}{2}}} (\frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}) dx$

$$a_n = 4 \left[\ln x + \frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]_{e^{\frac{n-2}{2}}}^{e^{\frac{n-1}{2}}}$$

$$a_n = 4 \left[\left(\frac{n-1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{n-1}{2} \right)^2 \right) - \left(\frac{n-2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{n-2}{2} \right)^2 \right) \right]$$

$$a_n = 4 \left(\frac{2n+1}{8} \right)$$

Donc $a_n = \frac{2n+1}{2}$

On en déduit que :

$$a_{n+1} - a_n = 1$$

**On a $a_{n+1} = a_n + 1$
 Alors (a_n) est une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme $a_0 = \frac{1}{2}$**

PROBLEME 27

$$f_n(x) = \frac{(\ln x)^n}{x^2}; D_f =]0; +\infty[$$

PARTIE A

1. $f_1(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \times \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_1(x) = -\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = 0$$

On en déduit que :

L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses sont des asymptotes à (C_1)

2. $\forall x \in]0; +\infty[, f_1'(x) = \frac{1-2 \ln x}{x^3}$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x^3 > 0$$

Alors le signe de $f_1'(x)$ dépend de celui de $1 - 2 \ln x$

$$1 - 2 \ln x > 0 \Leftrightarrow x < \sqrt{e}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; \sqrt{e}[, f_1'(x) > 0$$

$$\forall x \in]\sqrt{e}; +\infty[, f_1'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; \sqrt{e}[, f_1$ est croissante

Sur $]\sqrt{e}; +\infty[, f_1$ est décroissante

Tableau de variation de f_1

| | | | |
|-----------|-----------|----------------|-----------|
| x | 0 | \sqrt{e} | $+\infty$ |
| $f_1'(x)$ | + | 0 | - |
| $f_1(x)$ | $-\infty$ | $\frac{1}{2e}$ | 0 |

3. $(T_1): y = f_1'(1)(x - 1) + f_1(1)$

$$\text{Alors } (T_1): y = x - 1$$

4. $f_2(x) = \frac{(\ln x)^2}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \times (\ln x)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = +\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x)^2 = +\infty \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

On en déduit que :

L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses sont des asymptotes à (C_2)

5. $\forall x \in]0; +\infty[, f_2'(x) = \frac{2 \ln x(1 - \ln x)}{x^3}$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x^3 > 0$$

Alors le signe de $f_2'(x)$ dépend de celui de $\ln x (1 - \ln x)$

$$\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow x < e$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[, f_2'(x) < 0$$

$$\forall x \in]1; e[, f_2'(x) > 0$$

$$\forall x \in]e; +\infty[, f_2'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[, f_2$ est décroissante

Sur $]1; e[, f_2$ est croissante

Sur $]e; +\infty[, f_2$ est décroissante

Tableau de variations de f_2

| | | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|
| x | 0 | 1 | e | $+\infty$ |
| $f_2'(x)$ | | - | + | 0 |
| $f_2(x)$ | $+\infty$ | | $\frac{1}{e^2}$ | 0 |

PARTIE B

1. $f_1(x) - f_2(x) = \frac{\ln x(1 - \ln x)}{x^2}$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x^2 > 0$$

Alors le signe de $f_1(x) - f_2(x)$ dépend de celui de $\ln x (1 - \ln x)$

D'après PARTIE A5, on a :

$$\forall x \in]0; 1[, f_1(x) - f_2(x) < 0$$


$$\forall x \in]1; e[, f_1(x) - f_2(x) > 0$$

$$\forall x \in]e; +\infty[, f_1(x) - f_2(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[, (C_1)$ est en dessous de (C_2)
Sur $]1; e[, (C_1)$ est au dessus de (C_2)
Sur $]e; +\infty[, (C_1)$ est en dessous de (C_2)

2. Tracer de (C_1) et (C_2)



PARTIE C

$$I_n = \int_1^e f_n(x) dx ; n \in \mathbb{N}$$

1. $F(x) = \frac{1+\ln x}{x}$

$$F'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$$

Déduction

$$I_1 = \int_1^e f_1(x) dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$$

D'après 1),

$x \mapsto F(x)$ est une primitive de

$$x \mapsto -\frac{\ln x}{x^2}$$

On a donc $I_1 = -\int_1^e F'(x) dx$

$$I_1 = \left[-\frac{1+\ln x}{x} \right]_1^e$$

$$I_1 = 1 - \frac{2}{e}$$

2. $I_{n+1} = \int_1^e \frac{(\ln x)^{n+1}}{x^2} dx$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = (\ln x)^{n+1} \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u'(x) = (n+1) \frac{(\ln x)^n}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$I_{n+1} = \left[-\frac{(\ln x)^{n+1}}{x} \right]_1^e +$$

$$(n+1) \int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx$$

$$\text{Alors } I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n$$

3. $I_2 = -\frac{1}{e} + 2I_1$

$$\text{D'où } I_2 = 2 - \frac{5}{e}$$

$$\mathcal{A} = ua \times \int_1^e (f_1(x) - f_2(x)) dx$$

D'après la linéarité :

$$\mathcal{A} = ua \times (I_1 - I_2)$$

$$ua = 20 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A} = 20 \left(-1 + \frac{3}{e} \right) \text{ cm}^2$$

PARTIE D

1. Démonstration par récurrence

$$\frac{1}{1!} I_1 = I_1 = 1 - \frac{2}{e} = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} \right)$$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, supposons que

$$\frac{1}{n!} I_n = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \text{ et}$$

montrons que $\frac{1}{(n+1)!} I_{n+1}$

$$= 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \right)$$

On sait que : $I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n$

Par conséquent :

$$\frac{1}{n!} I_n = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$$

$$\Rightarrow I_n = n! \left[1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

$$\Rightarrow (n+1)I_n = (n+1)n! \left[1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{e} + (n+1)I_n = -\frac{1}{e} + (n+1)!$$

$$\left[1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

$$\Rightarrow I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)! \left[1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(n+1)!} I_{n+1} = -\frac{1}{e} \times \frac{1}{(n+1)!}$$

$$+ 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(n+1)!} I_{n+1}$$

$$= 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \right)$$

$$\text{si } \frac{1}{n!} I_n = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$$

On conclut donc que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{n!} I_n = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$$

$$2. \forall x \in [1; e], 0 \leq \ln x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (\ln x)^n \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{(\ln x)^n}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx \leq \int_1^e \frac{1}{x^2} dx$$

$$\text{Or } \int_1^e \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^e = 1 - \frac{1}{e}$$

$$\text{D'où } 0 \leq I_n \leq 1 - \frac{1}{e} \leq 1$$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq 1$$

$$3. 0 \leq I_n \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{1}{n!} I_n \leq \frac{1}{n!}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \leq \frac{1}{n!}$$

$$\Leftrightarrow e - \frac{e}{n!} \leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq e$$

$$\text{On a } \lim_{n \rightarrow +\infty} e - \frac{e}{n!} = e \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n!} = 0$$

On en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = e$$

PROBLEME 28

PARTIE A

$$(E): y' + y = x - 1$$

$$1. \text{ Calcul de } \int_1^x (t-1)e^t dt$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(t) = t - 1 \\ v'(t) = e^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = e^t \end{cases}$$

$$\int_1^x (t-1)e^t dt$$

$$= [(t-1)e^t]_1^x - \int_1^x e^t dt$$

$$\int_1^x (t-1)e^t dt = [(t-2)e^t]_1^x$$

$$\int_1^x (t-1)e^t dt = (x-2)e^x + e$$

2.

$$a. f(x) = z(x)e^{-x} \Leftrightarrow z(x) = f(x)e^x \text{ et } f'(x) = z'(x)e^{-x} - z(x)e^{-x}$$

Supposons que f est solution de (E), on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + f(x) = x - 1$$

$$\Rightarrow z'(x)e^{-x} - z(x)e^{-x} + z(x)e^{-x} = x - 1$$

$$\Rightarrow z'(x)e^{-x} = x - 1$$

$$\Rightarrow z'(x) = (x-1)e^x$$

Alors : $\forall x \in \mathbb{R}, z'(x) = (x-1)e^x$ si f est solution de (E)

Réciproquement

Supposons que $\forall x \in \mathbb{R},$

$$z'(x) = (x-1)e^x,$$

$$\text{On a : } [f(x)e^x]' = (x-1)e^x$$

$$\Rightarrow f'(x)e^x + f(x)e^x = (x-1)e^x$$

$$\Rightarrow f'(x) + f(x) = x - 1$$

Alors f est solution de (E) si

$$\forall x \in \mathbb{R}, z'(x) = (x-1)e^x$$

En conclusion :

**f est solution de (E) si, et seulement si, pour tout x de $\mathbb{R},$
 $z'(x) = (x-1)e^x$**

b. D'après 1),

$$z'(x) = (x-1)e^x$$

$$\Leftrightarrow z(x) = \int_1^x (t-1)e^t dt + K, K \in \mathbb{R}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R},$ on a :

$$z(x) = (x-2)e^x + e + K, K \in \mathbb{R}$$

3.

$$a. f(x) = z(x)e^{-x}$$

On en déduit que :

$$f(x) = x - 2 + e^{1-x} + Ke^{-x}, K \in \mathbb{R}$$

b. $f(x) = x - 2 + e^{1-x} + Ke^{-x}$ et
 $f(1) = 0$
 $\Rightarrow Ke^{-1} = 0$
 $\Rightarrow K = 0$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x - 2 + e^{1-x}$

PARTIE B

$f(x) = x - 2 + e^{1-x}; D_f = \mathbb{R}$

1.

a. $f'(x) = 1 - e^{1-x}$

$1 - e^{1-x} > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; 1[, f'(x) < 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 1[, f$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, f$ est croissante

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}(xe^x - 2e^x + e)$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \end{cases}$

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

2.

a. $y = x - 2$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} e \cdot e^{-x} = 0$


Alors la droite (D) , d'équation $y = x - 2$, est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $+\infty$

b. $f(x) - y = e^{1-x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

On en déduit que :

Sur $\mathbb{R}, (C_f)$ est au dessus de (D)

3. Tracer de (D) et (C_f)



PARTIE C

Soit x_0 un nombre réel strictement positif.

1. $S_1 = \int_0^{x_0} (f(x) - y) dx = \int_0^{x_0} e^{1-x} dx$

$S_1 = [-e^{1-x}]_0^{x_0}$

$S_1 = e - e^{1-x_0}$

2. $g(x) = e^{1-x}; D_g = \mathbb{R}$


a. $g'(x) = -e^{1-x} < 0 \forall x \in \mathbb{R}$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R}, g est décroissante

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | 0 |

Traçons (C_g)



b. $S_1 = \int_0^{x_0} e^{1-x} dx = \int_0^{x_0} g(x) dx$

Interprétation géométrique

S_1 est donc l'aire en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe (C_g) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = x_0$

3. $A(x_0; 0)$; $B(x_0; g(x_0))$
 $(T): y = g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0)$
 Coordonnées du point C
 $g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0) = 0$
 $\Leftrightarrow x = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)} = 1 + x_0$

Donc $C(1 + x_0; 0)$

4. $Aire(ABC) = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{g(x_0) \times 1}{2}$
 Car ABC est un triangle rectangle en A

$Aire(ABC) = \frac{e^{1-x_0}}{2}$

Vérification

$S_1 + 2S_2 = e - e^{1-x_0} + 2 \times \frac{e^{1-x_0}}{2}$

Donc on a bien : $S_1 + 2S_2 = e$

PROBLEME 29

PARTIE A

1. $g(x) = 2x - (x - 1) \ln(x - 1)$;
 $D_g =]1; +\infty[$

a. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$
 $= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x - (x - 1) \ln(x - 1)$

Posons $X = x - 1$

Si $x \rightarrow 1^+, X \rightarrow 0^+$ et

$\lim_{X \rightarrow 0^+} 2X + 2 - X \ln X = 2$

Car $\begin{cases} \lim_{X \rightarrow 0^+} 2X + 2 = 2 \\ \lim_{X \rightarrow 0^+} X \ln X = 0 \end{cases}$

Alors $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$

b. $\forall x \in]1; +\infty[$,

$g'(x) = 1 - \ln(x - 1)$

c. $1 - \ln(x - 1) > 0 \Leftrightarrow x < e + 1$

$S_{]1; +\infty[} =]1; e + 1[$

d. $\forall x \in]1; e + 1[$, $g'(x) > 0$

$\forall x \in]e + 1; +\infty[$, $g'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]1; e + 1[$, g est croissante

Sur $]e + 1; +\infty[$, g est décroissante

e. Sur $[e + 1; e^3 + 1]$, g est continue car dérivable et est strictement décroissante puis on a :

$g(e + 1) \times g(e^3 + 1) = -e^4 < 0$

Alors l'équation $g(x) = 0$ a une solution unique, notée α dans l'intervalle $[e + 1; e^3 + 1]$

Signe de $g(x)$:

$\forall x \in]1; \alpha[$, $g(x) > 0$

$\forall x \in]\alpha; +\infty[$, $g(x) < 0$

2. $\varphi(x) = \frac{\ln(x^2-1)}{x}$; $D_\varphi =]1; +\infty[$

a. $\lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x^2-1)}{x}$

Posons $X = x^2 - 1$

Si $x \rightarrow 1^+, X \rightarrow 0^+$ et

$\lim_{X \rightarrow 0^+} \frac{\ln X}{\sqrt{X+1}} = -\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{X \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty \\ \lim_{X \rightarrow 0^+} \sqrt{X+1} = 1 \end{cases}$

Alors $\lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x) = -\infty$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^2 + \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \times \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0}$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \varphi'(x) &= \frac{2x^2}{x^2-1} - \ln(x^2-1) \\ &= \frac{x^2}{x^2-1} - \ln(x^2-1) \\ \Leftrightarrow \varphi'(x) &= \frac{2x^2 - (x^2-1)\ln(x^2-1)}{x^2(x^2-1)} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\forall x \in]1; +\infty[, \varphi'(x) = \frac{g(x^2)}{x^2(x^2-1)}$$

Et comme
 $x^2(x^2 - 1) > 0$

Alors $\varphi'(x)$ est du même signe que $g(x^2)$

$$\begin{aligned} \text{c. } \forall x \in]1; \sqrt{\alpha}[, x^2 \in]1; \alpha[\\ \forall x \in]\sqrt{\alpha}; +\infty[, x^2 \in]\alpha; +\infty[\end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned} \forall x \in]1; \sqrt{\alpha}[, \varphi'(x) &> 0 \\ \forall x \in]\sqrt{\alpha}; +\infty[, \varphi'(x) &< 0 \end{aligned}$$

On en déduit que :

Sur $]1; \sqrt{\alpha}[$, φ est croissante
 Sur $]\sqrt{\alpha}; +\infty[$, φ est décroissante

PARTIE B

$$f(x) = \frac{\ln(e^{2x}-1)}{e^x}; D_f =]0; +\infty[$$

$$\begin{aligned} \text{1. } \forall x \in]0; +\infty[, e^x \in]1; +\infty[\text{ et} \\ \varphi(e^x) = \frac{\ln((e^x)^2-1)}{e^x} = \frac{\ln(e^{2x}-1)}{e^x} \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Donc } \forall x \in]0; +\infty[, f(x) = \varphi(e^x)}$$

2. Déduction des limites

a. Posons $X = e^x$

Si $x \rightarrow 0, X \rightarrow 1$ et $\lim_{X \rightarrow 1} \varphi(X) = -\infty$

$$\boxed{\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty}$$

Si $x \rightarrow +\infty, X \rightarrow +\infty$ et

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \varphi(X) = 0$$

$$\boxed{\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}$$

$$\text{b. } f'(x) = e^x \varphi'(e^x)$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, e^x > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $\varphi'(e^x)$

$$\forall x \in]0; \ln(\sqrt{\alpha}[, e^x \in]1; \sqrt{\alpha}[$$

$$\forall x \in]\ln(\sqrt{\alpha}); +\infty[, e^x \in]\sqrt{\alpha}; +\infty[$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; \ln(\sqrt{\alpha}[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]\ln(\sqrt{\alpha}); +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; \ln(\sqrt{\alpha}[$, f est croissante

Sur $]\ln(\sqrt{\alpha}); +\infty[$, f est décroissante

Et comme f croît sur $]0; \ln(\sqrt{\alpha}[$ et décroît sur $]\ln(\sqrt{\alpha}); +\infty[$, alors f admet un maximum en $\ln(\sqrt{\alpha})$

3. Par suite, on a :

$$\forall x \in]0; +\infty[, f(x) \leq f(\ln(\sqrt{\alpha}))$$

$$\Leftrightarrow f(x) \leq \frac{\ln(\alpha-1)}{\sqrt{\alpha}}$$

$$\text{Or } g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln(\alpha-1) = \frac{2\alpha}{\alpha-1}$$

$$\boxed{\text{D'où } \forall x \in]0; +\infty[, f(x) \leq \frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha-1}}$$

4. Représentation graphique de (C_f)

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| x | 0 | $\ln(\sqrt{\alpha})$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha-1}$ | 0 |


$\alpha \simeq 10$ et $f(\alpha) \simeq 0,70$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(e^{2x} - 1) = 0$

$\Leftrightarrow e^{2x} = 2$

$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln 2 = \ln(\sqrt{2})$

(C_f) coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(\ln(\sqrt{2}); 0)$



PARTIE C

1. $f'(x) + f(x) = e^x \times \frac{2e^{2x} - (e^{2x}-1)\ln(e^{2x}-1)}{e^{2x}(e^{2x}-1)} + \frac{\ln(e^{2x}-1)}{e^x}$

$f'(x) + f(x) = \frac{2e^x}{e^{2x}-1}$

Or

$\frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x} + e^x}{e^{2x}-1} = \frac{2e^x}{e^{2x}-1}$

D'où $f'(x) + f(x) = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$

Ce qui montre bien que f est solution de l'équation

différentielle : $y' + y = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$

2. $h(x) = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$

a. Une primitive H de h sur $]0; +\infty[$ est par exemple la fonction définie par :

$H(x) = \ln(e^x - 1) - \ln(e^x + 1)$

Soit $H(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$

b. **Déduction**

$f'(x) + f(x) = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1} = h(x)$

$\Leftrightarrow f(x) = h(x) - f'(x)$

On en déduit qu'une primitive F de f sur $]0; +\infty[$ est par exemple la fonction définie par :

$F(x) = H(x) - f(x)$

Soit $F(x) = \ln\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right) - \frac{\ln(e^{2x}-1)}{e^x}$

3. $\mathcal{A} = ua \times \int_{\ln(\sqrt{2})}^{\ln(\sqrt{\alpha})} f(x) dx$

$\int_{\ln(\sqrt{2})}^{\ln(\sqrt{\alpha})} f(x) dx = [F(x)]_{\ln(\sqrt{2})}^{\ln(\sqrt{\alpha})}$

$\int_{\ln(\sqrt{2})}^{\ln(\sqrt{\alpha})} f(x) dx$

$= \ln 3 - \frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha-1} + \ln\left(\frac{\sqrt{\alpha}-1}{\sqrt{\alpha}+1}\right)$

$\mathcal{A} = \left[\ln 3 - \frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha-1} + \ln\left(\frac{\sqrt{\alpha}-1}{\sqrt{\alpha}+1}\right) \right] ua$

PROBLEME 30

PARTIE A

$g(x) = x \ln x - x + 1; D_g =]0; +\infty[$

1. Calcul des limites

| |
|-----------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$ |
|-----------------------------------|

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} -x + 1 = 1 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\ln x - 1 + \frac{1}{x} \right)$

| |
|---|
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ |
|---|

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$

2. $g'(x) = \ln x$

$\forall x \in]0; +\infty[, \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Par conséquent :

$\forall x \in]0; 1[, g'(x) < 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[, g$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, g$ est croissante

Tableau de variation de g

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| x | 0 | 1 | + | + |
| $g'(x)$ | | - | 0 | + |
| $g(x)$ | | | | + |

Déduction

D'après ce tableau de variation, g atteint son minimum en 1 et

$g(1) = 0$

| |
|--|
| Par conséquent : $\forall x \in]0; +\infty[, g(x) \geq 0$ |
|--|

3. $(C) = (C') \Leftrightarrow g(x) = \ln x$

$\Leftrightarrow x \ln x - x + 1 - \ln x = 0$

$\Leftrightarrow (x - 1)(\ln x - 1) = 0$

$\Leftrightarrow x = 1$ ou $\ln x = 1$

$\Leftrightarrow x = 1$ ou $x = e$

Alors (C) et (C') ont deux points communs d'abscisses respectives 1 et e

Par ailleurs :

$x \ln x - x + 1 \leq \ln x$

$\Leftrightarrow g(x) - \ln x \leq 0$

$\Leftrightarrow (x - 1)(\ln x - 1) \leq 0$

Tableau de signe

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| x | 0 | 1 | e | + | + |
| $x - 1$ | | - | 0 | + | + |
| $\ln x - 1$ | | - | - | 0 | + |
| $g(x) - \ln x$ | | + | 0 | - | 0 |

D'après le tableau de signe, on a :

$\forall x \in [1; e], x \ln x - x + 1 \leq \ln x$

4.

a. $J = \int_1^e (x - 1) \ln x dx$

Intégration par parties

$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{1}{2}x^2 - x \end{cases}$

$J = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{1}{2}x - 1 \right) dx$

$J = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \ln x - \frac{1}{4}x^2 + x \right]_1^e$

| |
|-------------------------|
| $J = \frac{e^2 - 3}{4}$ |
|-------------------------|

b. Aire(Δ) = $ua \times \int_1^e (\ln x - g(x)) dx$ car sur $[1; e], (C)$ est en dessous de (C')

$\int_1^e (\ln x - g(x)) dx$

$= \int_1^e -(x - 1)(\ln x - 1) dx$

$= - \int_1^e (x - 1) \ln x dx + \int_1^e (x - 1) dx$

$= -J + \left[\frac{1}{2}(x - 1)^2 \right]_1^e = \frac{e^2 - 4e + 5}{4}$

$ua = 4 cm^2$

| |
|--|
| Donc Aire(Δ) = $(e^2 - 4e + 5) cm^2$ |
|--|

PARTIE B

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \ln x; D_f =]1; +\infty[$$

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x-1} \times \frac{\ln x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x-1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

$$2. f'(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - \ln x}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2}$$

$$f'(x) = - \frac{g(x)}{x(x-1)^2}$$

$\forall x \in]1; +\infty[, x(x-1)^2 > 0$
Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $-g(x)$

Par conséquent :

$$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) \leq 0$$


On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|---|-----------|
| x | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | - |
| $f(x)$ | 1 | 0 |

3. Tracer de la courbe (C_f)



PARTIE C

1. Sur $]1; +\infty[, f$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors f réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur $]0; 1[$ et $\frac{1}{2} \in]0; 1[$.

Donc l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution notée α

Montrons que $3,5 < \alpha < 3,6$

$$f(]3,5; 3,6]) =]0,492; 0,501[\text{ et } \frac{1}{2} \in]0,492; 0,501[$$

$$\text{Alors on a : } 3,5 < \alpha < 3,6$$

$$2. h(x) = \ln x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}; D_h =]1; +\infty[$$

$$a. f(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} \ln x = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \ln x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + x = 0 + x$$

$$\Leftrightarrow \ln x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = x$$

$$\text{Donc } f(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow h(x) = x$$

Déduction

α étant solution de l'équation

$$f(x) = \frac{1}{2} \text{ alors } \alpha \text{ est aussi solution}$$

de l'équation $h(x) = x$ car ces deux équations sont équivalentes

$$b. h'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} > 0 \forall x \in]1; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $]1; +\infty[, h$ est croissante

$$c. I = [3; 4]$$

$$h([3; 4]) = [3,09; 3,88] \text{ et } [3,09; 3,88] \subset [3; 4]$$

$$\text{Donc } \forall x \in I, h(x) \in I$$

D'autres parts :

$$3 \leq x \leq 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{4} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \leq \frac{5}{6}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{4} \leq h'(x) \leq \frac{5}{6}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{4} \leq |h'(x)| \leq \frac{5}{6}$$

$$\text{Donc on a aussi : } \forall x \in I, |h'(x)| \leq \frac{5}{6}$$

$$3. U_0 = 3 \text{ et pour tout } n \geq 0,$$

$$U_{n+1} = h(U_n)$$

a. On sait que :

$$\forall x \in [3; 4], |h'(x)| \leq \frac{5}{6}$$

D'où d'après l'inégalité de la moyenne on a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_{\alpha}^{U_n} h'(x) dx \right| \leq \frac{5}{6} |U_n - \alpha|$$

$$\Rightarrow |[h(x)]_{\alpha}^{U_n}| \leq \frac{5}{6} |U_n - \alpha|$$

$$\Rightarrow |h(U_n) - h(\alpha)| \leq \frac{5}{6} |U_n - \alpha|$$

Or $h(\alpha) = \alpha$ d'après 1.) et

$$U_{n+1} = h(U_n)$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{5}{6} |U_n - \alpha|$$

b. En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{5}{6} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{5}{6} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{5}{6} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{5}{6} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |3 - \alpha|$$

$$3 \leq \alpha \leq 4$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq -\alpha \leq -3$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq U_0 - \alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n \times 1$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

c. $\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0 \text{ car } 0 < \frac{5}{6} < 1$$

Alors la suite (U_n) converge et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

4. On sait que $|U_p - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^p$ donc

$$\left(\frac{5}{6}\right)^p \leq 10^{-3} \Rightarrow |U_p - \alpha| \leq 10^{-3}$$

$$\text{Or } \left(\frac{5}{6}\right)^p \leq 10^{-3}$$

$$\Leftrightarrow -p \ln \left(\frac{6}{5}\right) \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{3 \ln 10}{\ln \left(\frac{6}{5}\right)}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 37,88$$

On a donc $|U_p - \alpha| \leq 10^{-3} \forall p \geq 38$

U_p est une valeur approchée de α à 10^{-3} près pour $p = 38$ par exemple.

PROBLEME 31

PARTIE A

$$f(x) = \ln(x+1) \text{ et } g(x) = \frac{2x}{x+2};$$

$$D_f = D_g = [0; +\infty[$$

1. Variations de f

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} > 0 \forall x \in [0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $[0; +\infty[$, f est croissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|---|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | - |
| $f(x)$ | 0 | $+\infty$ |

Variations de g

$$g'(x) = \frac{4}{(x+2)^2} > 0 \forall x \in [0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $[0; +\infty[$, g est croissante

Tableau de variation de g

| | | |
|---------|---|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | + |
| $g(x)$ | 0 | 2 |

2. $h(x) = f(x) - g(x); D_h = [0; +\infty[$

$$\text{a. } h'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} \geq 0$$

$$\forall x \in [0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $[0; +\infty[$, h est croissante

b. $h(0) = 0$

c. h étant croissante sur $[0; +\infty[$ et

$$h(0) = 0 \text{ alors}$$

$$\forall x \in [0; +\infty[, h(x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x+1) - \frac{2x}{x+2} \geq 0$$

D'où l'inégalité :


$$(1) \quad \frac{2x}{x+2} \leq \ln(x+1) \forall x \in [0; +\infty[$$

d. Interprétation graphique

Sur $[0; +\infty[$, la courbe (\mathcal{C}) est en dessous de la courbe (Γ)

3. Traçons (\mathcal{C}) et (Γ)
 $f'(0) = g'(0) = 1$ et $f(0) = g(0) = 0$

Alors à l'origine O du repère, les courbes (\mathcal{C}) et (Γ) admettent une même tangente (\mathfrak{D}) d'équation :
 $(\mathfrak{D}) : y = x$



PARTIE B

1. $\varphi(x) = \ln(x + 1) - x; D_\varphi = [0; +\infty[$
 $\varphi'(x) = -\frac{x}{x+1} \leq 0 \forall x \in [0; +\infty[$

On en déduit que :
 Sur $[0; +\infty[$, φ est décroissante

2. $\varphi(x) = \ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x; x > 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$

$$\varphi(0) = 0$$

Déduction

φ étant décroissante sur $[0; +\infty[$ et $\varphi(0) = 0$

Alors $\forall x \in [0; +\infty[, \varphi(x) \leq 0$

On en déduit l'inégalité :
 (2) $\ln(x + 1) \leq x \forall x \in [0; +\infty[$

3. $I = \int_0^1 \ln(x + 1) dx$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x + 1) \\ v'(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x+1} \\ v(x) = x \end{cases}$$

$$I = [x \ln(x + 1)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$$

En remarquant que $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$

$$\text{On a : } I = [(x + 1) \ln(x + 1) - x]_0^1$$

$$\text{Donc } I = 2 \ln 2 - 1$$

4. Déduction

$$J = \int_0^1 (x - \ln(x + 1)) dx$$

$$J = \int_0^1 x dx - \int_0^1 \ln(x + 1) dx$$

$$J = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 - I$$

$$\text{On en déduit que : } J = -2 \ln 2$$

D'autres parts :

$$K = \int_0^1 \left(\frac{2x}{x+2} - \ln(x + 1) \right) dx$$

$$K = \int_0^1 \frac{2x}{x+2} dx - \int_0^1 \ln(x + 1) dx$$

En remarquant que : $\frac{2x}{x+2} = 2 - \frac{4}{x+2}$

$$\text{On a : } K = [2x - 4 \ln(x + 2)]_0^1 - I$$

$$\text{On en déduit que : } K = 3 + \ln\left(\frac{4}{81}\right)$$

5. Interprétation géométrique de J et K

J est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (\mathcal{C}) , la tangente (\mathfrak{D}) et les droites d'équations :
 $x = 0$ et $x = 1$

K est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par les courbes (\mathcal{C}) et (Γ) et les droites d'équations : $x = 0$ et $x = 1$

PARTIE C

1. $u(0) = 1$ et si $x \neq 0, u(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$;

$$D_u = [0; 1]$$

Continuité sur $]0; 1]$

La fonction $x \mapsto \ln(1 + x)$ est continue sur $] -1; +\infty[$ donc continue sur $]0; 1]$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur \mathbb{R}^* donc continue sur $]0; 1]$

On en déduit que :

La fonction $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{x}$ est continue sur $]0; 1]$ comme produit de deux fonctions continues sur $]0; 1]$

Etudions la continuité de u en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = u(0)$$

Alors u est continue en 0

La fonction u étant continue sur $]0; 1]$ et continue en 0, alors elle est continue sur $[0; 1]$

2. On pose : $L = \int_0^1 u(x) dx$

$$(1) \quad \frac{2x}{x+2} \leq \ln(x+1)$$

$$(2) \quad \ln(x+1) \leq x$$

De ces deux inégalités on a :

$$\frac{2x}{x+2} \leq \ln(x+1) \leq x; \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{x+2} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1 \quad \forall x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \frac{2}{x+2} dx \leq \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx \leq \int_0^1 dx$$

Donc on a bien :

$$\int_0^1 \frac{2}{x+2} dx \leq L \leq 1$$

Déduction

$$[2 \ln(x+2)]_0^1 \leq L \leq 1$$

$$2 \ln\left(\frac{3}{2}\right) \leq L \leq 1$$

PROBLEME 32**PARTIE A**

$$f(x) = \ln(\sqrt{1+x} - 1); \quad D_f =]0; +\infty[$$

1. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x} - 1 = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x} - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln X = -\infty \end{cases}$$

2. Dérivée

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1+x+1}}{2x\sqrt{1+x}}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, 2x > 0 \text{ et } \sqrt{1+x} > 0$$


$$\text{Alors } \forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[, f$ est croissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |


3. Ordonnée de A

$$x_A = 3 \text{ alors } y_A = f(3) = 0$$

$$\text{Donc } A(3; 0)$$

Coordonnées de B, P et H

$$x_B = \frac{5}{4} \text{ et } y_B = f\left(\frac{5}{4}\right) = -\ln 2$$

$$\text{Donc } B\left(\frac{5}{4}; -\ln 2\right)$$


$$x_P = x_B = \frac{5}{4} \text{ et } y_P = 0$$

$$\text{Donc } P\left(\frac{5}{4}; 0\right)$$

$$x_H = 0 \text{ et } y_H = y_B = -\ln 2$$

$$\text{Donc } H(0; -\ln 2)$$

Tracer de (C)



PARTIE B

Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$; $r(M) = M'$

1. $r(M) = M' \Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{2}}z$

a. $z' = iz$

b. $x' + iy' = i(x + iy) = -y + ix$

On en déduit que :

$$\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases} \text{ et par suite } \begin{cases} x = y' \\ y = -x' \end{cases}$$

c. D'après ce qui précède :

Si $M(x; y)$ alors son image $M'(-y; x)$

Par conséquent :

$$A'(0; 3); B'(\ln 2; \frac{5}{4}); P'(0; \frac{5}{4})$$

2. $g(x) = e^{-2x} + 2e^{-x}$; $D_g = \mathbb{R}$

a. $M(x; y) \in (C)$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in D_f \\ y = f(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ -x' = f(y') \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ -x' = \ln(\sqrt{1+y'} - 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ e^{-x'} = \sqrt{1+y'} - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ e^{-x'} + 1 = \sqrt{1+y'} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ (e^{-x'} + 1)^2 = 1 + y' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ y' = e^{-2x'} + 2e^{-x'} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' \in D_g = \mathbb{R} \\ y' = g(x') \end{cases}$$

Car $e^{-2x'} + 2e^{-x'} > 0 \forall x' \in \mathbb{R}$

Alors le point M' image de M par r appartient à la courbe (Γ) si M appartient à la courbe (C)

b. Tracer de (Γ)
(Voir figure)

PARTIE C

1. $\int_0^{\ln 2} g(x) dx = \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} - 2e^{-x} \right]_0^{\ln 2}$

$$\int_0^{\ln 2} g(x) dx = \frac{11}{8}$$

2.

a. Le domaine (Δ) a même aire que le domaine plan (Δ') délimité par les segments $[A'O]$, $[OH']$ et $[H'B']$ et l'arc de courbe (Γ) d'extrémités B' et A'

On a donc :

$$\mathcal{A} = ua \int_0^{\ln 2} g(x) dx$$

$$\text{Soit } \mathcal{A} = \frac{11}{8} \times ua$$

b. $I = \int_{\frac{5}{4}}^3 \ln(\sqrt{1+x} - 1) dx = \int_{\frac{5}{4}}^3 f(x) dx$

$$\mathcal{A} = \text{Aire}(OHBP) - \int_{\frac{5}{4}}^3 f(x) dx$$

Car sur $[\frac{5}{4}; 3]$, la courbe (C) est en dessous de l'axe des abscisses

$\mathcal{A} = OH \times OP - I$

$$\mathcal{A} = \frac{5}{4} \ln 2 - I$$

Déduction

$$I = \frac{5}{4} \ln 2 - \mathcal{A}$$

$$\text{Donc on a : } I = \frac{10 \ln 2 - 11}{8}$$

PROBLEME 33

PARTIE A

$h(x) = xe^x - 2e^x + 2; D_h = [0; +\infty[$

1. Dérivée

$h'(x) = (x - 1)e^x$

$\forall x \in [0; +\infty[, e^x > 0$

Alors le signe de $h'(x)$ dépend de celui de $(x - 1)$

$x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Par conséquent :

$\forall x \in [0; 1[, h'(x) < 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, h'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $[0; 1[, h$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, h$ est croissante

Tableau de variation de h

| | | | |
|---------|---|---------|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | - | 0 | + |
| $h(x)$ | 0 | $2 - e$ | $+\infty$ |

2. $h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(4 - e^{\frac{3}{2}}\right)$

Sur $I = \left[\frac{3}{2}; 2\right], h$ est continue car dérivable et est strictement croissante puis on a :

$h\left(\frac{3}{2}\right) \times h(2) = 4 - e^{\frac{3}{2}} < 0$

Alors l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution a dans $\left[\frac{3}{2}; 2\right]$

C'est-à-dire qu'il existe un unique réel a appartenant à l'intervalle

$I = \left[\frac{3}{2}; 2\right]$ tel que $h(a) = 0$

3. On déduit de ce qui précède que :

$\forall x \in [0; a[, h(x) < 0$

$\forall x \in]a; +\infty[, h(x) > 0$

PARTIE B

$f(x) = \frac{e^x - 1}{x^2}; D_f =]0; +\infty[$

1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \times \frac{e^x - 1}{x}$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x^2} = +\infty \end{cases}$

2. $f'(x) = \frac{x^2 e^x - 2x e^x + 2x}{x^4}$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[,$

$f'(x) = \frac{x e^x - 2e^x + 2}{x^3}$

Déduction

$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

$\forall x \in]0; +\infty[, x^3 > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $g(x)$

Par conséquent :

$\forall x \in [0; a[, f'(x) < 0$

$\forall x \in]a; +\infty[, f'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $[0; a[, f$ est décroissante

Sur $]a; +\infty[, f$ est croissante

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| x | 0 | a | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | - | 0 | + |
| $f(x)$ | $+\infty$ | $f(a)$ | $+\infty$ |

3. $f(a) = \frac{e^a - 1}{a^2}$

Or $h(a) = 0 \Leftrightarrow e^a = -\frac{2}{a-2}$

D'où $f(a) = \frac{-\frac{2}{a-2} - 1}{a^2}$


On a donc : $f(a) = \frac{-1}{a(a-2)}$

Déduction

$a \in \left[\frac{3}{2}; 2\right]$ donc $a > 0$ et $a - 2 < 0$

On en déduit que : $f(a) > 0$

4. Tracer de (C)



PARTIE C

1. $\forall x \in [0; +\infty[, h(x) = 0$

$$\Leftrightarrow 2e^x - 2 = xe^x$$

$$\Leftrightarrow 2e^x(1 - e^{-x}) = xe^x$$

$$\Leftrightarrow 2(1 - e^{-x}) = x$$

Car $\forall x \in [0; +\infty[, e^x \neq 0$

**Alors $\forall x \in [0; +\infty[, h(x) = 0$
équivaut à $2(1 - e^{-x}) = x$**

2. $g(x) = 2(1 - e^{-x}); D_g = \left[\frac{3}{2}; 2\right]$

$$g'(x) = 2e^{-x}$$

$$\frac{3}{2} \leq x \leq 2$$

$$\Leftrightarrow 2e^{-2} \leq 2e^{-x} \leq 2e^{-\frac{3}{2}}$$

$$\Leftrightarrow 0,27 \leq g'(x) \leq 0,45$$

$$\Leftrightarrow 0,27 \leq |g'(x)| \leq 0,45 \leq 0,5$$

Donc $\forall x \in \left[\frac{3}{2}; 2\right], |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$

3.
$$\begin{cases} x_0 = \frac{3}{2} \\ x_{n+1} = g(x_n) \end{cases}$$

On admet que, pour tout entier n , x_n appartient à I

a. On sait que :

$$\forall x \in \left[\frac{3}{2}; 2\right], |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

$$\alpha \in \left[\frac{3}{2}; 2\right] \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, x_n \in \left[\frac{3}{2}; 2\right]$$

D'où d'après l'inégalité de la moyenne on a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_a^{x_n} g'(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} |x_n - a|$$

$$\Rightarrow \left| [g(x)]_a^{x_n} \right| \leq \frac{1}{2} |x_n - a|$$

$$\Rightarrow |g(x_n) - g(a)| \leq \frac{1}{2} |x_n - a|$$

Or $g(a) = a$ d'après 1.) et par définition $g(x_n) = x_{n+1}$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{n+1} - a| \leq \frac{1}{2} |x_n - a|$

Par ailleurs :

En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |x_1 - a| \leq \frac{1}{2} |x_0 - a|$$

$$n = 1 \Rightarrow |x_2 - a| \leq \frac{1}{2} |x_1 - a|$$

$$n = 2 \Rightarrow |x_3 - a| \leq \frac{1}{2} |x_2 - a|$$

:

$$n = n - 1 \Rightarrow |x_n - a| \leq \frac{1}{2} |x_{n-1} - a|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|x_n - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |x_0 - a|$$

$$|x_0 - a| = \left| \frac{3}{2} - a \right|$$

$$\frac{3}{2} \leq a \leq 2$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq -a \leq -\frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x_0 - a \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |x_0 - a| \leq \frac{1}{2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow |x_n - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |x_0 - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \times 1$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - a| \leq \frac{1}{2^n}$

b. $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - a| \leq \frac{1}{2^n}$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{2} < 1$$

**Alors la suite (x_n) converge et
on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$**

c. On sait que $|x_p - a| \leq \frac{1}{2^p}$ donc

$$\frac{1}{2^p} \leq 10^{-3} \Rightarrow |x_p - a| \leq 10^{-3}$$

Or $\frac{1}{2^p} \leq 10^{-3}$

$$\Leftrightarrow -p \ln 2 \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 9,96$$

On a donc :

$|x_p - a| \leq 10^{-3} \forall p \geq 10$

 x_p est une valeur approchée de a à 10^{-3} près pour $p = 10$ par exemple

PROBLEME 34**PARTIE A**

$$f(x) = (x + 3)e^{-\frac{x}{2}}; D_f = \mathbb{R}$$

1. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 3) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{x}{2}} = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{x}{2}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-\frac{x}{2}} = 0 \end{cases}$$

2. Dérivée

$$f'(x) = -(x + 1)e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-\frac{x}{2}} > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $-x - 1$.

$$-x - 1 > 0 \Leftrightarrow x < -1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; -1[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]-1; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $] -\infty; -1[$, f est croissante

Sur $] -1; +\infty[$, f est décroissante


Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| x | $-\infty$ | -1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $2\sqrt{e}$ | 0 |

3. Construction de la courbe (Γ) de f

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3$$

Alors (Γ) coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(-3; 0)$



$$4. I = \int_{-3}^0 x e^{-\frac{x}{2}} dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-\frac{x}{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -2e^{-\frac{x}{2}} \end{cases}$$

$$I = \left[-2x e^{-\frac{x}{2}} \right]_{-3}^0 + 2 \int_{-3}^0 e^{-\frac{x}{2}} dx$$

$$I = \left[-2(x + 2)e^{-\frac{x}{2}} \right]_{-3}^0$$

$$I = -4 - 2e^{\frac{3}{2}}$$

Déduction

$$\mathcal{A} = ua \times \int_{-3}^0 f(x) dx$$

$$\int_{-3}^0 f(x) dx = \int_{-3}^0 x e^{-\frac{x}{2}} dx +$$

$$3 \int_{-3}^0 e^{-\frac{x}{2}} dx$$

$$\int_{-3}^0 f(x) dx = I + 3 \left[-2e^{-\frac{x}{2}} \right]_{-3}^0$$

$$\int_{-3}^0 f(x) dx = 4e^{\frac{3}{2}} - 10$$

$$\mathcal{A} = \left(4e^{\frac{3}{2}} - 10 \right) \times ua$$

5.

- a. Graphiquement, la droite d'équation $y = 3$ coupe (Γ) au point d'abscisse 0 et en un deuxième point dont l'abscisse $\alpha \in]-2; -1[$

Alors l'équation $f(x) = 3$ admet deux solutions dans \mathbb{R} qui sont 0 et α

Montrons que $-2 < \alpha < -\frac{3}{2}$

$$\begin{cases} f(-2) = e \\ f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}e^{-\frac{9}{4}} \approx 3,17 \end{cases}$$

Comme $3 \in]e; 3,17[$

Alors on a bien : $-2 < \alpha < -\frac{3}{2}$

- b. Discussion suivant les valeurs de m du nombre de solution de l'équation $f(x) = m$

Si $m \in]-\infty; 0]$, il y a une solution

Si $m \in]0; 2\sqrt{e}[$, il y a deux solutions

Si $m = 2\sqrt{e}$, il y a une solution

Si $m \in]2\sqrt{e}; +\infty[$, il n'y a pas de solution

PARTIE B

$$g(x) = 3\left(e^{\frac{x}{2}} - 1\right); D_g = \mathbb{R}$$

1. $f(x) = 3 \Leftrightarrow (x+3)e^{-\frac{x}{2}} = 3$
 $\Leftrightarrow x+3 = 3e^{\frac{x}{2}}$
 $\Leftrightarrow 3\left(e^{\frac{x}{2}} - 1\right) = x$

Donc $f(x) = 3 \Leftrightarrow g(x) = x$

2. a. Dérivée première et seconde

$$g'(x) = \frac{3}{2}e^{\frac{x}{2}} \text{ et } g''(x) = \frac{3}{4}e^{\frac{x}{2}}$$

Vérification

$$g'(\alpha) = \frac{3}{2}e^{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\text{Or } f(\alpha) = 3 \Leftrightarrow e^{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\alpha+3}{3}$$

$$\text{D'où } g'(\alpha) = \frac{\alpha+3}{2}$$

- b. $\forall x \in \mathbb{R}, g''(x) > 0$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , g' est croissante

D'autres parts :

$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , g est croissante

3. $I = [-2; \alpha]$

- a. $g([-2; \alpha]) = [-1,9; \alpha]$

Or $[-1,9; \alpha] \subset [-2; \alpha]$

Donc pour tout x appartenant à I , $g(x)$ appartient à I

- b. $-2 \leq x \leq \alpha$

$$\Leftrightarrow g'(-2) \leq g'(x) \leq g'(\alpha)$$

$$\Leftrightarrow 0,55 \leq g'(x) \leq \frac{\alpha+3}{2}$$

$$\text{Or } -2 < \alpha < -\frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{\alpha+3}{2} \leq \frac{3}{4}$$

$$\text{D'où } 0,5 \leq 0,55 \leq g'(x) \leq \frac{\alpha+3}{2} \leq \frac{3}{4}$$

On conclut donc que : pour tout x appartenant à I , $\frac{1}{2} \leq g'(x) \leq \frac{3}{4}$

- c. On en déduit que : $\forall x \in [-2; \alpha]$,
 $\int_x^{\alpha} \frac{1}{2} dt \leq \int_x^{\alpha} g'(t) dt \leq \int_x^{\alpha} \frac{3}{4} dt$
 $\Leftrightarrow \frac{1}{2}[t]_x^{\alpha} \leq [g(t)]_x^{\alpha} \leq \frac{3}{4}[t]_x^{\alpha}$
 $\Leftrightarrow \frac{1}{2}(\alpha - x) \leq g(\alpha) - g(x) \leq \frac{3}{4}(\alpha - x)$
 Or $-2 \leq x \leq \alpha$ d'où $\alpha - x \geq 0$

On a donc pour tout x de l'intervalle I ,

$$0 \leq \frac{1}{2}(\alpha - x) \leq g(\alpha) - g(x) \leq \frac{3}{4}(\alpha - x)$$

4. $U_0 = -2$ et $U_{n+1} = g(U_n); n \in \mathbb{N}$

- a. Démonstration par récurrence

$$U_0 = -2 \in I = [-2; \alpha]$$

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in I$

et montrons que $U_{n+1} \in I$

En effet :

$$U_n \in I \Rightarrow g(U_n) \in I$$

$$\text{Or par définition } U_{n+1} = g(U_n)$$

D'où $U_{n+1} \in I$ si $U_n \in I$

On conclut donc que pour tout entier n , U_n appartient à l'intervalle I

Justification des inégalités :

En prenant $x = U_n$ dans l'inégalité 3c), on a :

$$0 \leq g(\alpha) - g(U_n) \leq \frac{3}{4}(\alpha - U_n)$$

Or $U_{n+1} = g(U_n)$

D'où pour tout entier n ,

$$0 \leq \alpha - U_{n+1} \leq \frac{3}{4}(\alpha - U_n)$$

Par ailleurs :

$$n = 0 \Rightarrow 0 \leq \alpha - U_1 \leq \frac{3}{4}(\alpha - U_0)$$

$$n = 1 \Rightarrow 0 \leq \alpha - U_2 \leq \frac{3}{4}(\alpha - U_1)$$

$$n = 2 \Rightarrow 0 \leq \alpha - U_3 \leq \frac{3}{4}(\alpha - U_2)$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow 0 \leq \alpha - U_n \leq$$

$$\frac{3}{4}(\alpha - U_{n-1})$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$0 \leq \alpha - U_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n (\alpha - U_0)$$

$$-2 < \alpha < -\frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow 0 < \alpha - U_0 < \frac{1}{2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < \alpha - U_0 \leq 1$$

$$0 \leq \alpha - U_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n (\alpha - U_0) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n \times 1$$

Donc pour tout entier n , on a :

$$0 \leq \alpha - U_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{3}{4} < 1$

Alors la suite (U_n) est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$

c. On sait que $0 \leq \alpha - U_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$

$$\Leftrightarrow |\alpha - U_n| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$\text{Donc } \left(\frac{3}{4}\right)^p \leq 10^{-2} \Rightarrow |\alpha - U_n| \leq 10^{-2}$$

$$\text{Or } \left(\frac{3}{4}\right)^p \leq 10^{-2}$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{-2 \ln 10}{\ln\left(\frac{3}{4}\right)}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 16,007$$

$$\text{Donc } |\alpha - U_n| \leq 10^{-2} \forall p \geq 17$$

Le plus petit entier cherché est donc $p = 17$

U_{17} représente une valeur approchée de α à 10^{-2} près

PROBLEME 35

PARTIE A

$$f(x) = \ln(e^x + e^{-x}); D_f = [0; +\infty[$$

1.

a. $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + e^{-x}) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty \end{cases}$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

b. $\forall x \in [0; +\infty[$,

$$f(x) = \ln e^x (1 + e^{-2x}) \\ = \ln e^x + \ln(1 + e^{-2x})$$

$$\text{Or } \ln e^x = x$$

D'où pour tout x appartenant à l'intervalle $[0; +\infty[$ on a :

$$f(x) = x + \ln(1 + e^{-2x})$$

c. Soit (D) : $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-2x})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \\ \ln 1 = 0 \end{cases}$$

Alors (C) admet comme asymptote oblique la droite (D) d'équation $y = x$

d. $f(x) - y = \ln(1 + e^{-2x})$

$$\forall x \in [0; +\infty[, e^{-2x} > 0$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-2x} > 1$$

$$\Leftrightarrow \ln(1 + e^{-2x}) > \ln 1 = 0$$

$$\text{Donc } \forall x \in [0; +\infty[, f(x) - y > 0$$

On en déduit que sur $[0; +\infty[$, (C) est au dessus de (D)

2. Dérivée

$$f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x(1 - e^{-2x})}{e^x + e^{-x}}$$

$$\forall x \in [0; +\infty[, e^x > 0 \text{ et } e^{-x} > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $1 - e^{-2x}$

$$1 - e^{-2x} \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in [0; +\infty[, f'(x) \geq 0$$


On en déduit que :

Sur $[0; +\infty[$, f est croissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|---------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | $\ln 2$ | $+\infty$ |

3. Tracer de (D) et (C)



PARTIE B

$$F(x) = \int_0^x \ln(1 + e^{-2t}) dt;$$

$$x \in [0; +\infty[$$

1. **Interprétation géométrique de $F(x)$**

$$\forall x > 0, F(x) = \int_0^x (f(t) - t) dt$$

Alors $F(x)$ est l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $t = 0$ et $t = x$

2. **Dérivée**

$F'(x) = \ln(1 + e^{-2x})$ car par définition F est la primitive sur $[0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \ln(1 + e^{-2x})$ qui s'annule en 0.
 $\forall x \in [0; +\infty[, 1 + e^{-2x} > 1$

Par conséquent :

$$\forall x \in [0; +\infty[, F'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $[0; +\infty[, F$ est croissante

3. Soit $a > 0$

a. $t \in [1; 1 + a] \Leftrightarrow 1 \leq t \leq 1 + a$

Donc pour tout t appartenant à l'intervalle $[1; 1 + a]$, on a :

$$\frac{1}{a+1} \leq \frac{1}{t} \leq 1$$

b. **Inégalité des accroissements finis**

$$\frac{1}{a+1} \leq \frac{1}{t} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \int_1^{1+a} \frac{1}{a+1} dt \leq \int_1^{1+a} \frac{1}{t} dt \leq \int_1^{1+a} 1 dt$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a+1} [t]_1^{1+a} \leq [\ln t]_1^{1+a} \leq [t]_1^{1+a}$$

Donc on a : $\frac{a}{a+1} \leq \ln(a + 1) \leq a$

4. Soit $x > 0$

Prenons $a = e^{-2t}$ dans l'inégalité précédente, on a :

$$\frac{e^{-2t}}{e^{-2t}+1} \leq \ln(e^{-2t} + 1) \leq e^{-2t}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x \frac{e^{-2t}}{1+e^{-2t}} dt \leq \int_0^x \ln(1 + e^{-2t}) dt \leq \int_0^x e^{-2t} dt$$

Or $\int_0^x \ln(1 + e^{-2t}) dt = F(x)$

D'où $\int_0^x \frac{e^{-2t}}{1+e^{-2t}} dt \leq F(x) \leq \int_0^x e^{-2t} dt$

Et par suite :

$$\left[-\frac{1}{2} \ln(1 + e^{-2t}) \right]_0^x \leq F(x) \leq$$

$$\left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^x$$

Donc on a bien :

$$\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln(1 + e^{-2x}) \leq F(x) \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2x}$$

5. D'après le théorème des gendarmes on a :

$$\frac{1}{2} \ln 2 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \leq \frac{1}{2}$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-2x}) = \ln 1 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \end{cases}$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \ell$

D'où $\frac{1}{2} \ln 2 \leq \ell \leq \frac{1}{2}$

6. $U_n = \int_n^{n+1} \ln(1 + e^{-2t}) dt, n \in \mathbb{N}$

a. Soit $h(t) = \ln(1 + e^{-2t})$;

$$D_h = [0; +\infty[$$

$$h'(t) = \frac{-2e^{-2t}}{1+e^{-2t}} < 0 \forall t \in [0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $[0; +\infty[, h$ est décroissante et $h(0) = \ln 2 > 0$

Donc $\forall t \in [0; +\infty[, h(t) > 0$

Par conséquent :

$$\forall t \in [n; n+1],$$

$$0 \leq h(n+1) \leq h(t) \leq h(n)$$

L'inégalité de la moyenne donne :

$$\Leftrightarrow 0 \leq \int_n^{n+1} h(t) dt \leq h(n)$$

$$\text{Or } \int_n^{n+1} h(t) dt = U_n$$

**D'où pour tout entier naturel n ,
on a : $0 \leq U_n \leq \ln(1 + e^{-2n})$**

b. On a en passant à la limite :

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \leq 0$$

$$\text{Car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-2n}) = \ln 1 = 0$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

7. $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n, n \in \mathbb{N}$

$$\text{a. } S_n = \int_0^1 \ln(1 + e^{-2t}) dt + \int_1^2 \ln(1 + e^{-2t}) dt + \dots + \int_n^{n+1} \ln(1 + e^{-2t}) dt$$

D'après la relation de Chasles,

$$S_n = \int_0^{n+1} \ln(1 + e^{-2t}) dt$$

$$\text{Donc on a : } S_n = F(n+1)$$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(n+1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(n)$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ existe

Alors la suite (S_n) est convergente

Par ailleurs :

$$\text{On a } \frac{1}{2} \ln 2 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \leq \frac{1}{2} \text{ en}$$

passant à la limite

On en déduit que :

$$\frac{1}{2} \ln 2 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \leq \frac{1}{2}$$

PROBLEME 36

PARTIE A

$$g(t) = \ln(1+t) - \frac{2t}{1+t};$$

$$D_g =]-1; +\infty[$$

1. Dérivée

$$g'(t) = \frac{t-1}{(1+t)^2}$$

$$\forall t \in]-1; +\infty[, (1+t)^2 > 0$$

Alors le signe de $g'(t)$ dépend de celui de $t-1$

Par conséquent :

$$\forall t \in]-1; 1[, g'(t) < 0$$

$$\forall t \in]1; +\infty[, g'(t) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-1; 1[, g$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, g$ est croissante

2. $\lim_{t \rightarrow -1} g(t)$

$$= \lim_{t \rightarrow -1^+} \frac{1}{1+t} ((1+t) \ln(1+t) - 2t)$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} g(t) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{t \rightarrow -1^+} \frac{1}{1+t} = +\infty \\ \lim_{t \rightarrow -1^+} (1+t) \ln(1+t) = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(1+t) = +\infty \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t}{1+t} = 2 \end{cases}$$

3. Sur $[1; +\infty[, g$ est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors g réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur $[\ln 2 - 1; +\infty[$ et $0 \in [\ln 2 - 1; +\infty[$

Donc l'équation $g(t) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$

C'est-à-dire qu'il existe un réel α et un seul dans l'intervalle $[1; +\infty[$ tel que : $g(\alpha) = 0$

Encadrement de α

$$g(3) = -0,1 < 0$$

$$g(4) = 0,009 > 0$$

$$\text{On a } g(3) \times g(4) < 0$$

$$\text{Alors } 3 < \alpha < 4$$

$$\begin{cases} g(3,9) = -0,002 < 0 \\ g(4,0) = 0,009 > 0 \end{cases}$$

**On a $g(3,9) \times g(4,0) < 0$
Alors à 10^{-1} près, $3,9 < \alpha < 4,0$**


4. Tangente à (C) en l'origine O du repère

$$(T): y = g'(0)(t - 0) + g(0)$$

$$(T): y = -t$$

Tableau de variation de g

| | | | | |
|-------|-----------|---|-------------|-----------|
| t | -1 | 1 | $+\infty$ | |
| g'(t) | | - | 0 | + |
| g(t) | $+\infty$ | | $\ln 2 - 1$ | $+\infty$ |



- 5.

a. $\frac{t}{1+t} = a + \frac{b}{1+t} \Leftrightarrow \frac{t}{1+t} = \frac{at+a+b}{1+t}$
 $\forall t \in]-1; +\infty[$, on a : $t = at + a + b$

Par identification :

$$\begin{cases} a = 1 \\ a + b = 0 \end{cases}$$

Donc $a = 1, b = -1$ et $\frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t}$

b. $\int_0^x g(t) dt$
 $= \int_0^x \ln(1+t) dt - 2 \int_0^x \frac{t}{1+t} dt$

Calculons $\int_0^x \ln(1+t) dt$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(t) = \ln(1+t) \\ v'(t) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(t) = \frac{1}{1+t} \\ v(t) = 1+t \end{cases}$$

$$\int_0^x \ln(1+t) dt = [(1+t) \ln(1+t)]_0^x - \int_0^x dt$$

Donc $\int_0^x \ln(1+t) dt$

$$= [(1+t) \ln(1+t) - t]_0^x$$

Par suite :

$$\int_0^x g(t) dt = [(3+t) \ln(1+t) - 3t]_0^x$$

$$\int_0^x g(t) dt = (3+x) \ln(1+x) - 3x$$

- c. $\mathcal{A} = ua \times \int_0^\alpha -g(t) dt$

$$\int_0^\alpha -g(t) dt = -\int_0^\alpha g(t) dt$$

$$\int_0^\alpha -g(t) dt = 3\alpha - (3+\alpha) \ln(1+\alpha)$$

$$ua = 4 \text{ cm}^2$$

Donc

$$\mathcal{A} = 4[3\alpha - (3+\alpha) \ln(1+\alpha)] \text{ cm}^2$$

Or $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln(1+\alpha) = \frac{2\alpha}{1+\alpha}$

D'où $\mathcal{A} = 4 \left[3\alpha - (3+\alpha) \times \frac{2\alpha}{1+\alpha} \right]$

On a donc bien : $\mathcal{A} = \frac{4\alpha(\alpha-3)}{\alpha+1}$

- d. **Encadrement de \mathcal{A}**

$$3,9 < \alpha < 4,0$$

$$\Leftrightarrow 0,9 < \alpha - 3 < 1 \text{ et}$$

$$15,6 < 4\alpha < 16$$

$$\Leftrightarrow 14,04 < 4\alpha(\alpha - 3) < 16$$

D'autres parts :

$$4,9 < \alpha + 1 < 5,0$$

$$\Leftrightarrow 0,2 < \frac{1}{\alpha+1} < 0,204$$

On a donc : $2,8 < \mathcal{A} < 3,2$

PARTIE B

$$f(x) = e^{-x} \ln(1 + e^{2x}); D_f = \mathbb{R}$$

1. La fonction $x \mapsto \ln(1 + e^{2x})$ est dérivable sur \mathbb{R} car la fonction $x \mapsto 1 + e^{2x}$ est dérivable sur \mathbb{R} et $\forall x \in \mathbb{R}, 1 + e^{2x} > 0$. On sait par ailleurs que la fonction $x \mapsto e^{-x}$ est dérivable sur \mathbb{R}

Alors la fonction f est dérivable sur \mathbb{R} comme produit de deux fonctions dérivables sur \mathbb{R}

$$f'(x) = -e^{-x} \ln(1 + e^{2x}) + \frac{2e^x}{1+e^{2x}}$$

$$f'(x) = -e^{-x} \left[\ln(1 + e^{2x}) - \frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}} \right]$$

$$f'(x) = -e^{-x} g(e^{2x})$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0,$$

Alors $f'(x)$ et $g(e^{2x})$ sont de signes opposés

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow g(e^{2x}) = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} = \alpha$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \ln \sqrt{\alpha}$$

2. Posons $t = e^{2x}$

Si $x \mapsto -\infty, t \mapsto 0$ et

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{t} \times \frac{\ln(1+t)}{t} = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{t} = 0 \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\begin{aligned} 3. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln e^{2x} (1 + e^{-2x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln e^{2x} + e^{-x} \ln(1 + e^{-2x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2xe^{-x} + e^{-x} \ln(1 + e^{-2x}) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0 \end{cases}$$

4. D'après PARTIE A,
 $\forall t \in]0; \alpha[, g(t) < 0$
 $\forall t \in]\alpha; +\infty[, g(t) > 0$
 Or $e^{2x} \in]0; \alpha[\Leftrightarrow x \in]-\infty; \ln \sqrt{\alpha}[$ et
 $e^{2x} \in]\alpha; +\infty[\Leftrightarrow x \in]\ln \sqrt{\alpha}; +\infty[$

Par conséquent :

$$x \in]-\infty; \ln \sqrt{\alpha}[, f'(x) > 0$$

$$x \in]\ln \sqrt{\alpha}; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; \ln \sqrt{\alpha}[, f$ est croissante

Sur $]\ln \sqrt{\alpha}; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variations de f

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $\ln \sqrt{\alpha}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + | 0 - |
| $f(x)$ | | $f(\ln \sqrt{\alpha})$ | |
| | 0 | | 0 |

5. f atteint son maximum pour $\ln \sqrt{\alpha}$ et ce maximum est

$$f(\ln \sqrt{\alpha}) = \frac{\ln(1+\alpha)}{\sqrt{\alpha}}$$

Or d'après PARTIE A5,

$$\ln(1 + \alpha) = \frac{2\alpha}{1+\alpha}$$


$$\text{D'où } f(\ln \sqrt{\alpha}) = \frac{2\alpha}{(1+\alpha)\sqrt{\alpha}}$$

$$\text{On a bien } f(\ln \sqrt{\alpha}) = \frac{2\sqrt{\alpha}}{1+\alpha}$$

$$\begin{aligned} 6. 3,9 < \alpha < 4,0 \\ \Leftrightarrow 0,2 < \frac{1}{\alpha+1} < 0,204 \text{ et} \\ 1,9 < \sqrt{\alpha} < 2,0 \\ \Leftrightarrow 0,7 < \frac{2\sqrt{\alpha}}{1+\alpha} < 0,8 \end{aligned}$$

Alors une valeur approchée de ce maximum par excès est donc 0,8

7. Tracer de (Γ)



PROBLEME 37

PARTIE A

$$f(x) = \frac{x \ln x}{x+1} \text{ si } x > 0 \text{ et } f(0) = 0;$$

$$D_f =]0; +\infty[$$

1. Continuité en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x+1} = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Alors f est continue en 0

Dérivabilité en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x+1} = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x+1} = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty$$

Alors f n'est pas dérivable en 0

2. $g(x) = \ln x + x + 1$; $D_g =]0; +\infty[$

a. Dérivée

$$g'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0 \forall x \in]0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, g est croissante

Tableau de variation de g

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | + |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

b. Sur $]0; +\infty[$, g est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors g réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $] -\infty; +\infty[$ et $0 \in] -\infty; +\infty[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution β et une seule dans $]0; +\infty[$

$$\begin{cases} g(0,27) = -0,03 < 0 \\ g(0,28) = 0,007 > 0 \end{cases}$$

On a $g(0,27) \times g(0,28) < 0$
Alors $0,27 \leq \beta \leq 0,28$

3. Dérivée

$$\forall x > 0, f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(x+1) - x \ln x}{(x+1)^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{\ln x + x + 1}{(x+1)^2}$$

Donc $\forall x > 0, f'(x) = \frac{g'(x)}{(x+1)^2}$

Déduction

$$\forall x > 0, (x+1)^2 > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $g'(x)$

D'après 2b)

Sur $]0; +\infty[$, g croît et $g(\beta) = 0$

On a donc :

$$\forall x \in]0; \beta[, g(x) < 0$$

$$\forall x \in]\beta; +\infty[, g(x) > 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; \beta[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]\beta; +\infty[, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; \beta[$, f est décroissante

Sur $]\beta; +\infty[$, f est croissante

Tableau de variations de g

| | | | |
|---------|---|----------|-----------|
| x | 0 | β | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | - | 0 | + |
| $f(x)$ | 0 | $-\beta$ | $+\infty$ |

$$f(\beta) = \frac{\beta \ln \beta}{\beta+1}$$

$$\text{Or } g(\beta) = 0 \Leftrightarrow \ln \beta = -\beta - 1$$

$$\text{D'où } f(\beta) = \frac{-\beta(\beta+1)}{\beta+1}$$

On a bien $f(\beta) = -\beta$

4. Limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x+1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x - f(x)] = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$$


Interprétation graphique

(C) et (Γ) sont asymptotes au voisinage de $+\infty$

5. Traçons (C) et (Γ)

Tableau de $x \mapsto \ln x$

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $\ln'(x)$ | | + |
| $\ln(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

**PARTIE B**

$h(x) = e \cdot e^{\frac{1}{x}}$; $D_h =]0; +\infty[$

1. Sur $[0; \beta]$, $f(x) \in [-\beta; 0]$ donc $f(x) \neq 1$

Sur $] \beta; +\infty[$, f est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors f réalise une bijection de $] \beta; +\infty[$ sur $] -\beta; +\infty[$ et $1 \in] -\beta; +\infty[$

Donc l'équation $f(x) = 1$ admet une solution α et une seule dans $[0; +\infty[$ et $\alpha \in] \beta; +\infty[$
 $f([3,5; 3,7]) = [0,97; 1,02]$

On a $1 \in [0,97; 1,02]$

D'où $3,5 \leq \alpha \leq 3,7$

Pour la représentation du point d'abscisse α , voir le graphique

2. $f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{x \ln x}{x+1} = 1$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{x} = \ln x$$

$$\Leftrightarrow e^{1+\frac{1}{x}} = e \cdot e^{\frac{1}{x}} = x$$

$$\Leftrightarrow h(x) = x$$

Donc les équations $f(x) = 1$ et $h(x) = x$ sont équivalentes

3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2} \times h(x) < 0$

$$\forall x \in]0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, h est décroissante

4. Pour tout élément x de $[3,5; 3,7]$,

a. $h(x) \in [h(3,7); h(3,5)] = [3,56; 3,61]$

$$\text{Or } [3,56; 3,61] \subset [3,5; 3,7]$$

Donc $h(x)$ appartient aussi à $[3,5; 3,7]$

b. $h'(x) = -\frac{1}{x^2} \times h(x)$

$$h''(x) = \frac{2x+1}{x^4} \times h(x) > 0$$

On en déduit que h' est croissante

Par conséquent :

$$h'(3,5) \leq h'(x) \leq h'(3,7) < 0$$

$$\Leftrightarrow |h'(3,7)| \leq |h'(x)| \leq |h'(3,5)|$$

$$\text{Or } |h'(3,5)| = 0,29 \leq \frac{1}{3}$$

D'où $|h'(x)| \leq |h'(3,5)| \leq \frac{1}{3}$

c. On sait que $|h'(x)| \leq \frac{1}{3}$ et

$$\alpha \in [3,5; 3,7]$$

Alors d'après l'inégalité de la moyenne on a :

$$\left| \int_{\alpha}^x h'(t) dt \right| \leq \frac{1}{3} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |[h(t)]_{\alpha}^x| \leq \frac{1}{3} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |h(x) - h(\alpha)| \leq \frac{1}{3} |x - \alpha|$$

Or $h(\alpha) = \alpha$ d'après 2)

D'où $|h(x) - \alpha| \leq \frac{1}{3} |x - \alpha|$

5. $U_{n+1} = h(U_n)$ et $U_0 = 3,5$

a. Pour tout $n \geq 0$, prenons $x = U_n$ dans l'inégalité 4c)

$$\text{On a : } |h(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_n - \alpha|$$

$$\text{Or } h(U_n) = U_{n+1}$$

D'où pour tout entier $n \geq 0$,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_n - \alpha|$$

b. En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$|U_0 - \alpha| = |3,5 - \alpha|$$

$$3,5 \leq \alpha \leq 3,7$$

$$\Leftrightarrow -3,7 \leq -\alpha \leq -3,5$$

$$\Leftrightarrow -0,2 \leq U_0 - \alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |U_0 - \alpha| \leq 0,2 = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n \times \frac{1}{5}$$

On en déduit donc que pour tout

$$\text{entier } n \geq 0, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{1}{3} < 1$

Alors la suite (U_n) converge et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

d. On sait que $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n$

Donc

$$\frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^p \leq 10^{-3} \Rightarrow |U_p - \alpha| \leq 10^{-3}$$

$$\text{Or } \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^p \leq 10^{-3}$$

$$\Leftrightarrow -\ln 5 - p \ln 3 \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{3 \ln 10 + \ln 5}{\ln 3}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 7,75$$

$$\text{Donc } |U_p - \alpha| \leq 10^{-3} \forall p \geq 8$$

On en déduit que U_p est une valeur approchée à 10^{-3} près du nombre réel α pour $p = 8$ par exemple

PROBLEME 38

$$f(x) = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}; D_f = \mathbb{R}$$

PARTIE A

1.

a. $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) + f(x)$

$$= \frac{3e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} + \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$$

$$= \frac{3 - e^x}{1 + e^x} + \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$$

$$= \frac{2(e^x + 1)}{e^x + 1}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) + f(x) = 2$$

Déduction

$$f(-x) + f(x) = 2$$

$$f(2 \times 0 - x) + f(x) = 2 \times 1$$

On n'en déduit que le point $A(0; 1)$ est un centre de symétrie de (Γ)

b. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-1}{x+1} = 3 \end{array} \right.$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

c. Dérivée

$$f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R}, f est croissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | -1 | 3 |

2.

a. (T): $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

$$\text{Alors (T): } y = x + 1$$

b. $\varphi(x) = f(x) - (x + 1); D_\varphi = \mathbb{R}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = f'(x) - 1$$

$$\Leftrightarrow \varphi'(x) = \frac{-e^{2x} - 2e^x - 1}{(e^x + 1)^2} = -\frac{(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2}$$

Donc on a bien :

$$\varphi'(x) = - \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) \leq 0$$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , φ est croissante

$$\varphi(0) = 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, \varphi(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, \varphi(x) > 0$$

c. (T): $y = x + 1$ et $f(x) - y = \varphi(x)$

D'après ce qui précède :


Sur $]-\infty; 0[$,

(Γ) est en dessous de (T)

Sur $]0; +\infty[$,

(Γ) est au dessus de (T)

3. Tracer de (T) et (Γ)



PARTIE B

1.

a. $f(x) = x$

$$\Leftrightarrow f(x) - x = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x) - x - 1 = -1$$

$$\Leftrightarrow f(x) - (x + 1) = -1$$

$$\text{Or } \varphi(x) = f(x) - (x + 1)$$

D'où $f(x) = x$ si et seulement si $\varphi(x) = -1$

b. Sur \mathbb{R} , φ est continue car dérivable et est strictement décroissante. Alors φ réalise une bijection de \mathbb{R} sur $] \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) [=]-\infty; +\infty[$ et $-1 \in]-\infty; +\infty[$

Donc l'équation $\varphi(x) = -1$ admet une unique solution α dans \mathbb{R} et par équivalence α est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$

$$\varphi(]2; 3]) =]-0,47; -1, 18[\text{ et } -1 \in]-0,47; -1, 18[$$

D'où $\alpha \in]2; 3[$

Tout ceci montre bien que la droite (D) d'équation $y = x$ coupe la courbe (Γ) en un seul point dont l'abscisse α est comprise entre 2 et 3

2.

a. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{4e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{4e^x - (e^x + 1)}{e^x + 1}$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -1 + \frac{4e^x}{e^x + 1}$

On en déduit qu'une primitive sur \mathbb{R} de f est par exemple la fonction F définie sur \mathbb{R} par :

$$F(x) = -x + 4 \ln(e^x + 1)$$

b. $\mathcal{A} = ua \times \int_0^\alpha (f(x) - y) dx$ car sur $[0; \alpha]$, (Γ) est au dessus de (D)

$$\int_0^\alpha (f(x) - y) dx$$

$$= \left[-x - \frac{1}{2}x^2 + 4 \ln(e^x + 1) \right]_0^\alpha$$

$$\int_0^\alpha (f(x) - y) dx$$

$$= -\frac{1}{2}\alpha^2 - \alpha - 4 \ln 2 + 4 \ln(e^\alpha + 1)$$

$$f(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow e^\alpha = \frac{1+\alpha}{3-\alpha}$$

Donc

$$\mathcal{A} = \left[4 \ln 2 - \frac{1}{2}\alpha^2 - \alpha - 4 \ln(3 - \alpha) \right] ua$$

PARTIE C

$$I = [2; 3]$$

1.

a. $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{a}{e^x + 1} + \frac{b}{(e^x + 1)^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ae^x + a + b}{(e^x + 1)^2} = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$\Leftrightarrow ae^x + a + b = 4e^x$$

Ce qui donne par identification :

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = -4 \end{cases}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 4 \left(\frac{1}{e^x + 1} - \frac{1}{(e^x + 1)^2} \right)$$

b. **Déduction**

$$2 \leq x \leq 3$$

$$\Leftrightarrow e^2 + 1 \leq e^x + 1 \leq e^3 + 1$$

$$\Leftrightarrow 0,04 \leq \frac{1}{e^x + 1} \leq 0,12 \text{ et}$$

$$-0,0144 \leq -\frac{1}{(e^x + 1)^2} \leq -0,0016$$

$$\Leftrightarrow 0,025 \leq \frac{1}{e^{x+1}} - \frac{1}{(e^{x+1})^2} \leq 0,118$$

$$\Leftrightarrow 0,1 \leq f'(x) \leq 0,47$$

$$\Leftrightarrow |f'(x)| \leq 0,47 \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } \forall x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

c. On sait que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ et

$\alpha \in I$

Alors d'après l'inégalité de la

moyenne on a : $\forall x \in I,$

$$|\int_{\alpha}^x f'(t) dt| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |[f(t)]_{\alpha}^x| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

Or $f(\alpha) = \alpha$ d'après PARTIE B1)

D'où $\forall x \in I,$

$$|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

$$2. \begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = f(U_n) \text{ pour } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a. Pour tout entier naturel n , prenons $x = U_n$ dans l'inégalité précédente

$$\text{On a : } |f(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_n - \alpha|$$

$$\text{Or } f(U_n) = U_{n+1}$$

D'où pour tout entier naturel n ,

$$|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_n - \alpha|$$

En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à

membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

Donc pour tout entier naturel n ,

$$|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3^n} |3 - \alpha|$$

b. $2 \leq \alpha \leq 3$

$$\Rightarrow 0 \leq 3 - \alpha \leq 1$$

$$\Rightarrow |3 - \alpha| \leq 1$$

$$\Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3^n} |3 - \alpha| \leq \frac{1}{3^n} \times 1$$

On en déduit que pour tout entier

$$\text{naturel } n, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{3^n}$$

$$\text{On sait que } |U_p - \alpha| \leq \frac{1}{2^p}$$

$$\text{Donc } \frac{1}{2^p} \leq 10^{-3} \Rightarrow |U_p - \alpha| \leq 10^{-3}$$

$$\text{Or } \frac{1}{2^p} \leq 10^{-3} \Leftrightarrow -p \ln 2 \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 9,96$$

$$\text{D'où on a } |U_p - \alpha| \leq 10^{-3} \forall p \geq 10$$

U_p est une valeur approchée de α à 10^{-3} près pour $p = 10$ par exemple

PROBLEME 39

$$f(0) = \frac{3}{2} \text{ et}$$

$$f(x) = 2x \ln x - \frac{x^2}{2} - x + \frac{3}{2};$$

$$D_f =]0; +\infty[$$

PARTIE A

$$g(x) = 2 \ln x - x + 1; D_g =]0; +\infty[$$

1. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2 \frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$$

Dérivée

$$g'(x) = \frac{2-x}{x}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x > 0$$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $2 - x$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 2[, g'(x) > 0$$

$$\forall x \in]2; +\infty[, g'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 2[, g$ est croissante

Sur $]2; +\infty[, g$ est décroissante

Tableau de variation de g

| | | | |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| x | 0 | 2 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | + | 0 - |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $-1 + 2 \ln 2$ | $-\infty$ |

2. Sur $]0; 2[, g$ est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors g réalise une bijection de $]0; 2[$ sur $] -\infty; -1 + 2 \ln 2[$ et $0 \in] -\infty; -1 + 2 \ln 2[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0; 2[$ $1 \in]0; 2[$ et $g(1) = 0$ alors 1 est l'unique solution de l'équation $g(x) = 0$ sur $]0; 2[$

Par ailleurs :

Sur $[2; +\infty[, g$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors g réalise une bijection de $[2; +\infty[$ sur $] -\infty; -1 + 2 \ln 2]$ et $0 \in] -\infty; -1 + 2 \ln 2]$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[2; +\infty[$

Déduction

$g(1) = g(\alpha) = 0$ d'où d'après le tableau de variation de g , on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in]0; 1[, g(x) < 0 \\ \forall x \in]1; \alpha[, g(x) > 0 \\ \forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0 \end{aligned}$$

$$3. \begin{cases} g(3,5) = 0,005 > 0 \\ g(4) = -0,227 < 0 \end{cases}$$

$$\text{On a } g(3,5) \times g(4) < 0 \\ \text{Alors } 3,5 \leq \alpha \leq 4$$

PARTIE B

$$1. \forall x > 0, f'(x) = 2 \ln x + 2 - x - 1$$

$$\text{Alors } \forall x > 0, f'(x) = g(x)$$

D'après PARTIE A 2)

$$\forall x \in]0; 1[, f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]1; \alpha[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]\alpha; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[, f$ est décroissante

Sur $]1; \alpha[, f$ est croissante

Sur $]\alpha; +\infty[, f$ est décroissante

2.

$$a. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(2 \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{x^2} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{cases}$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{3}{2} \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Alors f est continue en 0

c. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln x - \frac{x}{2} - 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = -\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

Conclusion :

La courbe (C) de f admet au point de coordonnées $(0; \frac{3}{2})$ une demi-tangente verticale dirigée vers le bas

3.

a. $f(\alpha) = 2\alpha \ln \alpha - \frac{\alpha^2}{2} - \alpha + \frac{3}{2}$

Or $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = \frac{\alpha-1}{2}$

D'où $f(\alpha) = \frac{1}{2}(\alpha^2 - 4\alpha + 3)$

Et donc $f(\alpha) = \frac{1}{2}(\alpha - 1)(\alpha - 3)$

$3,5 \leq \alpha \leq 4 \Leftrightarrow \frac{5}{8} \leq f(\alpha) \leq \frac{3}{2}$

**Sur $]0; \alpha]$, $f(x) \in [0; \frac{3}{2}]$ et $f(1) = 0$
Donc 1 est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$ sur $]0; \alpha]$**

Par ailleurs :

Sur $]\alpha; +\infty[$, f est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors f réalise une bijection de $]\alpha; +\infty[$ sur $]-\infty; f(\alpha)[$ et $0 \in]-\infty; f(\alpha)[$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β dans $]\alpha; +\infty[$

b. $\begin{cases} f(5) = 0,09 > 0 \\ f(6) = -0,9 < 0 \end{cases}$

**On a $f(5) \times f(6) < 0$
 D'où $5 \leq \beta \leq 6$**

4.

a. (D): $y = h(x) = (2 \ln 5 - 4)x + 4$

$\Delta(x) = f(x) - h(x)$; $D_\Delta = [5; +\infty[$

$\Delta'(x) = f'(x) - f'(5) = g(x) - g(5)$

$\forall x \in [5; +\infty[, \Delta'(x) < 0$

Car sur $[5; +\infty[$, g est décroissante

On en déduit que :

Sur $[5; +\infty[, \Delta$ est décroissante

Par conséquent :

Pour tout $x \geq 5, \Delta(x) \leq \Delta(5)$

$\Leftrightarrow f(x) - h(x) \leq 0$

Donc pour tout $x \geq 5, f(x) \leq h(x)$

b. $h(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{2 - \ln 5}$

Alors (D) coupe l'axe (Ox) au point d'abscisse $\lambda = \frac{2}{2 - \ln 5}$

D'après ce qui précède :

Sur $[5; +\infty[$, (C) est en dessous de (D)

Et par ailleurs :


(C) et (D) coupent l'axe (Ox) respectivement aux points d'abscisses β et λ .

Donc on a bien $\beta \leq \lambda$

5. **Tableau de variation de f**

| | | | | | |
|-------|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| x | 0 | 1 | α | $+\infty$ | |
| f'(x) | - | 0 | + | 0 | - |
| f(x) | $\frac{3}{2}$ | | | | $-\infty$ |

(Note: The table above is a simplified representation of the diagram in the image, which shows arrows indicating the sign of f'(x) and the behavior of f(x) between these points.)



PARTIE C

$F(x) = x^2 \ln x - \frac{x^3}{6} - x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}$;

$D_F =]0; +\infty[$

1. $F'(x) = 2x \ln x + x - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{3}{2}$
 $\forall x \in]0; +\infty[, F'(x) = f(x)$ et $F(1) = 0$

Donc F est sur l'intervalle $]0; +\infty[$ la primitive de f qui s'annule au point 1

C'est-à-dire que $\forall x \in]0; +\infty[, F(x) = \int_1^x f(t)dt$

2. On pose $\mathcal{A} = \int_1^\beta f(t)dt$

a. $F'(x) = f(x) \geq 0 \forall x \in [5; \beta]$

On en déduit que :

Sur $[5; \beta]$, F est croissante

Par conséquent :

$$F(5) \leq F(\beta) \quad (1)$$

b. $\mathcal{A} = \int_1^\beta f(t)dt$

D'après la relation de Chasles, on a :

$$\mathcal{A} = \int_1^5 f(t)dt + \int_5^\beta f(t)dt$$

Or $\int_1^5 f(x)dx = F(5)$ par définition et

$$\int_5^\beta f(t)dt \leq \int_5^\beta h(t)dt \text{ d'après}$$

PARTIE B 4a)

$$\text{D'où } \mathcal{A} \leq F(5) + \int_5^\beta h(t)dt$$

D'autres parts :

$\beta \leq \lambda$ et sur $[\beta; \lambda]$, (D) est au dessus de l'axe (Ox)

$$\text{Alors } \int_\beta^\lambda h(t)dt \geq 0 \text{ car c'est une aire}$$

Déduction

$$\int_5^\lambda h(t)dt = \int_5^\beta h(t)dt + \int_\beta^\lambda h(t)dt$$

$$\Leftrightarrow \int_5^\lambda h(t)dt \geq \int_5^\beta h(t)dt$$

Car $\int_\beta^\lambda h(t)dt \geq 0$

On a alors :

$$F(5) + \int_5^\beta h(t)dt \leq F(5) + \int_5^\lambda h(t)dt$$

Or $\mathcal{A} \leq F(5) + \int_5^\beta h(t)dt$

$$\text{D'où } \mathcal{A} \leq F(5) + \int_5^\lambda h(t)dt \quad (2)$$

3. Les inégalités (1) et (2) montrent que

$$F(5) \leq \mathcal{A} \leq F(5) + \int_5^\lambda h(t)dt$$

Car $F(\beta) = \int_1^\beta f(t)dt = \mathcal{A}$

$$\int_5^\lambda h(t)dt = [(\ln 5 - 2)x^2 + 4x]_5^{2-\ln 5}$$

$$\int_5^\lambda h(t)dt = \frac{4}{2-\ln 5} - 25 \ln 5 + 30$$

$$F(5) = 25 \ln 5 - \frac{116}{3}$$

Donc on a :

$$25 \ln 5 - \frac{116}{3} \leq \mathcal{A} \leq \frac{4}{2-\ln 5} - \frac{26}{3}$$

Ce qui donne :

$$1,56 \leq \mathcal{A} \leq 1,57 \text{ à } 10^{-2} \text{ près}$$

PROBLEME 40

PARTIE A

$$f(x) = e^x - 2e^{\frac{x}{2}}; D_f = \mathbb{R}$$

1. Dérivée

$$f'(x) = e^x - e^{\frac{x}{2}} = e^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 1)$$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{\frac{x}{2}} > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $e^{\frac{x}{2}} - 1$

$$e^{\frac{x}{2}} - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; 0[, f'(x) < 0$

$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[, f$ est décroissante

Sur $]0; +\infty[, f$ est croissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|-----------|------|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ |
| $f(x)$ | 0 | -1 | $+\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{x}{2}} = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x}{2}} = +\infty$$

2. $f(x) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 2) = 0$

$\Leftrightarrow e^{\frac{x}{2}} \neq 0$ et $e^{\frac{x}{2}} = 2$

$\Leftrightarrow x = 2 \ln 2$


Alors (\mathcal{C}) coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(2 \ln 2; 0)$

Par ailleurs :

$f(0) = -1$

Alors (\mathcal{C}) coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0; -1)$

3. Tracer de (C)



4. Soit $\lambda < 0$

a. $\mathcal{A}(\lambda) = ua \times \int_{\lambda}^0 -f(x)dx$

$$\int_{\lambda}^0 -f(x)dx = \left[-e^x + 4e^{\frac{x}{2}} \right]_{\lambda}^0$$

$$\int_{\lambda}^0 -f(x)dx = 4 + e^{\lambda} - 4e^{\frac{\lambda}{2}}$$

$$ua = 4 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 4 \left(4 + e^{\lambda} - 4e^{\frac{\lambda}{2}} \right) \text{ cm}^2$$

Déduction

$$\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{\lambda} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{\frac{\lambda}{2}} = 0 \end{cases}$$

Alors $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 16$

b. $\mathcal{V}(\lambda) = uv \times \pi \int_{\lambda}^0 f^2(x) dx$

$$\int_{\lambda}^0 f^2(x) dx$$

$$= \int_{\lambda}^0 \left(e^{2x} - 4e^{\frac{3x}{2}} + 4e^x \right) dx$$

$$\int_{\lambda}^0 f^2(x) dx = \left[\frac{1}{2}e^{2x} - \frac{8}{3}e^{\frac{3x}{2}} + 4e^x \right]_{\lambda}^0$$

$$\int_{\lambda}^0 f^2(x) dx$$

$$= \frac{11}{3} - \left(\frac{1}{2}e^{2\lambda} - \frac{8}{3}e^{\frac{3\lambda}{2}} + 4e^{\lambda} \right)$$

$$\mathcal{V}(\lambda) = \pi \left[\frac{11}{3} - \left(\frac{1}{2}e^{2\lambda} - \frac{8}{3}e^{\frac{3\lambda}{2}} + 4e^{\lambda} \right) \right] uv$$

$$\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{2\lambda} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{\frac{3\lambda}{2}} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{\lambda} = 0 \end{cases}$$

Alors $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{V}(\lambda) = \frac{11\pi}{3}$

PARTIE B

1. $f'(x) = 1 \Leftrightarrow e^x - e^{\frac{x}{2}} - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} X = e^{\frac{x}{2}} > 0 \\ X^2 - X - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 5$$

$$X_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0; X_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 0$$

$$e^{\frac{x}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow x = 2 \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$$

Donc $\beta = 2 \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$ est l'unique solution de l'équation $f'(x) = 1$

$$f(\beta) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 - 2 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$$

D'où on a : $f(\beta) = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

2.

a. $g(x) = f(x) - x; D_g = \mathbb{R}$

$$g(\beta) = f(\beta) - \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2} - 2 \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$$

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0 \text{ et}$$

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1 \Leftrightarrow \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) > 0$$

$$\Leftrightarrow -2 \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2} - 2 \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) < 0$$

On en déduit que : $g(\beta) < 0$

$$g'(x) = f'(x) - 1$$

D'après la question 1)

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \beta$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; \beta[, g'(x) < 0$$

$$\forall x \in]\beta; +\infty[, g'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; \beta[, g$ est décroissante

Sur $]\beta; +\infty[, g$ est croissante

b. Sur $]-\infty; \beta[, g$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors g réalise une bijection de

$]-\infty; \beta[$ sur $]g(\beta); +\infty[$ et $0 \in$

$]g(\beta); +\infty[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution a dans $]-\infty; \beta[$
 $g(0) = -1 < g(a) = 0 \Leftrightarrow a < 0$

Par ailleurs :

Sur $]\beta; +\infty[, g$ est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors g réalise une bijection de $] \beta; +\infty[$ sur $]g(\beta); +\infty[$ et $0 \in]g(\beta); +\infty[$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution b dans $] \beta; +\infty[$
 $g(\beta) < 0 = g(b) \Leftrightarrow \beta < b$

Conclusion :

Les équations $g(x) = 0$ et $f(x) = x$ étant équivalentes, alors l'équation $f(x) = x$ admet exactement deux solutions a et b avec $a < 0 < \beta < b$

3. Dérivée seconde

$$f''(x) = e^x - \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} = e^{\frac{x}{2}} \left(e^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{2} \right)$$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{\frac{x}{2}} > 0$

Alors le signe de $f''(x)$ dépend de celui de $e^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}$

$$e^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow x > -2 \ln 2$$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; -2 \ln 2[, f''(x) < 0$

$\forall x \in]-2 \ln 2; +\infty[, f''(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $] -\infty; -2 \ln 2[$,

f' est décroissante

Sur $] -2 \ln 2; +\infty[$,

f' est croissante

Tableau de variation de f'

| | | | |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| x | $-\infty$ | $-2 \ln 2$ | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | - | 0 | + |
| $f'(x)$ | 0 | ↘ | ↗ |
| | | $-\frac{1}{4}$ | $+\infty$ |

4. D'après le tableau

précédent, f' atteint son minimum pour $x = -2 \ln 2$ et $f'(-2 \ln 2) = -\frac{1}{4}$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) \geq -\frac{1}{4}$

Déduction

D'après PARTIE A,

$\forall x \in]-\infty; 0], f'(x) \leq 0$

On en déduit que :

$$\forall x \in]-\infty; 0], -\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq 0$$

5. $x_0 = \beta$ et $x_{n+1} = f(x_n) \forall n \in \mathbb{N}$

a. D'après PARTIE A,

$\forall x \in]-\infty; 0], f(x) \in]-1; 0]$

Or $] -1; 0] \subset]-\infty; 0]$

D'où $\forall x \in]-\infty; 0], f(x) \in]-\infty; 0]$

Déduction

$$x_1 = f(x_0) = f(\beta) = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq 0$$

Supposons que $\forall n \geq 1, x_n \leq 0$ et montrons que $x_{n+1} \leq 0$

En effet :

$$x_n \leq 0 \Rightarrow f(x_n) \leq 0$$

Car $\forall x \in]-\infty; 0], f(x) \in]-\infty; 0]$

Or $x_{n+1} = f(x_n)$ par définition

D'où $x_{n+1} \leq 0$ si $x_n \leq 0$

On peut donc conclure que :

$$\forall n \geq 1, x_n \leq 0$$

b. On sait que $\forall x \in]-\infty; 0]$,

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{4}; a < 0 \text{ et } \forall n \geq 1, x_n \leq 0$$

Alors d'après l'inégalité de la moyenne on a :

$$\forall n \geq 1, \left| \int_a^{x_n} f'(t) dt \right| \leq \frac{1}{4} |x_n - a|$$

$$\Rightarrow |[f(t)]_a^{x_n}| \leq \frac{1}{4} |x_n - a|$$

$$\Rightarrow |f(x_n) - f(a)| \leq \frac{1}{4} |x_n - a|$$

Or $f(a) = a$ et $f(x_n) = x_{n+1}$

D'où $\forall n \geq 1,$

$$|x_{n+1} - a| \leq \frac{1}{4} |x_n - a|$$

Déduction

En partant de cette inégalité, on a :

$$n = 1 \Rightarrow |x_2 - a| \leq \frac{1}{4} |x_1 - a|$$

$$n = 2 \Rightarrow |x_3 - a| \leq \frac{1}{4} |x_2 - a|$$

$$n = 3 \Rightarrow |x_4 - a| \leq \frac{1}{4} |x_3 - a|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |x_n - a| \leq \frac{1}{4} |x_{n-1} - a|$$

Faisons le produit membre à membre de ces $(n - 1)$ inégalités.

On obtient après simplification :

$$|x_n - a| \leq \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} |x_1 - a|$$

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$a < 0$

$$\Leftrightarrow -a > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2} < x_1 - a < 0$$

$$\Leftrightarrow |x_1 - a| < \left| \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right|$$

$$\Leftrightarrow |x_1 - a| \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

Donc $\forall n \geq 1$,

$$|x_n - a| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} |x_1 - a| \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

c. $\forall n \geq 1, |x_n - a| \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 0 \text{ car } 0 < \frac{1}{4} < 1$$

Donc la suite $(|x_n - a|)$ converge vers 0 et par conséquent, la suite (x_n) converge vers a

PROBLEME 41**PARTIE A**

$$f(x) = x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) + \frac{x}{4} + \frac{1}{2} \text{ pour } x > 0$$

$$\text{et } f(0) = \frac{1}{2}; D_f = [0; +\infty[$$

**1. $g(x) = \ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4}$;
 $D_g =]0; +\infty[$**

a. Dérivée

$$g'(x) = -\frac{4}{(x+2)^2} < 0 \forall x \in]0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, g est décroissante

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \left(1 + \frac{2}{x} \right) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ln \left(1 + \frac{2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{4}$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+2} = 0 \end{cases}$

c. $g(]0; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x); \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) \right[$

$$g(]0; +\infty[) = \left] \frac{1}{4}; +\infty \right[$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 0$$

d. $g([2; 3]) = [g(3); g(2)]$

$$g([2; 3]) = [0,36; 0,44]$$

Par conséquent : $\forall x \in [2; 3]$,

$$0,36 \leq g(x) \leq 0,44$$

$$\text{Or } 0,44 < \frac{1}{2}$$

$$\text{D'où } \forall x \in [2; 3], g(x) < \frac{1}{2}$$

2.

a. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{2}{x} \right)$

$$\text{Posons } X = \frac{2}{x}$$

Si $x \rightarrow 0^+$, $X \rightarrow +\infty$ et

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2}{X} \ln(1+X)$$

$$= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2(X+1)}{X} \cdot \frac{\ln(1+X)}{1+X} = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2(X+1)}{X} = 2 \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+X)}{1+X} = 0 \end{cases}$$

On conclut que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) = 0$

On en déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$$

Et par suite :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

Alors f est continue en 0

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) + \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+2}{x} = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty \end{cases}$$

Alors f n'est pas dérivable en 0

Interprétation graphique

La courbe (\mathcal{C}) de f admet au point

$\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ une demi-tangente dirigée vers le haut

$$\text{c. } f'(x) = \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) + x \left[\frac{-2}{x(x+2)} \right] + \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = g(x) > 0 \quad \forall x \in]0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, f est croissante

3.

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2}{x} \right)$$

Posons $X = \frac{2}{x}$

Si $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} \ln(1+X) = \lim_{X \rightarrow +\infty} 2 \frac{\ln(1+X)}{X} = 2$$

$$\text{Car } \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1$$

On conclut que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) = 2$

b. On en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} + \frac{1}{2} = +\infty \end{cases}$$

$$\text{c. } (\Delta): y = \frac{x}{4} + \frac{5}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = 0$$


$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) = 2$$

Alors la droite (Δ) est une asymptote oblique à (\mathcal{C}) au voisinage de $+\infty$

4. Tracer de (\mathcal{C})

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|---------------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + |
| $f(x)$ | $\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |



PARTIE B

$$I = [2; 3]$$

1.

$$\text{a. } h(x) = f(x) - x; D_h = I$$

$$h'(x) = f'(x) - 1 = g(x) - 1$$

$$\text{Car } f'(x) = g(x)$$

$$\text{On sait que : } \forall x \in [2; 3], g(x) < \frac{1}{2}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in [2; 3], h'(x) < -\frac{1}{2} < 0$$

b. On en déduit que :

Sur $[2; 3]$, h est décroissante

h étant continue car dérivable et

strictement décroissante telle que

$$h(2) \times h(3) = -0,08 < 0$$

Alors l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α dans I

2.

$$\text{a. On sait que } \forall x \in [2; 3], 0 < g(x) < \frac{1}{2}$$

$$\text{Or } f'(x) = g(x)$$

$$\text{D'où } \forall x \in I, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$$

b. On sait que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ et

$\alpha \in I$

Alors d'après l'inégalité de la

moyenne on a : $\forall x \in I,$

$$\left| \int_{\alpha}^x f'(t) dt \right| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |[f(t)]_{\alpha}^x| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

Or $f(\alpha) = \alpha$ d'après 1b)

D'où $\forall x \in I,$

$$|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

3. $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = f(U_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

a. Par hypothèse, $U_n \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Prenons $\forall n \in \mathbb{N}, x = U_n$ dans

l'inégalité précédente

$$\text{On a : } |f(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_n - \alpha|$$

Or $U_{n+1} = f(U_n)$

D'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_n - \alpha| \quad (1)$$

En partant de cette inégalité, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_0 - \alpha|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_1 - \alpha|$$

$$n = 2 \Rightarrow |U_3 - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_2 - \alpha|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha|$$

Faisons le produit membre à

membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |U_0 - \alpha|$$

$$2 \leq \alpha \leq 3$$

$$\Rightarrow -1 \leq 2 - \alpha \leq 0$$

$$\Rightarrow |2 - \alpha| \leq 1$$

$$\Rightarrow |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |U_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \times 1$$

On en déduit que pour tout entier

$$\text{naturel } n, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (2)$$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{1}{2} < 1$

Alors la suite $(|U_n - \alpha|)$ converge

vers 0 et par conséquent, la suite

$(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α

c. On sait que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$$\text{Donc } \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \Rightarrow |U_n - \alpha| \leq 10^{-3}$$

$$\text{Or } \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \Leftrightarrow -n \ln 2 \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow n \geq 9,96$$

D'où on a $|U_n - \alpha| \leq 10^{-3} \quad \forall n \geq 10$

U_{n_0} est une valeur approchée de α à 10^{-3} près pour $n_0 = 10$ par exemple

PROBLEME 42

$f(x) = e^{x-1} - 1; D_f = \mathbb{R}$

PARTIE A

1. Dérivée

$f'(x) = e^{x-1} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

On en déduit que :


Sur \mathbb{R} , f est croissante

Tableau de variation de f

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | -1 | $+\infty$ |

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ car $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-1} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1} = +\infty$

Tracer de la courbe (C) de f



2.

a. Sur \mathbb{R} , f est continue car dérivable et est strictement croissante.

Alors f réalise une bijection de \mathbb{R} sur $J =]-1; +\infty[$

b. $\forall y \in]-1; +\infty[, f(x) = y$
 $\Leftrightarrow e^{x-1} = y + 1$
 $\Leftrightarrow x = 1 + \ln(y + 1) = f^{-1}(y)$

Donc $f^{-1}(x) = 1 + \ln(x + 1); x > -1$

c. Tracer la courbe (Γ) de f^{-1}
 (Γ) et (C) sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$
 (Voir le graphique)

3. $\varphi(x) = f(x) - x$

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(e^{-1} - e^{-x} - xe^{-x})$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0 \end{cases}$

b. $\varphi'(x) = e^{x-1} - 1$
 $e^{x-1} - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; 1[, \varphi'(x) < 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, \varphi'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 1[, \varphi$ est décroissante

Sur $]1; +\infty[, \varphi$ est croissante

Tableau de variation de φ

| | | | |
|---------------|-----------|----|-----------|
| x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $\varphi'(x)$ | - | 0 | + |
| $\varphi(x)$ | $+\infty$ | -1 | $+\infty$ |

D'après ce tableau :

Sur \mathbb{R} , φ est continue car dérivable et est strictement monotone sur chacun des intervalles $]-\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$

Alors φ réalise une bijection de chacun de ces deux intervalles sur $]-1; +\infty[$ et $0 \in]-1; +\infty[$

Donc l'équation $\varphi(x) = 0$ admet deux solutions telles que $a \in]-\infty; 1[$ et $b \in]1; +\infty[$.
 On a bien $a < b$

c. Déduction

Les deux équations $\varphi(x) = 0$ et $f(x) = x$ étant équivalentes, on déduit de ce qui précède que a et b sont les seules solutions de l'équation $f(x) = x$

$$\begin{cases} \varphi(2) = -0,28 < 0 \\ \varphi\left(\frac{5}{2}\right) = 0,98 > 0 \end{cases}$$

$$\text{On a } \varphi(2) \times \varphi\left(\frac{5}{2}\right) < 0 \text{ donc } 2 < b < \frac{5}{2}$$

4. $\mathcal{A} = ua \times \int_a^b (f^{-1}(x) - f(x)) dx$ ou encore $\mathcal{A} = 2ua \times \int_a^b (x - f(x)) dx$ à cause de la symétrie du domaine par rapport à la droite d'équation $y = x$

$$\int_a^b (x - f(x)) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - e^{x-1} + x \right]_a^b$$

$$\int_a^b (x - f(x)) dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) + b - a + e^{a-1} - e^{b-1}$$

$$\text{Or } \begin{cases} f(a) = a \\ f(b) = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^{a-1} = a + 1 \\ e^{b-1} = b + 1 \end{cases}$$

$$\text{D'où } \int_a^b (x - f(x)) dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

$$ua = 4 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A} = 4(b^2 - a^2) \text{ cm}^2$$

PARTIE B

$$g(x) = \ln(x+1) + 1; x \in I = \left[2; \frac{5}{2}\right]$$

1. $\forall x \in I, f(x) = x$
 $\Leftrightarrow e^{x-1} = x + 1$
 $\Leftrightarrow x = \ln(x+1) + 1$
 $\Leftrightarrow g(x) = x$

Alors sur I , l'équation $f(x) = x$ équivaut à l'équation $g(x) = x$

2.
 a. $2 \leq x \leq \frac{5}{2} \Leftrightarrow 3 \leq x+1 \leq \frac{7}{2}$
 $\Leftrightarrow 1,09 \leq \ln(x+1) \leq 1,25$
 $\Leftrightarrow 2,09 \leq g(x) \leq 2,25$
 Or $[2,09; 2,25] \subset \left[2; \frac{5}{2}\right]$

$$\text{D'où } \forall x \in I, g(x) \in I$$

- b. $\forall x \in I, g'(x) = \frac{1}{x+1}$
 $2 \leq x \leq \frac{5}{2} \Leftrightarrow 3 \leq x+1 \leq \frac{7}{2}$
 $\Leftrightarrow 0 \leq \frac{2}{7} \leq g'(x) \leq \frac{1}{3}$

$$\text{Donc } \forall x \in I, 0 \leq g'(x) \leq \frac{1}{3}$$

- c. On sait que $\forall x \in I, |g'(x)| \leq \frac{1}{3}$ et $b \in I$

Alors d'après l'inégalité de la moyenne on a : $\forall x \in I,$

$$\left| \int_b^x g'(t) dt \right| \leq \frac{1}{2} |x - b|$$

$$\Rightarrow |[g(t)]_b^x| \leq \frac{1}{2} |x - b|$$

$$\Rightarrow |g(x) - g(b)| \leq \frac{1}{2} |x - b|$$

Or $g(b) = b$ d'après 1)

D'où $\forall x \in I,$

$$|g(x) - b| \leq \frac{1}{2} |x - b|$$

3. $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = g(w_n) \forall n \geq 0$
 a. $w_0 = 2 \in I$
 $\forall n \geq 0$, supposons que $w_n \in I$ et montrons que $w_{n+1} \in I$

En effet :

$$w_n \in I \Rightarrow g(w_n) \in I$$

$$\text{Car } \forall x \in I, g(x) \in I$$

Or $w_{n+1} = g(w_n)$ par définition

D'où $w_{n+1} \in I$ si $w_n \in I$

On peut donc conclure que

$$\forall n \geq 0, w_n \in I$$

- b. Prenons $x = w_n \forall n \geq 0$ dans l'inégalité 2c)

$$\text{On a : } |g(w_n) - b| \leq \frac{1}{2} |w_n - b|$$

$$\text{Or } w_{n+1} = g(w_n)$$

D'où $\forall n \geq 0,$

$$|w_{n+1} - b| \leq \frac{1}{3} |w_n - b|$$

- c. En partant de l'inégalité précédente, on a :

$$n = 0 \Rightarrow |w_1 - b| \leq \frac{1}{3} |w_0 - b|$$

$$n = 1 \Rightarrow |w_2 - b| \leq \frac{1}{3} |w_1 - b|$$

$$n = 2 \Rightarrow |w_3 - b| \leq \frac{1}{3} |w_2 - b|$$

:

$$n = n - 1 \Rightarrow |w_n - b| \leq \frac{1}{3} |w_{n-1} - b|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|w_n - b| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n |w_0 - b|$$

$$2 \leq b \leq \frac{5}{2} \text{ et } w_0 = 2$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq w_0 - b \leq 0$$

$$\Leftrightarrow |w_0 - b| \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow |w_n - b| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n |w_0 - b| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n \times \frac{1}{2}$$

Donc $\forall n \geq 0,$

$$|w_n - b| \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{1}{3} < 1$

Alors la suite $(|w_n - b|)$ converge vers 0 et par conséquent la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers b
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = b$

e. On sait que $|w_q - b| \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^q$ et par conséquent :

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^q \leq 10^{-2} \Rightarrow |w_q - b| \leq 10^{-2}$$

$$\text{Or } \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^q \leq 10^{-2}$$

$$\Leftrightarrow -\ln 2 - q \ln 3 \leq -2 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow q \geq \frac{2 \ln 10 + \ln 2}{\ln 3}$$

$$\Leftrightarrow q \geq 4,82$$

$$\text{D'où } |w_q - b| \leq 10^{-2} \quad \forall q \geq 5$$

Par exemple pour $q = 5$, w_q est une valeur approchée de b à 10^{-2} près

PROBLEME 43**PARTIE A**

$$(E): y' - 2y = \frac{2}{1+e^{-2x}}$$

1. $y' - 2y = 0$

$$\Leftrightarrow y' = 2y$$

$$\Leftrightarrow y = ke^{2x}; k \in \mathbb{R}$$

$$y(0) = 1 \Leftrightarrow k = 1$$

Donc la solution de l'équation

$y' - 2y = 0$ qui prend la valeur 1

en 0 est la fonction définie sur \mathbb{R}

par : $y = e^{2x}$

2. $f(x) = e^{2x}g(x); D_f = \mathbb{R}$

et $f(0) = \ln 2$

a. $g(x) = e^{-2x}f(x)$

$$g(0) = f(0) = \ln 2$$

b. $f'(x) = 2e^{2x}g(x) + e^{2x}g'(x)$

$$\text{Donc } f'(x) = e^{2x}[g'(x) + 2g(x)]$$

c. f est solution de (E)

$$\Leftrightarrow f'(x) - 2f(x) = \frac{2}{1+e^{-2x}}$$

$$\Leftrightarrow e^{2x}[g'(x) + 2g(x)] - 2e^{2x}g(x)$$

$$= \frac{2}{1+e^{-2x}}$$

$$\Leftrightarrow e^{2x}g'(x) = \frac{2}{1+e^{-2x}}$$

$$\Leftrightarrow g'(x) = \frac{2e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$$

Alors f est solution de (E) si, et

seulement si $g'(x) = \frac{-2e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$

d. Dédution

$$g'(x) = \frac{-2e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Avec $u(x) = 1 + e^{-2x}$

Par conséquent :

$$g(x) = \ln(1 + e^{-2x}) + K; K \in \mathbb{R}$$

$$g(0) = \ln 2 \Leftrightarrow K = 0$$

Et donc $g(x) = \ln(1 + e^{-2x})$

D'autres parts :

$$f(x) = e^{2x}g(x)$$

$$\text{Alors } f(x) = e^{2x} \ln(1 + e^{-2x})$$

PARTIE B

$$f(x) = e^{2x} \ln(1 + e^{-2x}); D_f = \mathbb{R}$$

1. $h(x) = \ln(1 + e^{-2x}) - \frac{e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$

a. Limite en $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0$$

b. Dérivée

$$h'(x) = -\frac{2e^{-4x}}{(1+e^{-2x})^2} < 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , h est décroissante

c. On déduit du sens de variation h

$$h(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) \right[$$

$$h(\mathbb{R}) = \left] 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) \right[$$

Par conséquent :

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(x) > 0$$

2. $f'(x) = 2e^{2x} \left[\ln(1 + e^{-2x}) - \frac{e^{-2x}}{1+e^{-2x}} \right]$

$$f'(x) = 2e^{2x} h(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2e^{2x} > 0$$

Alors $f'(x)$ est du même signe que $h(x)$

Par conséquent :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^{-2x})}{e^{-2x}}$

Posons $X = e^{-2x}$

Si $x \rightarrow +\infty, X \rightarrow 0$ et

$$\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1$$

On conclut donc que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

D'autres parts :

$$f(x) = e^{2x} \ln(1 + e^{-2x})$$

$$= e^{2x} \ln e^{-2x} (e^{2x} + 1)$$

$$= e^{2x} [\ln e^{-2x} + \ln(e^{2x} + 1)]$$

$$f(x) = e^{2x} [-2x + \ln(1 + e^{2x})]$$

Déduction

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2xe^{2x} + e^{2x} \ln(1 + e^{2x})$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \end{cases}$

4. Tableau de variation de f


Sur \mathbb{R} , f est croissante

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | 0 | 1 |

5. Représentation de (C)

Tangente à l'origine du repère

$$(T): y = (2 \ln 2 - 1)x + \ln 2$$



PARTIE C

1. On remarque que :

$$\frac{1}{1+e^{-2x}} = \frac{1}{e^{-2x}(1+e^{-2x})} = \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Avec $u(x) = 1 + e^{2x}$

D'où une primitive sur \mathbb{R} , de la

fonction $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-2x}}$ est par

exemple la fonction définie sur \mathbb{R}

par $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2x})$

$$\mathcal{A} = ua \times \int_{-1}^0 f(x) dx$$

On sait que $f'(x) - 2f(x) = \frac{2}{1+e^{-2x}}$

Donc $f(x) = \frac{1}{2} f'(x) - \frac{1}{1+e^{-2x}}$

Par conséquent :

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \left[\frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2x}) \right]_{-1}^0$$

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = 1 - \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) \ln(1 + e^2)$$

$$ua = 25 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A} = 25 \left[1 - \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) \ln(1 + e^2) \right] \text{ cm}^2$$

PARTIE D

$U_0 = 0$ et $U_{n+1} = f(U_n) \forall n \in \mathbb{N}$

1. $f([0; 1]) = [f(0); f(1)] = [\ln 2; 0,93]$

Par conséquent :

$$\forall x \in [0; 1], f(x) \in [\ln 2; 0,93]$$

Or $[\ln 2; 0,93] \subset [0; 1]$

D'où $\forall x \in [0; 1], f(x) \in [0; 1]$

Déduction

$$U_0 = 0 \in [0; 1]$$

$\forall n \geq 0$, supposons que $U_n \in [0; 1]$
et montrons que $U_{n+1} \in [0; 1]$

On déduit de ce qui précède que :

$$U_n \in [0; 1] \Rightarrow f(U_n) \in [0; 1]$$

$$\text{Or } f(U_n) = U_{n+1}$$

$$\text{D'où } U_{n+1} \in [0; 1] \text{ si } U_n \in [0; 1]$$

On peut donc conclure que :

$$\forall n \geq 0, U_n \in [0; 1]$$

2. Démonstration par récurrence

$$U_0 = 0 \text{ et } U_1 = f(U_0) = \ln 2$$

$$\text{On a donc } U_1 > U_0$$

$\forall n \geq 0$, supposons que $U_{n+1} > U_n$

et montrons que $U_{n+2} > U_{n+1}$

On déduit du sens de variation de f
que :

$$U_{n+1} > U_n \Rightarrow f(U_{n+1}) > f(U_n)$$

$$\text{Or } f(U_{n+1}) = U_{n+2} \text{ et } f(U_n) = U_{n+1}$$

$$\text{D'où } U_{n+2} > U_{n+1} \text{ si } U_{n+1} > U_n$$

On peut donc conclure que :

$\forall n \geq 0, U_{n+1} > U_n$ et que la suite
 (U_n) est croissante

Déduction

On sait que $\forall n \geq 0, U_n \in [0; 1]$

(U_n) étant croissante et majorée, par
exemple par 1, alors elle converge

3. Soit $\alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

On a :

$$f(\alpha) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(U_n)$$

Car f est continue sur \mathbb{R}

$$\text{Donc } f(\alpha) = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_{n+1}$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$$

$$\text{D'où } f(\alpha) = \alpha$$

D'autres parts :

$$\forall n \geq 0, 0 \leq U_n \leq 1$$

En passant à la limite, on a :

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \leq 1$$

C'est-à-dire que $\alpha \in [0; 1]$

PROBLEME 44

$$f(x) = \frac{1}{1+e^x} \text{ et } g(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$D_f = D_g = \mathbb{R}$$

PARTIE A

1.

a. Dérivée

$$f'(x) = -\frac{e^x}{(1+e^x)^2} < 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

On en déduit que :

Sur \mathbb{R} , f est décroissante

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

On déduit de ces résultats que :

(\mathcal{C}) admet deux asymptotes
horizontales d'équation $y = 0$ au
voisinage de $+\infty$ et d'équation
 $y = 1$ au voisinage de $-\infty$

$$\text{c. } \Omega\left(0; \frac{1}{2}\right)$$

$$f(2 \times 0 - x) + f(x) = f(-x) + f(x) \\ = \frac{1}{1+e^{-x}} + \frac{1}{1+e^x} = \frac{e^x}{e^x+1} + \frac{1}{1+e^x} = 1$$

$$f(2 \times 0 - x) + f(x) = 2 \times \frac{1}{2}$$

**Alors $\Omega\left(0; \frac{1}{2}\right)$ est un centre de
symétrie de (\mathcal{C})**

d. On note (T) la tangente à (\mathcal{C}) au
point $\Omega\left(0; \frac{1}{2}\right)$


Le coefficient directeur de (T) est

$$f'(0) = -\frac{1}{4}$$

e. Tracer de (T) et (C)

Tableau de variation de f

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
| f'(x) | - | |
| f(x) | 1 | 0 |



2.

a. $g(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ et $f(-x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$

Donc $g(x) = f(-x)$

On en déduit que :

La courbe (Γ) de g est l'image de la courbe (C) de f par rapport à la symétrie orthogonale d'axe (O; j)

b. $f(x) + g(x) = f(x) + f(-x) = 1$
d'après 1c)

On a : $\frac{f(x)+g(x)}{2} = \frac{1}{2}$

Alors la courbe (Γ) de g est l'image de la courbe (C) de f par la symétrie orthogonale d'axe la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$

c. (T') est la tangente à (Γ) au point $\Omega(0; \frac{1}{2})$

On a $g'(x) = -f'(x)$

Donc le coefficient directeur de

(T') est : $g'(0) = -f'(0) = \frac{1}{4}$

d. Représentation de (T') et (Γ)
(Voir la figure)

PARTIE B

On note $I = \int_0^1 f(t) dt$ et

$J = \int_0^1 g(t) dt$

1. $I + J = \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 g(t) dt$

$I + J = \int_0^1 (f(t) + g(t)) dt = \int_0^1 dt$

Donc on a : $I + J = 1$

2.

a. $\forall t \in \mathbb{R}, \frac{1}{1+e^{-t}} = \frac{1}{e^{-t}(\frac{1}{e^{-t}}+1)}$

Or $\frac{1}{e^{-t}} = e^t$ d'où $\frac{1}{1+e^{-t}} = \frac{e^t}{e^t+1}$

b. $\frac{1}{1+e^{-t}} = \frac{e^t}{e^t+1} = \frac{u'(t)}{u(t)}$

Avec $u(t) = e^t + 1$

On en déduit qu'une primitive de g sur \mathbb{R} , est par exemple la fonction G définie sur \mathbb{R} par $G(t) = \ln(e^t + 1)$

Par conséquent :

$J = \int_0^1 g(t) dt = [\ln(e^t + 1)]_0^1$

$J = \ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$

3. On sait que $I + J = 1$

D'où $I = 1 - \ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$

4.

a. $\forall x \in [0; +\infty[, -x \leq 0 \leq x$

$\Leftrightarrow e^{-x} \leq e^x$

$\Leftrightarrow 0 < 1 + e^{-x} \leq 1 + e^x$

$\Leftrightarrow \frac{1}{1+e^x} \leq \frac{1}{1+e^{-x}}$

Donc $\forall x \in [0; +\infty[, f(x) \leq g(x)$

b. $\mathcal{A} = ua \times \int_0^1 (g(x) - f(x)) dx$

$\int_0^1 (g(x) - f(x)) dx$

$= \int_0^1 g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx$

$\int_0^1 (g(x) - f(x)) dx = J - I$

$ua = 16 \text{ cm}^2$

Donc $\mathcal{A} = 16(J - I) \text{ cm}^2$

On en déduit que :

$\mathcal{A} = 16 \left[-1 + 2 \ln\left(\frac{e+1}{2}\right) \right] \text{ cm}^2$

PARTIE C

$$h(x) = e^{-x} \ln(1 + e^{-x})$$

$$\text{et } H(x) = \int_0^x h(t) dt$$

$$D_h = D_H =]0; +\infty[$$

1.

a. **H est la primitive de h sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 0**

b. On en déduit que :

$$H'(x) = h(x)$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, e^x > 0 \text{ et}$$

$$1 + e^{-x} > 1 \Leftrightarrow \ln(1 + e^{-x}) > 0$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; +\infty[, H'(x) = h(x) > 0$$

On en déduit que :

Alors sur $]0; +\infty[$, H est croissante

2.

a. $h'(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) + e^x \times \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}}$

$$h'(x) = h(x) - \frac{1}{1+e^{-x}} = h(x) - g(x)$$

$$\text{Donc } h(x) = h'(x) + g(x)$$

b. $H(x) = \int_0^x h(t) dt$

$$H(x) = \int_0^x (h'(t) + g(t)) dt$$

$$H(x) = [h(t) + G(t)]_0^x$$

Don on a :

$$H(x) = (e^x + 1) \ln(e^x + 1) - xe^x - 2 \ln 2$$

PROBLEME 45**PARTIE A**

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + x - 1; D_f =]0; +\infty[$$

1. $g(x) = x^3 - 2 \ln x + 1; D_g =]0; +\infty[$

a. **Dérivée**

$$g'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} = \frac{3x^3 - 2}{x}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x > 0$$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $3x^3 - 2$

$$3x^3 - 2 > 0 \Leftrightarrow x > \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in \left]0; \sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right[, g'(x) < 0$$

$$\forall x \in \left[\sqrt[3]{\frac{2}{3}}; +\infty\right[, g'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $\left]0; \sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right[$, g est décroissante

Sur $\left[\sqrt[3]{\frac{2}{3}}; +\infty\right[$, g est croissante

b. On déduit de ce qui précède que g atteint son minimum pour $x = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; +\infty[, g(x) \geq g\left(\sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right)$$

$$\text{Or } g\left(\sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right) = \frac{2}{3} \left(1 - \ln \frac{2}{3}\right) + 1 > 0$$

$$\text{D'où } \forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 0$$

2.

a. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - 2x \ln x}{x^4} + 1$

$$f'(x) = \frac{x^3 - 2 \ln x + 1}{x^3}$$

$$\text{On a donc } f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, x^3 > 0$$

Alors $f'(x)$ et $g(x)$ sont de même signe

b. Calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = 1 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \end{cases}$

Tableau de variation de f

D'après 1), $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, f est croissante

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

c. (Δ) : $y = x - 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$$

Alors la droite (Δ) : $y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$

Position de (C) et (Δ)

$$f(x) - y = \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[$$
, $x^2 > 0$

Alors le signe de $f(x) - y$ dépend de celui de $\ln x$

$$\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[$$
, $f(x) - y < 0$

$$\forall x \in]1; +\infty[$$
, $f(x) - y > 0$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$,

(C) est en dessous de (Δ)


Sur $]1; +\infty[$,

(C) est au dessus de (Δ)

d. (T) : $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

$$\text{D'où } (T): y = 2x - 2$$

3. Tracer de (T) et (Δ) puis (C)



PARTIE B

Soit $\lambda > 1$

1. $\mathcal{A}(\lambda) = ua \times \int_1^\lambda (f(x) - y) dx$

$$\int_1^\lambda (f(x) - y) dx = \int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2} dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\int_1^\lambda (f(x) - y) dx = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^\lambda + \int_1^\lambda \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int_1^\lambda (f(x) - y) dx = \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^\lambda$$

$$\int_1^\lambda (f(x) - y) dx = 1 - \frac{\ln \lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \left(1 - \frac{\ln \lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} \right) ua$$

2. $\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\ln \lambda}{\lambda} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} = 0 \end{cases}$

Alors $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$
Et donc $L = 1$

3. $\mathcal{A}(\lambda) = \frac{L}{2} \Leftrightarrow 1 - \frac{\ln \lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow 2\lambda - 2 \ln \lambda - 2 = \lambda$$

$$\Leftrightarrow -2 \ln \lambda + \lambda - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \ln \lambda - \lambda + 2 = 0 \quad (E)$$

Donc l'équation : $\mathcal{A}(\lambda) = \frac{\lambda}{2}$ est équivalente à l'équation (E)

4. Soit h la fonction définie sur $]1; +\infty[$

par : $h(\lambda) = 2 \ln \lambda - \lambda + 2$

$$h'(\lambda) = \frac{2}{\lambda} - 1 = \frac{2-\lambda}{\lambda}$$

$\forall \lambda \in]1; +\infty[, \lambda > 0$

Alors le signe de $h'(\lambda)$ dépend de

celui de $2 - \lambda$

$$2 - \lambda > 0 \Leftrightarrow \lambda < 2$$

Par conséquent :

$\forall \lambda \in]1; 2[, h'(\lambda) > 0$

$\forall \lambda \in]2; +\infty[, h'(\lambda) < 0$

On en déduit que :

Sur $]1; 2[, h$ est croissante

Sur $]2; +\infty[, h$ est décroissante

Tableau de variation de h

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|
| λ | 1 | 2 | $+\infty$ |
| $h'(\lambda)$ | | + | 0 - |
| $h(\lambda)$ | | $2 \ln 2$ | |
| | 1 | | $-\infty$ |

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} h(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda \left(2 \frac{\ln \lambda}{\lambda} - 1 + \frac{2}{\lambda} \right)$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} h(\lambda) = -\infty$$

Sur $]1; 2[, h(\lambda) \in]1; 2 \ln 2]$ donc $h(\lambda) \neq 0$

Sur $]2; +\infty[, h$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors h réalise une bijection de

$]2; +\infty[$ sur $] -\infty; 2 \ln 2[$ et

$0 \in] -\infty; 2 \ln 2[$

Donc l'équation $h(\lambda) = 0$ admet une unique solution a dans $]2; +\infty[$

On conclut alors que a est l'unique solution sur $]1; +\infty[$ de l'équation (E)

$$\begin{cases} h(5) = 0,21 > 0 \\ h(6) = -0,41 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h(5) = 0,21 > 0 \\ h(6) = -0,41 < 0 \end{cases}$$

On a $h(5) \times h(6) < 0$

Alors $5 < a < 6$

PARTIE C

$U_0 = 5$ et $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = \varphi(U_n)$ où $\varphi(x) = 2 \ln x + 2; D_\varphi =]0; +\infty[$

1.

a. $U_0 = 5 \in [5; 6]$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n \in [5; 6]$

et montrons que $U_{n+1} \in [5; 6]$

$U_n \in [5; 6] \Rightarrow 5 \leq U_n \leq 6$

$$\Rightarrow 2 \ln 5 + 2 \leq 2 \ln U_n + 2 \leq 2 \ln 6 + 2$$

$$\Rightarrow 5,21 \leq \varphi(U_n) \leq 5,58$$

Or $\varphi(U_n) = U_{n+1}$ et

$$[5,21; 5,58] \subset [5; 6]$$

D'où $U_{n+1} \in [5; 6]$ si $U_n \in [5; 6]$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [5; 6]$$

b. $\varphi'(x) = \frac{2}{x} > 0 \forall x \in]0; +\infty[$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[, \varphi$ est croissante

$$U_0 = 5; U_1 = \varphi(U_0) = 5,21$$

On a donc $U_1 > U_0$

$\forall n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_{n+1} > U_n$

et montrons que $U_{n+2} > U_{n+1}$

$$U_{n+1} > U_n \Rightarrow \varphi(U_{n+1}) > \varphi(U_n)$$

Or $\varphi(U_{n+1}) = U_{n+2}$ et $\varphi(U_n) = U_{n+1}$

D'où $U_{n+2} > U_{n+1}$ si $U_{n+1} > U_n$

On conclut donc que :

$\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} > U_n$ et par conséquent la suite (U_n) est croissante

c. La suite (U_n) étant croissante et majorée par exemple par 6, alors elle est convergente

2.

a. $\forall x \in [5; 6], \frac{2}{6} \leq \frac{2}{x} \leq \frac{2}{5}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq \varphi'(x) \leq \frac{2}{5}$$

Par conséquent :

$$\forall x \in [5; 6], |\varphi'(x)| \leq \frac{2}{5}$$

b. On sait que $a \in [5; 6]$ et

$\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [5; 6]$

Alors d'après l'inégalité de la moyenne on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left| \int_a^{U_n} \varphi'(t) dt \right| \leq \frac{2}{5} |U_n - a|$$

$$\Rightarrow |[\varphi(t)]_a^{U_n}| \leq \frac{2}{5} |U_n - a|$$

$$\Rightarrow |\varphi(U_n) - \varphi(a)| \leq \frac{2}{5} |U_n - a|$$

Or $\varphi(a) = a$ car les équations $\varphi(x) = x$ et (E) sont équivalentes et $\varphi(U_n) = U_{n+1}$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N}, \\ |U_{n+1} - a| \leq \frac{2}{5} |U_n - a|$$

c. En partant de cette inégalité on a :

$$n = 0 \Rightarrow |U_1 - a| \leq \frac{2}{5} |U_0 - a|$$

$$n = 1 \Rightarrow |U_2 - a| \leq \frac{2}{5} |U_1 - a|$$

$$n = 2 \Rightarrow |U_3 - a| \leq \frac{2}{5} |U_2 - a|$$

⋮

$$n = n - 1 \Rightarrow |U_n - a| \leq \frac{2}{5} |U_{n-1} - a|$$

Faisons le produit membre à membre de ces n inégalités.

On obtient après simplification :

$$|U_n - a| \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n |U_0 - a|$$

$$5 \leq a \leq 6$$

$$\Rightarrow -1 \leq U_0 - a \leq 0$$

$$\Rightarrow |U_0 - a| \leq 1$$

$$\Rightarrow |U_n - a| \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n |U_0 - a| \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n \times 1$$

On en déduit que pour tout entier naturel n , $|U_n - a| \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{2}{5} < 1$

Alors la suite $(|U_n - a|)$ converge vers 0 et par conséquent, la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a

3. On sait que $|U_n - a| \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n$

Donc

$$\left(\frac{2}{5}\right)^n \leq 10^{-3} \Rightarrow |U_n - a| \leq 10^{-3}$$

$$\text{Or } \left(\frac{2}{5}\right)^n \leq 10^{-3}$$

$$\Leftrightarrow -n \ln \left(\frac{5}{2}\right) \leq -3 \ln 10$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{3 \ln 10}{\ln \left(\frac{5}{2}\right)}$$

$$\Leftrightarrow n \geq 7,53$$

D'où on a $|U_n - a| \leq 10^{-3} \forall n \geq 8$

U_n est une valeur approchée de a à 10^{-3} près pour $n = 10$ par exemple

PROBLEME 46

PARTIE A

$$\begin{cases} f(x) = 2x(1 - \ln x) \text{ pour } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$$D_f = [0; +\infty[$$

1. Continuité en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \\ \text{Alors } f \text{ est continue en 0}$$

Dérivabilité en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Alors f n'est pas dérivable en 0
Interprétation graphique

A l'origine O du repère, (C) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

2.

a. Dérivée

$$f'(x) = -\ln x$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, -\ln x > 0$$

$$\Leftrightarrow 0 < x < 1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[, f'(x) > 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$, f est croissante

Sur $]1; +\infty[$, f est décroissante

b. $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{cases}$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

c. Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|---|-------|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | + | 0 - |
| $f(x)$ | 0 | ↗ 2 ↘ | $-\infty$ |

3.

a. Coordonnées de N

$$x_N = 1; y_N = f(1) = 2$$

Donc $N(1; 2)$ et la tangente à (C) au point N a pour coefficient directeur $f'(1) = 0$

Coordonnée de R

$$f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } \ln x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = e$$

Donc $R(e; 0)$ et la tangente à (C) au point R a pour coefficient directeur $f'(e) = -1$

Coordonnées de Q


$$f'(x_Q) = 2$$

$$\Leftrightarrow -\ln x_Q = 2$$

$$\Leftrightarrow x_Q = e^{-2} \text{ et } y_Q = 6e^{-2}$$

Donc $Q(e^{-2}; 6e^{-2})$ et la tangente à (C) au point Q a pour coefficient directeur $f'(e^{-2}) = 2$

b. Tracer de (C)



PARTIE B

1. $\varphi(x) = f(x); D_\varphi = [1; +\infty[$

a. D'après les variations de f :

Sur $[1; +\infty[$, φ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors φ réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur $J =]-\infty; 2]$

b. (C') et la partie de (C) correspondant à $[1; +\infty[$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ (Voir le graphique)

2. $g(x) = 2x(\ln x - 1); D_g = [0; +\infty[$
 $g(x) = -f(x)$ et $D_f = D_g$

Alors (Γ) et (C) sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses (Voir le graphique)

PARTIE C

1. Soit $\lambda \in]0; e[$

$$I(\lambda) = \int_\lambda^e x \ln x \, dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$$

$$I(\lambda) = \left[\frac{1}{2}x^2 \ln x \right]_\lambda^e - \int_\lambda^e \frac{1}{2}x \, dx$$

$$I(\lambda) = \left[\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 \right]_\lambda^e$$

$$I(\lambda) = \frac{e^2}{4} + \frac{\lambda^2}{4} - \frac{1}{2}\lambda^2 \ln \lambda$$

2. Dédisons $\mathcal{A}(\lambda) = \int_\lambda^e f(x) \, dx$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 \int_\lambda^e x \, dx - 2 \int_\lambda^e x \ln x \, dx$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = [x^2]_\lambda^e - 2I$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}\lambda^2 + \lambda^2 \ln \lambda$$

Interprétation géométrique

$\mathcal{A}(\lambda)$ représente l'aire en unité d'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = e$

3. $\lim_{a \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda) = \frac{e^2}{2}$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{a \rightarrow 0^+} a^2 \ln a = 0 \\ \lim_{a \rightarrow 0^+} a^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = \frac{e^2}{2}$$

4. **Déduction**

(C) et (Γ) étant symétrique, on a :

$\mathcal{A} = \mathcal{A}'$ en unité d'aire

Or $ua = 4 \text{ cm}^2$

$$\text{D'où } \mathcal{A}' = 2e^2 \text{ cm}^2$$

PROBLEME 47

PARTIE A

1. $g(x) = \frac{2x^2}{x^2+1} - \ln(x^2 + 1);$

$D_g = [0; +\infty[$

a. Dérivée

$$g'(x) = \frac{2x(1+x)(1-x)}{(x^2+1)^2}$$

$\forall x \in [0; +\infty[, 2x \geq 0; (x^2 + 1)^2 > 0$
 et $1 + x > 0$

Alors le signe de $g'(x)$ dépend de celui de $1 - x$

$1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1$

Par conséquent :

$\forall x \in [0; 1[, g'(x) > 0$

$\forall x \in]1; +\infty[, g'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $[0; 1[, g$ est croissante

Sur $]1; +\infty[, g$ est décroissante

Tableau de variation de g

| | | | |
|---------|---|-------------|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | + | 0 | - |
| $g(x)$ | 0 | $1 - \ln 2$ | $-\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2+1} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 1 = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty \end{cases}$

b. Sur $[1; +\infty[, g$ est continue car dérivable et est strictement décroissante.

Alors g réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur $] -\infty; 1 - \ln 2]$ et $0 \in] -\infty; 1 - \ln 2]$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[1; +\infty[$

$\begin{cases} g(\frac{7}{4}) = 0,105 > 0 \\ g(2) = -0,009 < 0 \end{cases}$

**On a : $g(\frac{7}{4}) \times g(2) < 0$
 Alors $\frac{7}{4} \leq \alpha \leq 2$**

2. D'après le tableau de variation de g , on a :

$$\forall x \in [0; \alpha[, g(x) > 0$$

$$\forall x \in [\alpha; +\infty[, g(x) < 0$$

PARTIE B

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{x} \text{ si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$D_f = \mathbb{R}$

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2+1)}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1$$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \end{cases}$

Alors f est dérivable en 0 et

$f'(0) = 1$

Interprétation graphique

A l'origine O du repère, (C) admet une tangente d'équation de coefficient directeur $f'(0) = 1$ et d'équation $y = x$

2. $f(-x) = -f(x) \forall x \in \mathbb{R}$

Alors f est une fonction impaire
Déduction

La courbe (C) de f est symétrique par rapport à l'origine du repère

3. $\forall x \in [0; +\infty[,$

$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ si $x \neq 0$ et $f'(0) = 1$

$\forall x \in]0; +\infty[, x^2 > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $g(x)$

Par conséquent :

$\forall x \in [0; \alpha[, f'(x) > 0$

$\forall x \in [\alpha; +\infty[, f'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $[0; \alpha[, f$ est croissante

Sur $[\alpha; +\infty[, f$ est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|---|-------------|-----------|
| x | 0 | α | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | 0 | $f(\alpha)$ | 0 |

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \times \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \times \ln \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{array} \right.$

4. $\varphi(x) = \ln(x + 1) - x$;

$D_\varphi =]-1; +\infty[$

a. $\varphi'(x) = \frac{-x}{x+1}$

$\forall x \in]-1; +\infty[, x + 1 > 0$

Alors le signe de $\varphi'(x)$ dépend de celui de $-x$

Par conséquent :

$\forall x \in]-1; 0[, \varphi'(x) > 0$

$\forall x \in]0; +\infty[, \varphi'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]-1; 0[, \varphi$ est croissante

Sur $]0; +\infty[, \varphi$ est décroissante

Tableau de variations de φ

| | | | |
|---------------|----|---|-----------|
| x | -1 | 0 | $+\infty$ |
| $\varphi'(x)$ | + | 0 | - |
| $\varphi(x)$ | | | |

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \varphi(x) = -\infty$$

Car $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^+} (x + 1) = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty \end{array} \right.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty$$

Car

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} \times \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0 \end{array} \right.$$

b. On déduit de ce qui précède que : φ atteint son maximum en 0 et $\varphi(0) = 0$

Donc $\forall x \in]-1; +\infty[, \varphi(x) \leq 0$
Ceci montre bien que :
 $\forall x > -1, \ln(1 + x) \leq x$

c. La tangente en 0 a pour équation $y = x$

$$f(x) - y = \frac{\ln(x^2+1) - x^2}{x}$$

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 > -1$

Alors $\ln(1 + x^2) \leq x^2$ d'après 4b)

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; 0[, f(x) - y > 0$


$\forall x \in]0; +\infty[, f(x) - y < 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[, (C)$ est au dessus de sa tangente en 0

Sur $]0; +\infty[, (C)$ est en dessous de sa tangente en 0

5. Tracer de (C)



PARTIE C

$F(x) = \int_0^x f(t)dt ; D_F = \mathbb{R}$

1. Soit $r > 0$

$F(r) = \int_0^r f(t)dt$ est l'aire en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = r$

Par ailleurs :

$F(-r) = \int_0^{-r} f(t)dt = - \int_{-r}^0 f(t)dt$

est l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -r$ et $x = 0$

Or ces deux domaines sont symétriques par rapport à l'origine du repère

D'où $F(r)$ et $F(-r)$ sont les aires de domaines isométriques du plan

Déduction

Deux domaines isométriques du plan ont même aire.

D'où $F(-r) = F(r)$

On en déduit que F est une fonction paire

2. F est la primitive de f sur \mathbb{R} qui s'annule en 0

Par conséquent :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = f(x)$$

Et d'après les variations de f :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, F'(x) < 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, F'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[$, F est décroissante

Sur $]0; +\infty[$, F est croissante

- 3.

- a. $\forall x \in [0; 1], 0 \leq f(x) \leq x$
 $\Leftrightarrow 0 \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 x dx$

Or $\int_0^1 f(x) dx = F(1)$ et

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

D'où on a bien : $0 \leq F(1) \leq \frac{1}{2}$

- b. $\forall t \geq 1$, on a : $t^2 \geq 1$ et donc :
 $t^2 \leq t^2 + 1 \leq t^2 + t^2$
 $\Leftrightarrow t^2 \leq t^2 + 1 \leq 2t^2$
 $\Leftrightarrow \ln(t^2) \leq \ln(t^2 + 1) \leq \ln(2t^2)$

Donc $\forall t \geq 1, \frac{\ln(t^2)}{t} \leq \frac{\ln(t^2+1)}{t} \leq \frac{\ln(2t^2)}{t}$

- c. $\forall x \geq 1, \int_1^x \frac{\ln(t)}{t} dt = \left[\frac{1}{2} (\ln t)^2 \right]_1^x$

$$\int_1^x \frac{\ln(t)}{t} dt = \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

Déduction : $\forall t \geq 1$,

$$\int_1^x \frac{\ln(t^2)}{t} dt \leq \int_1^x \frac{\ln(t^2+1)}{t} dt \leq \int_1^x \frac{\ln(2t^2)}{t} dt$$

$$\Leftrightarrow \int_1^x \frac{\ln(t^2)}{t} dt \leq \int_1^x f(t) dt \leq \int_1^x \frac{\ln(2t^2)}{t} dt$$

$$\text{Or } \int_1^x f(t) dt = \int_1^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$$

$$= - \int_0^1 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$$

$$= F(x) - F(1)$$

D'où on a $\forall t \geq 1$,

$$\int_1^x \frac{\ln(t^2)}{t} dt \leq F(x) - F(1) \leq \int_1^x \frac{\ln(2t^2)}{t} dt$$

Posons

$$\begin{cases} u = t^2 \Rightarrow \begin{cases} du = 2t dt = 2\sqrt{u} dt \\ dv = 2t^2 \Rightarrow \begin{cases} dv = 4t dt = 2\sqrt{2}\sqrt{v} dt \\ \Rightarrow \begin{cases} dt = \frac{du}{2\sqrt{u}} \\ dt = \frac{\sqrt{2}dv}{2\sqrt{v}} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

On en déduit que :

$$\int_1^x \frac{\ln(t^2)}{t} dt = \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{x}} \frac{\ln(u)}{u} du = \frac{1}{16} (\ln x)^2$$

$$\text{Et } \int_1^x \frac{\ln(2t^2)}{t} dt = \int_1^{\sqrt{x}} \frac{\ln(v)}{v} dv = \frac{1}{8} (\ln x)^2$$

Et par conséquent : $\forall x \geq 1$,

$$F(1) + \frac{1}{16} (\ln x)^2 \leq F(x) \leq F(1) + \frac{1}{8} (\ln x)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{ et } 0 \leq F(1) \leq \frac{1}{2}$$

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$

D'autres parts : $\forall x \geq 1$,

$$\frac{F(1)}{x} + \frac{1}{16} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)^2 \leq \frac{F(x)}{x} \leq \frac{F(1)}{x} + \frac{1}{8} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1)}{x} = 0$$

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$


Interprétation graphique

La courbe de F admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

4. Tableau de variations de F

| | | |
|---------|---|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $F'(x)$ | | + |
| $F(x)$ | 0 | $+\infty$ |

F étant une fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées



PROBLEME 48

PARTIE A

$$g(x) = x - 1 + \frac{\ln x}{2}; D_g =]0; +\infty[$$

1. Dérivée

$$g'(x) = 1 + \frac{1}{2x} > 0 \forall x \in]0; +\infty[$$

On en déduit que :

Sur $]0; +\infty[$, g est croissante

Tableau de variation de g

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | | + |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{cases}$$

2. $g(1) = 0$

Déduction :

g étant croissante et $g(1) = 0$ alors :

$$\begin{aligned} \forall x \in]0; 1[; g(x) < 0 \\ \forall x \in]1; +\infty[; g(x) > 0 \end{aligned}$$

PARTIE B

$$f(x) = \sqrt{x} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}; D_f =]0; +\infty[$$

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \times \ln x$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0 \end{cases}$$

$$2. f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{\frac{1}{x} \times \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \times \ln x}{2x}$$

$$f'(x) = \frac{2x - 2 + \ln x}{4x\sqrt{x}} = \frac{x - 1 + \frac{\ln x}{2}}{2x\sqrt{x}}$$

$$\text{Or } g(x) = x - 1 + \frac{\ln x}{2}$$

$$\text{D'où } f'(x) = \frac{g(x)}{2x\sqrt{x}}$$

3. $\forall x \in]0; +\infty[; 2x\sqrt{x} > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $g(x)$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[; f'(x) < 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[; f'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$, f est croissante

Sur $]1; +\infty[$, f est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | |
|---------|-----------|---|-----------|
| x | 0 | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | | - | 0 |
| $f(x)$ | $+\infty$ | 1 | $+\infty$ |

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \sqrt{x}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = 0$

Déduction

Au voisinage de $+\infty$, (\mathcal{C}) et (\mathcal{C}_0) sont asymptotes

5. $f(x) - \sqrt{x} = -\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}$

$$\forall x \in]0; +\infty[; 2\sqrt{x} > 0$$

Alors le signe de $f(x) - \sqrt{x}$ dépend de celui de $-\ln x$.

$$-\ln x > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

Par conséquent :

$$\forall x \in]0; 1[; f(x) - \sqrt{x} > 0$$


$$\forall x \in]1; +\infty[; f(x) - \sqrt{x} < 0$$

On en déduit que :

Sur $]0; 1[$, (\mathcal{C}) est au dessus de (\mathcal{C}_0)

Sur $]1; +\infty[$, (\mathcal{C}) est en dessous de (\mathcal{C}_0)

6. Tracer de (C) et (C₀)



PARTIE C

$$U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k}{n}\right); n > 0$$

1. $J = \int_1^2 f(x) dx$

a. Interprétation géométrique

J est l'aire en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

b. Calcul de $\int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \sqrt{x} \end{cases}$$

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx = [\sqrt{x} \ln x]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx = [\sqrt{x} \ln x - 2\sqrt{x}]_1^2$$

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx = 2 - 2\sqrt{2} + \sqrt{2} \ln 2$$

c. $J = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \sqrt{x} dx - \int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx$

$$J = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}\right]_1^2 - \int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx$$

$$J = \frac{10\sqrt{2}-8}{3} - \sqrt{2} \ln 2$$

2. Démonstration par récurrence

Soit $k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n - 1$

On sait que f est croissante sur $[1; +\infty[$

Vérifions la propriété au rang 1

Pour $n = 1, k = 0$ et on a :

$$\forall x \in [1; 2], f(1) \leq f(x) \leq f(2)$$

Et d'après l'inégalité de la moyenne on a :

$$f(1) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f(2)$$

Par conséquent :

$$f\left(1 + \frac{0}{1}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{1}{1}\right)$$

$\forall n > 0$, supposons que $\forall k,$

$$0 \leq k \leq n - 1,$$

$$f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

et montrons que $\forall k, 0 \leq k \leq n$

$$f\left(1 + \frac{k}{n+1}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n+1}\right)$$

En effet : $\forall k, 0 \leq k \leq n$

Si $0 \leq k \leq n - 1$, on a par hypothèse

$$f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

$$\text{Or } 1 \leq 1 + \frac{k}{n+1} \leq 1 + \frac{k}{n}$$

D'où l'inégalité (1) :

$$f\left(1 + \frac{k}{n+1}\right) \leq f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx$$

D'autres parts :

Si $1 \leq k \leq n$, alors $0 \leq k - 1 \leq n - 1$ et on a par hypothèse

$$f\left(1 + \frac{k-1}{n}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

$$\text{Or } 1 \leq 1 + \frac{k}{n} \leq 1 + \frac{k+1}{n+1}$$

D'où l'inégalité (2) :

$$\int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n+1}\right)$$

Les inégalités (1) et (2) montrent que

$\forall k, 0 \leq k \leq n,$

$$f\left(1 + \frac{k}{n+1}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n+1}\right)$$

Si $\forall k, 0 \leq k \leq n - 1,$

$$f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

On peut donc conclure que :

$\forall n > 0$ et $\forall k, 0 \leq k \leq n - 1,$

$$f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

3. On déduit de ce qui précède que :

$$\frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \int_1^2 f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq n \times \frac{1}{n} \int_1^2 f(x) dx \leq$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

$$\text{Or } U_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k}{n}\right) +$$

$$\frac{1}{n} f\left(1 + \frac{n}{n}\right); \int_1^2 f(x) dx = J \text{ et}$$

$$U_n = \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{0}{n}\right) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$

D'où on a bien :

$$U_n - \frac{f(2)}{n} \leq J \leq U_n - \frac{f(1)}{n}$$

$$4. U_n - \frac{f(2)}{n} \leq J \leq U_n - \frac{f(1)}{n}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{f(2)}{n} \leq J - U_n \leq -\frac{f(1)}{n}$$

$$\Leftrightarrow -J - \frac{f(2)}{n} \leq -U_n \leq -J - \frac{f(1)}{n}$$

$$\text{Donc } J + \frac{f(1)}{n} \leq U_n \leq J + \frac{f(2)}{n}$$

Déduction

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(1)}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(2)}{n} = 0$$

Alors en passant à la limite, on a :

$$J \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \leq J$$

$$\text{On en déduit que : } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = J$$

PROBLEME 49

PARTIE A

$$f_1(x) = (x + 1)e^{-x},$$

$$f_2(x) = -xe^{-x},$$

$$f_3(x) = (x - 1)e^{-x}$$

$$D_{f_1} = D_{f_2} = D_{f_3} = \mathbb{R}$$

1.

a. Dérivée

$$f_1'(x) = -xe^{-x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$$

Alors le signe de $f_1'(x)$ dépend de celui de $-x$.

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 0[, f_1'(x) > 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[, f_1'(x) < 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 0[$, f_1 est croissante

Sur $]0; +\infty[$, f_1 est décroissante

b. Calcul des limites


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = 0$$

$$\text{Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0 \end{cases}$$

c. Tableau de variations de f_1

| | | | |
|-----------|---|-----|-----------|
| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f_1'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ |
| $f_1(x)$ |  | | |

2. Dérivée

$$f_2'(x) = (x - 1)e^{-x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$$

Alors le signe de $f_2'(x)$ dépend de celui de $x - 1$.

Par conséquent :

$$\forall x \in]-\infty; 1[, f_2'(x) < 0$$

$$\forall x \in]1; +\infty[, f_2'(x) > 0$$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 1[$, f_2 est décroissante

Sur $]1; +\infty[$, f_2 est croissante

Tableau de variation de f_2

| | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $f_2'(x)$ | - | 0 | + |
| $f_2(x)$ | $+\infty$ | e^{-1} | 0 |

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = +\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = 0$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$

3.

a. Dérivée

$f_3'(x) = (2 - x)e^{-x}$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$

Alors le signe de $f_3'(x)$ dépend de celui de $2 - x$.

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; 2[, f_3'(x) > 0$

$\forall x \in]2; +\infty[, f_3'(x) < 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; 2[, f_3$ est croissante

Sur $]2; +\infty[, f_3$ est décroissante

b. Calcul des limites

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_3(x) = -\infty$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_3(x) = 0$

Car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0 \end{cases}$

c. Tableau de variation de f_3

| | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| x | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $f_3'(x)$ | + | 0 | - |
| $f_3(x)$ | $-\infty$ | e^{-2} | 0 |

4. Position de (C_1) et (C_2)

$f_1(x) - f_2(x) = (2x + 1)e^{-x}$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$

Alors le signe de $f_1(x) - f_2(x)$ dépend de celui de $2x + 1$.

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; -\frac{1}{2}[, f_1(x) - f_2(x) < 0$

$\forall x \in]-\frac{1}{2}; +\infty[, f_1(x) - f_2(x) > 0$

On en déduit que :

Sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[,$

(C_1) est en dessous de (C_2)

Sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[,$

(C_1) est au dessus de (C_3)

Positions de (C_1) et (C_3)

$f_1(x) - f_3(x) = 2e^{-x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Alors sur \mathbb{R} ,

(C_1) est au dessus de (C_3)

Positions de (C_2) et (C_3)

$f_2(x) - f_3(x) = (1 - 2x)e^{-x}$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$

Alors le signe de $f_2(x) - f_3(x)$ dépend de celui de $1 - 2x$.

Par conséquent :

$\forall x \in]-\infty; \frac{1}{2}[, f_2(x) - f_3(x) > 0$

$\forall x \in]\frac{1}{2}; +\infty[, f_2(x) - f_3(x) < 0$

On en déduit que :


Sur $]-\infty; \frac{1}{2}[,$

(C_2) est au dessus de (C_3)

Sur $]\frac{1}{2}; +\infty[,$

(C_2) est en dessous de (C_3)

5. Tracer de (C_1) , (C_2) et (C_3)



PARTIE BSoit $\lambda > -1$

1. $f_1'(x) + f_1(x) = -xe^{-x} + (x+1)e^{-x}$

$$f_1'(x) + f_1(x) = e^{-x}$$

Alors f_1 est une solution de l'équation différentielle

$$y' + y = e^{-x}$$

Déduction

$$f_1(x) = e^{-x} - f_1'(x)$$

On en déduit qu'une primitive de f_1 sur \mathbb{R} est par exemple la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$F_1(x) = -e^{-x} - f_1(x) = -(x+2)e^{-x}$$

2. $\mathcal{A}(\lambda) = ua \times \int_{-1}^{\lambda} f_1(x) dx$

$$\int_{-1}^{\lambda} f_1(x) dx = [-(x+2)e^{-x}]_{-1}^{\lambda}$$

$$\int_{-1}^{\lambda} f_1(x) dx = e - (\lambda+2)e^{-\lambda}$$

$$ua = 4 \text{ cm}^2$$

$$\text{Donc } \mathcal{A}(\lambda) = 4[e - (\lambda+2)e^{-\lambda}] \text{ cm}^2$$

Déduction

$$\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} = 0$$

$$\text{Alors } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 4e$$

3. $\mathcal{B}(\lambda) = ua \times \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} (f_3(x) - f_2(x)) dx$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} (f_3(x) - f_2(x)) dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} (2x-1)e^{-x} dx$$

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = 2x-1 \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 2 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} (f_3(x) - f_2(x)) dx$$

$$= [-(2x-1)e^{-x}]_{\frac{1}{2}}^{\lambda} + 2 \int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} e^{-x} dx$$

$$= [-(2x+1)e^{-x}]_{\frac{1}{2}}^{\lambda}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\lambda} (f_3(x) - f_2(x)) dx$$

$$= 2e^{-\frac{1}{2}} - (2\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$ua = 4 \text{ cm}^2$$

Donc

$$\mathcal{B}(\lambda) = 4 \left[2e^{-\frac{1}{2}} - (2\lambda+1)e^{-\lambda} \right] \text{ cm}^2$$

Déduction

$$\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{B}(\lambda) = 8e^{-\frac{1}{2}}$$

PARTIE C

$$f(x) = f_1(x) - f_3(x) = 2e^{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

1. $U_n = \int_{n \ln 2}^{(n+1) \ln 2} f(x) dx$

$$U_n = [-2e^{-x}]_{n \ln 2}^{(n+1) \ln 2}$$

$$U_n = \frac{1}{2^n}$$

2. $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{2^n}$$

En passant à la limite, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

$$\text{Car } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

Alors la suite (S_n) converge vers 1

PROBLEME 50

$$f(x) = e^{-x} \sin x; D_f = \mathbb{R}$$

PARTIE A

1.

a. Dérivée

$$f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$$

Vérification

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sqrt{2}e^{-x} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) \\ &= \sqrt{2}e^{-x} \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos x - \sin \frac{\pi}{4} \sin x \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f'(x) = \sqrt{2}e^{-x} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\text{b. } x \in [0; 2\pi] \Leftrightarrow \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{9\pi}{4} \right]$$

Par conséquent :

$$\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$$

$$\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) > 0 \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; 2\pi \right]$$

Déduction

$$\forall x \in [0; 2\pi], \sqrt{2}e^{-x} > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$

D'après ce qui précède :

$$\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{4} \right], f'(x) > 0$$

$$\forall x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right], f'(x) < 0$$

$$\forall x \in \left[\frac{5\pi}{4}; 2\pi \right], f'(x) > 0$$

c. Tableau de variation de f sur $[0; 2\pi]$

Sur $\left[0; \frac{\pi}{4} \right]$ et sur $\left[\frac{5\pi}{4}; 2\pi \right]$,

f est croissante

Sur $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right]$, f est décroissante

Tableau de variation de f

| | | | | | |
|---------|---|--|--|--------|---|
| x | 0 | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | 2π | |
| $f'(x)$ | + | 0 | - | 0 | + |
| $f(x)$ | 0 | $\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{5\pi}{4}}$ | 0 | |

Tangente à (C) en 0 et 2π

$$(T_0): y = x$$

$$(T_{2\pi}): y = e^{-2\pi}(x - 2\pi)$$

2.

a. Points de rencontre de (C) et (C_1)

$$(C) = (C_1)$$

$$\Leftrightarrow \sin x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Alors sur l'intervalle $[0; 2\pi]$, (C) rencontre (C_1) aux points d'abscisse $\frac{\pi}{2}$

Points de rencontre de (C) et (C_2)

$$(C) = (C_2)$$

$$\Leftrightarrow \sin x = -1$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Alors sur l'intervalle $[0; 2\pi]$, (C) rencontre (C_2) au point d'abscisse $\frac{3\pi}{2}$

$$\text{b. } f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{2}} \cos \frac{3\pi}{4} = -e^{-\frac{\pi}{2}} \text{ et } f \left(\frac{\pi}{2} \right) = e^{-\frac{\pi}{2}} \sin \frac{\pi}{2} = e^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = -e^{-\frac{\pi}{2}} \text{ et } f \left(\frac{\pi}{2} \right) = e^{-\frac{\pi}{2}}$$

Alors (C) et (C_1) ont une même tangente au point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$

D'autres parts


$$f' \left(\frac{3\pi}{2} \right) = \sqrt{2}e^{-\frac{3\pi}{2}} \cos \frac{7\pi}{4} = e^{-\frac{3\pi}{2}} \text{ et } f \left(\frac{3\pi}{2} \right) = e^{-\frac{3\pi}{2}} \sin \frac{3\pi}{2} = -e^{-\frac{3\pi}{2}}$$

$$f' \left(\frac{3\pi}{2} \right) = e^{-\frac{3\pi}{2}} \text{ et } f \left(\frac{3\pi}{2} \right) = -e^{-\frac{3\pi}{2}}$$

$$f' \left(\frac{3\pi}{2} \right) = e^{-\frac{3\pi}{2}} \text{ et } f \left(\frac{3\pi}{2} \right) = -e^{-\frac{3\pi}{2}}$$

Alors (C) et (C_2) ont une même tangente au point d'abscisse $\frac{3\pi}{2}$

c. Représentons (C) , (C_1) et (C_2)



3. $\Phi(x) = e^{-2\pi} f(x - 2\pi); D_\Phi = \mathbb{R}$
 $= e^{-2\pi} [e^{-x+2\pi} \sin(x - 2\pi)]$
 $= e^{-x} \sin(x - 2\pi)$
 $\Phi(x) = e^{-x} \sin x$
 Car $\sin(x + 2k\pi) = \sin x \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

On a donc $\Phi(x) = f(x)$ et $D_\Phi = D_f$
Alors les courbes (C) et (C')
coïncident

PARTIE B

1.
 a. On sait que :
 $f''(x) = -2e^{-x} \cos x$
 $f'(x) = e^{-x} (\cos x - \sin x)$
 $f(x) = e^{-x} \sin x$
Par conséquent :
 $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$

On conclut donc que f est solution de l'équation différentielle : $y'' + 2y' + 2y = 0$

Déduction

$2f(x) = -2f'(x) - f''(x)$
D'où $f(x) = -\frac{1}{2}(2f'(x) + f''(x))$

b. Une primitive sur \mathbb{R} de f est par exemple la fonction définie sur \mathbb{R} par : $x \mapsto -\frac{1}{2}(2f(x) + f'(x))$

c. $F(x) = \int_0^x f(t) dt$
 $F(x) = \left[-\frac{1}{2}(2f(t) + f'(t)) \right]_0^x$
 $F(x) = \left[-\frac{e^{-t}}{2} (\cos t + \sin t) \right]_0^x$

$F(x) = \frac{1}{2} - \frac{e^{-x}}{2} (\cos x + \sin x)$

2. $B_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt; k \in \mathbb{N}$

Soit $S_n = B_0 + B_1 + \dots + B_n$

a. $S_n = \int_0^\pi f(t) dt + \int_\pi^{2\pi} f(t) dt + \dots + \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(t) dt$

D'après la relation de Chasles :

$S_n = \int_0^{(n+1)\pi} f(t) dt$

Or $\int_0^x f(t) dt = F(x)$

D'où $S_n = F((n+1)\pi)$

b. Déduction

$S_n = \frac{1}{2} - \frac{e^{-(n+1)\pi}}{2} (\cos(n+1)\pi + \sin(n+1)\pi)$

$\Leftrightarrow S_n = \frac{1}{2} + (-1)^n \frac{e^{-(n+1)\pi}}{2}$

Car $\cos(n+1)\pi = (-1)^{n+1} = -(-1)^n$

$\Leftrightarrow \left| S_n - \frac{1}{2} \right| = \frac{e^{-(n+1)\pi}}{2}$

$\Leftrightarrow \left| S_n - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{e^{-n\pi}}{2}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-n\pi}}{2} = 0$ car $0 < e^{-\pi} < 1$

Alors la suite (S_n) admet une

limite et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{2}$

3.

a. $f(t) = e^{-t} \sin t$

$\forall t \in \mathbb{R}, e^{-t} > 0$

Alors le signe de $f(t)$ dépend de celui de $\sin t$

$\sin t \geq 0$

$\Leftrightarrow t \in [2k\pi; (2k+1)\pi], k \in \mathbb{Z}$

$\sin t \leq 0$

$\Leftrightarrow t \in [(2k+1)\pi; 2(k+1)\pi], k \in \mathbb{Z}$

Par conséquent :

$\forall t \in [k\pi; (k+1)\pi]$

On a : $f(t) \geq 0$ si k est pair

$\Rightarrow \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt \geq 0$

$\Rightarrow B_k \geq 0$

Et on a : $f(t) \leq 0$ si k est impair

$$\Rightarrow \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt \leq 0$$

$$\Rightarrow B_k \leq 0$$

On conclut donc que :

$B_k \geq 0$, si k est pair

$B_k \leq 0$, si k est impair

b. $B_0 = \int_0^\pi f(t) dt = F(\pi)$

$$B_0 = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

$$B_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(t) dt$$

$$= \int_0^{(k+1)\pi} f(t) dt - \int_0^{k\pi} f(t) dt$$

$$= F((k+1)\pi) - F(k\pi)$$

$$= (-1)^k \frac{e^{-(k+1)\pi}}{2} + (-1)^k \frac{e^{-k\pi}}{2}$$

$$B_k = (-1)^k e^{-k\pi} \left(\frac{1 + e^{-\pi}}{2} \right)$$

On a bien : $B_k = (-1)^k e^{-k\pi} B_0$

c. $T_n = |B_0| + |B_1| + \dots + |B_n|$

On sait que :

$$|B_k| = e^{-k\pi} B_0 \text{ car } |(-1)^k| = 1$$

Par conséquent :

$$T_n = B_0 + e^{-\pi} B_0 + \dots + e^{-n\pi} B_0$$

$$= B_0 (1 + e^{-\pi} + \dots + e^{-n\pi})$$

$$= B_0 \times \frac{1 - e^{-(n+1)\pi}}{1 - e^{-\pi}}$$

Donc

$$T_n = \frac{B_0}{1 - e^{-\pi}} (1 - e^{-(n+1)\pi})$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-(n+1)\pi} = 0 \text{ car } 0 < e^{-\pi} < 1$$

Alors T_n admet une limite lorsque n tend vers l'infini et on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \frac{B_0}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}$$

d. $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et $T = \lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$

Vérification

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{T} = 2 + \frac{2(1 - e^{-\pi})}{1 + e^{-\pi}} = \frac{4}{1 + e^{-\pi}}$$

$$\text{Or } B_0 = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

D'où on a bien :

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{T} = \frac{2}{B_0}$$