

SOINS ESSENTIELS

Definition: stratégie globale visant à améliorer la santé et la survie des NN par le biais d'un panel d'intervention réalisé avant la conception pendant la grossesse, immédiatement après l'accouchement ainsi que le période post-natale.
Les soins sont limités au 90 première minute de vie.

Interet:

- ↳ la Mortalité NN en cycle 33/1000.
- ↳ la Mortalité et la Morbosité Maternelle.

I ACCUEIL DU NN

- 1 - Dispositif de l'Agent de santé.
- 2 - Matériel de soins
- 3 -

II TECHNIQUE de soins

- * 1 minute de vie:
- Vérifier la Respiration
 - sécher le NN
 - Peau à peau avec la mère
 - Couvrir le NN
 - Porter le Bonnet au NN
- * 1- 60 min de vie
- ligature et couper le cordon (3 min de vie)
 - T°C toutes 15 min x 4/h
 - communiquer avec la mère pour la mise au seins.
 - Mise au seins 30 et 60 min de vie.

* 60 et 90 minute de vie.

- Examiner le NN
- Administrer 1mg de Vit K₁ si $\geq 1500g$ ou 0,5g si $< 1500g$
- 2 goutte de collyre antiseptique dans chaque œil.

III - Après les soins.

TOILETTE DU NN

Definitio : l'ensemble des soins de propreté du corps.
indiquée chez le NN dont le cordon n'a pas encore
chuté.

I - Accueil

- 1- Dispositif de l'Agent de santé
- 2- matériel de soins.
l'Agent de santé doit adapter ce matériel selon son milieu
- 3- Precaution à prendre.

II - Technique

La toilette est exécutée le matin avant le début des
soins curatifs.

- contact avec le client.
- déroulement de la toilette.
- + la toilette se fait de la tête (front) au pieds et
terminer par le siège (fesse).
- + Avant le déroulement il faut ~~insiste~~ insister sur les pis
- + Après passer aux soins des orifices.

BAIN DE L'ENFANT ELYSIUM ACADEMIC

Def: c'est l'immersion du corps de l'enfant dans l'eau

il existe 3 types de bain - Propriété

- détente

- thérapeutique

* Bain de Propriété: (Après chute du cordon et cicatrises)
Annique tous les autre enfant.

* Bain de détente: (Realisé chez un enfant manifestant un
de sir (sommeil, fatigue, chaleur)
c'est un bain occasionnelle

* Bain thérapeutique: soin Realisé en cas de dermatose

NB: le bain thérapeutique en cas fièvre n'est plus
Recommandé comme moyen physique pour traiter
la fièvre.

I - Accueil

- disposition de l'agent de soins
- matériel de soins.
- précaution à prendre

la température de l'eau doit être tiède.

II - Technique de soins

- contact avec le client
- Doroulement.
- Après le bain

SOINS DES ORIFICES

Dr Brou Elyse

Def: Ensemble des geste éliminant les sécrétions et microbes pouvant influencer la fonction normale des orifice

Indication {

- Infection de l'orifice
- sécrétion à brulante
- Maladies infectieuse
- Malnutrition
- Erythème fessier

I Accueil

- Disposition
- matériel
- précaution

II technique.

- Réaliser Après le bain, toilette ou occasionnel au decour de toilette

- Réaliser en présence de la mère

- * Soins des yeux
- * Soins des oreille (on ne nettoie de l'oreille que ce que l'on voit)
- * Soins du Nez
- * Soins de la bouche
- * Soins des organes génitaux externes.

SOINS OMBILICAUX

avant naissance des soins

Def: Ensemble des pratiques permettant de nettoyer, protéger le moignon du cordon de manière aseptique jusqu'à la chute de et la cicatrisation de la plaie.

en CI l'antiseptique retenu est la chlorhexidine.

Il se déroule en 3 phases:

- pansement du cordon frais: 3 premiers jours de vie.
- " " " " cordon sec: J₄ → chute du moignon.
- " " " " plaie ombilicale: 8 à 10 jours.

I - Accueil

- dispositif
- matériel
- précaution.

II - Technique

les soins ombilicaux sont réalisés après la toilette

l'application de la chlorhexidine se fait de la pointe à la base du cordon.

Résultats: - chute du moignon entre 5^e et 8^e jour.

+ précoce < 4^e J.

+ tardive > 14^e J.

+ Retardée > 21^e J.

Accidents incidents
 Probleme { Hemorragie ombilicale
 Granulome ~~placentaire~~ bourgeonnement
 (craie de nitrate d'argent)
 Maladies { omphalite
 - Tetanos

INCUBATEUR NEONATAL

C'est un dispositif médical, destiné à maintenir le Nouveau-né ou prématuré dans une Atmosphère appropriée en terme de T°C, humidité et d'oxygène.

- 2 type d'incubateurs: - fermés
 - ouverts ou table Radiantes/chauffante

Indication

- NN de petit poids (Hypotrophie)
- Hypothermie
- transport médicalisé.

les ≠ partie d'incubateur

+ l'habillage (~~habillage~~)

hublots latéraux | les tubulures
 - sole
 - Tuyaux

hublots à la tête (Passage du matériel propre)

hublots aux pieds (Passage des mains et matériel sole)

+ la partie thermique

Fonction principale de l'incubateur.

- Maintenir le NN dans la TC Normale.
(plus il est immature + besoin de chaleur)
- Assurer la respiration.
- protéger des infections
- surveillance clinique

Element de surveillance

Chez l'enfant: - lot

- coloration

- Respiration

- Rythme cardiaque

Au niveau de l'incubateur

- Vérifier l'eau dans le bac

- fonctionnement de l'incubateur

- Assurer l'entretien

Carnet de SANTÉ M-G

document médico-légal, dossier médical
et instrument de liaison.

Il permet de suivre l'enfant depuis la grossesse
Jusqu'à l'âge de 18 ans.

Comprend 4 parties :

- 1^{ère} partie \Rightarrow identité

2^e " " \Rightarrow suivie de la grossesse.

3^e " " \Rightarrow l'Accouchement.

4^e " " \Rightarrow suivie de l'enfant.

Mensuration.

les mesures anthropométriques déterminent les dimensions
du corps humain.

Ces mesures sont appelées indicateurs de croissance.
(Poids, Taille, PC, PB)

Il permet de :

- suivre de la croissance
- État nutritionnelle
- Ajuster les doses de Médicaments
- Régime Alimentaire.

Matière

* Mesure du poids

- Pèse bébé \leq 2ans
- Pèse personne $>$ 2ans

* ~~Pese~~ Mesure de la Taille. (une toise)

elle dépend de :

- l'hérédité

- la santé de l'enfant

- la Nutrition de l'enfant

Avant 2 ans en position couchée
Après 2 ans en position debout.

* Mesure du P.C.

Avec du Mètre Ruban permet de d'apprécier le Volume du cerveau Jusqu'à 2 à 3 ans.

* Mesure du P.B.

permet d'apprécier l'état nutritionnel du Nourisson entre 1 et 2 ans il est de 14 - 16 cm.

NB : tout enfant de plus de 2 ans dont le P.B est < 12 cm est malnutri.

se fait à l'aide de Badellette de Shakir ou M. Ruban

Rythme de Surveillance.

- NN \Rightarrow 1 consultation / semaine.

- NRS \Rightarrow 1 est / mois

- ~~P~~ Petit enfant \Rightarrow 1 consul / 3 mois

- Grand enfant \Rightarrow 1 est / 6 mois.

Repères Normaux de Croissance Somatique

1 - Règne de Poids

- 3 Kg à la naissance.
- il perd 10% de son poids p^ort les 4 premiers Jour
- récupère en 10^e et 15^e Jour
- cette perte est physiologique.
- le poids est double à 3 mois. ou à 5 mois si lait artificiel
- " " triple à 12 mois.
- " " se multiplie par 4

2 - Taille

- 50 cm à la naissance.
- 3 cm / mois \Rightarrow entre 0 - 3 mois
- 2 cm / mois \Rightarrow entre 3 - 6 mois
- 1-1,5 cm / mois \Rightarrow entre 6 - 12 mois
- 10 cm / an \Rightarrow entre 12 mois - 4 ans.
- x 2 à 4 ans.

3 - PC

- 35 cm à la naissance
- 2 cm / mois entre 0 - 3 mois
- 1 cm / mois entre 3 - 6 mois
- 0,5 cm / mois entre 6 - 12 mois
- 10 cm / an entre ~~12 mois~~ 1 - 4 ans.

$$- PC = \frac{I_{\text{bill}}}{2} + 10$$

- À l'Age ~~de~~ Adulte 57 cm.

4- PB

- Normale est 14 à 16 cm entre 1 et 2 ans.
- Si < 12 cm malnutri.