


**Partie A**

On considère la fonction  $f$  définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$  où  $a$ ,  $b$  et  $c$  désignent trois nombres réels que l'on se propose de déterminer dans cette partie. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté  $(C)$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans le plan muni du repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unités graphiques 2 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées.

On admet que la droite  $(D)$  passe par  $A$  et est tangente à la courbe  $(C)$  au point  $B$ .

1. a. À l'aide d'une lecture graphique, déterminer les coordonnées entières des points  $A$  et  $B$ . En déduire  $f(-3)$  et  $f(0)$ .
- b. Montrer qu'une équation de la droite  $(AB)$  est:  $y = x + 3$ . En déduire la valeur de  $f'(0)$ .



2.a Montrer que, pour tout  $x$  appartenant à  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = (-ax^2 + (2a - b)x + b - c)e^{-x}$ .

b. En déduire  $f'(0)$  en fonction de  $b$  et  $c$ .

3.a. En utilisant les questions précédentes, montrer que les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont solutions du système

$$\begin{cases} 9a - 3b + c = 0 \\ b - c = 1 \\ c = 3 \end{cases}$$

Résoudre le système et en déduire l'expression de  $f(x)$  en fonction de  $x$ .

**Partie B**

On suppose que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x^2 + 4x + 3)e^{-x}$ .

1. a. Vérifier que pour  $x$  différent de zéro,  $f(x) = \left(1 + \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}\right)x^2 e^{-x}$ .
- b. Déterminer la limite de la fonction  $f$  en  $+\infty$ . En déduire une asymptote à la courbe  $(C)$ .
- c. Déterminer la limite de la fonction  $f$  en  $-\infty$ .
2. a. Vérifier que, pour tout  $x$  appartenant à  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = (-x^2 - 2x + 1)e^{-x}$ .
- b. Pour tout  $x$  réel, étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ .
- c. Calculer une valeur approchée à  $10^{-1}$  près de l'ordonnée de chacun des points de la courbe  $(C)$  où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
3. Montrer que l'équation  $f(x) = 2$  admet une solution unique  $\alpha$ , pour  $x$  appartenant à l'intervalle  $[-1; 0]$ .

Donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-2}$ .

**Partie C**

1. Soit  $F$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $F(x) = (-x^2 - 6x - 9)e^{-x}$ .

Montrer que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

2. En déduire une primitive,  $G$ , de la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x + 3 - f(x)$ .
3. On considère la partie du plan comprise entre la droite  $(D)$ , la courbe  $(C)$  et les droites d'équations  $x = -3$  et  $x = 0$ . On désigne par  $A$  la valeur, exprimée en  $\text{cm}^2$ , de l'aire de cette partie. Calculer  $A$ .