LE PAKAO

Matière

MATHEMATIQUES TL

Sources

DIVERS

Interdiction de commercialisation

numéro alerte : 221 78 370 3151

ENONCE

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1} \text{ et } C \text{ sa courbe représentative dans le plan}$$

muni d'un repère orthonormal (unité graphique 2 cm).

A. Etude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x^3 - 3x - 4$.

1. Etudier la fonction g .
2. Montrer qu'il existe un réel $\mathbf{a}$ unique tel que $g(\mathbf{a}) = 0$, puis déterminer une valeur approchée de $\mathbf{a}$ à 10^{-2} près.
3. Etudier le signe de g sur $\mathbb{R}$.

B. Etude de la fonction f

1. Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de chacun des intervalles de son ensemble de définition.
2. Montrer que pour tout x de $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$:

$$f'(x) = \frac{x g(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

3. a. Montrer que pour tout x de $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$:

$$f(x) = x + 2 + \frac{x + 2}{x^2 - 1}$$

3. b. Etudier la position de la courbe C par rapport à D d'équation $y = x + 2$.
3. c. Montrer que la courbe C admet D pour asymptote oblique en $+\infty$ et $-\infty$.
4. Tracer la courbe C et la droite D .

CORRECTION

A. Etude d'une fonction auxiliaire

1. g est un polynôme donc est définie continu dérivable sur $\mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
g	$-\infty$	-2	-6	$+\infty$

2. Sur $] -\infty; -1]$ g est croissante ; sur $[-1; 1]$ g est décroissante donc g admet un maximum en -1 , $g(-1) = -2$ donc pour tout x de $] -\infty; 1]$ $g(x) \leq -2$.

L'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution sur $] -\infty; 1]$.

Sur $] 1; +\infty [$, g est définie continue, strictement croissante,

$$g([1; +\infty [) = [-6; +\infty [$$

$0 \in [-6; +\infty [$, donc il existe un réel $\mathbf{a}$ unique tel que $g(\mathbf{a}) = 0$

$$g(2,19) < 0 \text{ et } g(2,20) > 0 \text{ donc } 2,19 < \mathbf{a} < 2,20$$

- 3.

x	$-\infty$	$\mathbf{a}$	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

B. Etude de la fonction f

1. f est une fraction rationnelle (quotient de deux polynômes) donc sa limite en $+\infty$ et $-\infty$ est la même que celle du quotient de ses termes de plus haut degré

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} x^3 + 2x^2 = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1} x^2 - 1 = 0$$

Il faut donc préciser le signe de $x^2 - 1$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x^2 - 1$	$+$	0	$-$	$+$

$$\text{donc } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} x^2 - 1 = 0^+ \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} x^2 - 1 = 0^- \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} x^3 + 2x^2 = 3 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 1 = 0$$

Il faut donc préciser le signe de $x^2 - 1$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} x^2 - 1 = 0^- \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} x^2 - 1 = 0^+ \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty$$

$$2. \quad f'(x) = \frac{(3x^2 + 4x)(x^2 - 1) - 2x(x^3 + 2x^2)}{(x^2 - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x[(3x + 4)(x^2 - 1) - 2(x^3 + 2x^2)]}{(x^2 - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x^3 - 3x - 4)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x g(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$\mathbf{a}$	$+\infty$
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$g(x)$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$+$
f	$+\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	m	$+\infty$

$$3. a. \quad x + 2 + \frac{x + 2}{x^2 - 1} = (x + 2) \left(1 + \frac{1}{x^2 - 1} \right) = \frac{(x + 2)x^2}{x^2 - 1}$$

$$x + 2 + \frac{x + 2}{x^2 - 1} = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1} = f(x).$$

$$3. b. \quad \text{Soit } h(x) = f(x) - (x + 2) = \frac{x + 2}{x^2 - 1}$$

x	$-\infty$	-2	-1	1	$+\infty$
$x^2 - 1$	$+$	$+$	0	$-$	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$h(x)$	$-$	0	$+$	$-$	$+$

Donc sur $] -\infty; -2 [\cup] -1; 1 [$ $[f(x) - (x + 2)] < 0$

La courbe C est en dessous de la droite D .

Donc sur $] -2; -1 [\cup] 1; +\infty [$ $[f(x) - (x + 2)] > 0$

La courbe C est au dessus de la droite D .

La courbe et la droite se coupent au point d'abscisse 2.

3. c. Montrer que la courbe C admet D pour asymptote oblique en $+\infty$ et $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\text{soit } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\text{soit } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x + 2) = 0$$

la courbe C admet D pour asymptote oblique en $+\infty$ et $-\infty$.

4. Tracer la courbe C et la droite D .

ENONCE

On veut étudier l'existence et le nombre d'extremum de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = x^2 - 2 \sin x$.

Pour cela, on étudie d'abord la fonction f' dérivée de f sur $\mathbb{R}$.

1. Étude de f'
 - a. Vérifier que $f'(x) = 2(x - \cos x)$ et étudier les variations de f' sur $\mathbb{R}$.
 - b. Préciser les limites de f' en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Montrer que l'équation: $f'(x) = 0$ admet une et une seule solution sur $\mathbb{R}$, notée α .
3. Donner le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$. En déduire le tableau de variations de f et justifier l'existence d'un seul minimum m pour f .
4. Montrer que m vérifie: $m = \alpha^2 - 2 \sqrt{1 - \alpha^2}$.

CORRECTION

1. a. $f'(x) = 2x - 2 \cos x = 2(x - \cos x)$

Pour étudier les variations de f' , il faut calculer sa dérivée f'' .

$$f''(x) = 2(1 + \sin x)$$

Pour tout x réel, $-1 \leq \sin x \leq 1$ donc $0 \leq 1 + \sin x \leq 2$

$$f''(x) = 0 \text{ si et seulement si } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Pour tout x réel, $f''(x) \geq 0$ donc f' est croissante sur $\mathbb{R}$.

1. b. Pour tout x réel, $-1 \leq \cos x \leq 1$ donc $1 \geq -\cos x \geq -1$

$$\text{donc } x - 1 \leq x - \cos x \leq x + 1$$

$$\text{donc } 2(x - 1) \leq f'(x) \leq 2(x + 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2(x + 1) = -\infty \text{ donc d'après le théorème de comparaison, } \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2(x - 1) = +\infty \text{ donc d'après le théorème de comparaison, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty.$$

2. f' est une fonction définie continue sur $\mathbb{R}$ (somme de fonctions continues sur $\mathbb{R}$) strictement croissante sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[$,

$$f' \left(\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[\right) =] -\pi; 3\pi [$$

$$0 \notin] -\pi; 3\pi [\text{ donc l'équation } f'(x) = 0 \text{ admet une seule solution } \alpha \text{ sur } \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[.$$

$$f' \text{ est croissante sur } \mathbb{R} \text{ donc si } x \leq -\frac{\pi}{2}, f'(x) \leq f' \left(-\frac{\pi}{2} \right) \text{ donc } f'(x) \leq -\pi \text{ donc } f' \text{ ne s'annule pas sur } \left] -\infty; -\frac{\pi}{2} \right]$$

$$f' \text{ est croissante sur } \mathbb{R} \text{ donc si } x \geq \frac{3\pi}{2}, f'(x) \geq f' \left(\frac{3\pi}{2} \right) \text{ donc } f'(x) \geq 3\pi \text{ donc } f' \text{ ne s'annule pas sur } \left[\frac{3\pi}{2}; +\infty \right[.$$

Au bilan: l'équation $f'(x) = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$

3. si $x \leq -\frac{\pi}{2}$, $f'(x) \leq -\pi$ donc $f'(x) < 0$ sur $\left] -\infty; -\frac{\pi}{2} \right]$

si $x \geq \frac{3\pi}{2}$, $f'(x) \geq 3\pi$ donc $f'(x) > 0$ sur $\left[\frac{3\pi}{2}; +\infty \right[$.

$$f' \text{ est strictement croissante sur } \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[, \text{ et } f'(\alpha) = 0 \text{ donc si } -\frac{\pi}{2} < x < \alpha \text{ alors } f'(x) < 0$$

$$\text{si } x = \alpha, f'(x) = 0$$

$$\text{si } \alpha < x < \frac{3\pi}{2} \text{ alors } f'(x) > 0$$

d'où le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$: si $x < \alpha$ alors $f'(x) < 0$; si $x = \alpha$, $f'(x) = 0$; si $x > \alpha$ alors $f'(x) > 0$

donc f est strictement croissante sur $\left] -\infty; \alpha \right[$ et f est strictement décroissante sur $\left] \alpha; +\infty \right[$.

donc f admet un seul minimum m en α sur $\mathbb{R}$.

4. $m = f(\alpha) = \alpha^2 - 2 \sin \alpha$ or $f'(\alpha) = 0$ donc $\alpha - \cos \alpha = 0$ donc $\cos \alpha = \alpha$

$$\text{or } \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \text{ donc } \sin^2 \alpha = 1 - \alpha^2 \text{ donc soit } \sin \alpha = \sqrt{1 - \alpha^2} \text{ soit } \sin \alpha = -\sqrt{1 - \alpha^2}$$

$$f' \text{ est strictement croissante sur } \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right[, \text{ et } f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \pi \text{ et } f'(0) = -2 \text{ donc } 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \text{ donc } \sin \alpha \geq 0.$$

$$\text{donc } \sin \alpha = \sqrt{1 - \alpha^2} \text{ d'où en remplaçant dans } m = \alpha^2 - 2 \sin \alpha \text{ on obtient : } m = f(\alpha) = \alpha^2 - 2 \sqrt{1 - \alpha^2}.$$

ENONCE

Soit f une fonction définie sur $] -\infty ; 0] \cup [1 ; +\infty [$, telle que : $f(x) = \sqrt{x^2 - x} + x$

1. a. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
1. b. Déterminer la limite de f en $-\infty$, que peut-on en déduire pour la courbe de f ?
2. La fonction f est-elle dérivable en 0 ? en 1 ? Que peut-on en déduire pour la courbe de f ?
3. a. Déterminer la limite en $+\infty$ de $\frac{f(x)}{x}$
3. b. Déterminer la limite en $+\infty$ de $[f(x) - 2x]$
En déduire que la courbe de f admet une asymptote oblique en $+\infty$.

CORRECTION

1. a. $f(x) = \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} + x$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = +\infty$

et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

1. b. $f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 - x} + x)(\sqrt{x^2 - x} - x)}{\sqrt{x^2 - x} - x} = \frac{x^2 - x - x^2}{\sqrt{x^2 - x} - x}$

$$f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} - x}$$

$x < 0$ donc $\sqrt{x^2} = -x$ et $f(x) = \frac{-x}{-x \sqrt{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} - x}$ soit $f(x) = \frac{-x}{-x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + 1\right)}$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + 1} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

2. si $x < 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2 - x} + x}{x} = \frac{x^2 - x - x^2}{x(\sqrt{x^2 - x} - x)}$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - x} - x}$$

si $x < 0$, $\sqrt{x^2 - x} - x = \sqrt{x^2 - x} + (-x)$

donc $\sqrt{x^2 - x} - x > 0$ (somme de termes positifs) et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \sqrt{x^2 - x} - x = 0^-$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-1}{\sqrt{x^2 - x} - x} = -\infty$

f n'est pas dérivable en 0 mais C admet au point d'abscisse 0 une tangente verticale.

si $x > 1$, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - x} + x - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - x}}{x - 1} + 1$

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)\sqrt{x^2-x}} + 1$$

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - x}} + 1$$

si $x > 1$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \sqrt{x^2 - x} = 0^+$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x}{\sqrt{x^2 - x}} = +\infty$ d'où $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$

f n'est pas dérivable en 1 mais C admet au point d'abscisse 1 une tangente verticale.

3. a. $\frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{x^2 - x} + x}{x} = \frac{\sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} + x}{x} + 1$

x tend vers $+\infty$ donc $x > 1$, donc $x > 0$ donc $\sqrt{x^2} = x$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{x} + 1 = \sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$$3. b. \quad f(x) - 2x = \sqrt{x^2 - x} - x$$

$$f(x) - 2x = \sqrt{x^2 - x} - x$$

$$f(x) - 2x = \frac{(\sqrt{x^2 - x} - x)(\sqrt{x^2 - x} + x)}{\sqrt{x^2 - x} + x}$$

$$f(x) - 2x = \frac{-x}{\sqrt{x^2 - x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} + x}$$

$$x > 1 \text{ donc } \sqrt{x^2} = x \text{ et } f(x) - 2x = \frac{x}{x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + x}$$

$$f(x) - 2x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + 1} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = \frac{1}{2} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x - \frac{1}{2} = 0$$

$$\text{soit } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \left(2x + \frac{1}{2}\right) = 0$$

La droite d'équation $y = 2x + \frac{1}{2}$ est asymptote à C en $+\infty$.

ENONCE

Soit f la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = (15 - 2x)\sqrt{x} + 9x$.

1. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
2. Soit g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $g(x) = 18\sqrt{x} - 6x + 15$.
 - a. Déterminer la limite de g en $+\infty$.
 - b. Étudier le signe de la dérivée de g .
 - c. Dresser le tableau de variation de g .
 - d. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$, sans la résoudre, admet une solution unique dans $[0 ; +\infty[$.
On notera $\mathbf{a}$ cette solution.
 - e. Déterminer une valeur approchée de $\mathbf{a}$ à 10^{-3} près.
 - f. Rechercher la valeur exacte de $\mathbf{a}$.
 - g. En déduire le signe de g sur $[0 ; +\infty[$.
3. Démontrer que : pour tout réel $x > 0$, $f(x) = \frac{g(x)}{2\sqrt{x}}$.
4. Établir le tableau de variation de f .

CORRECTION

1. $f(x) = x \left(\left(\frac{15}{x} - 2 \right) \sqrt{x} + 9 \right)$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{15}{x} - 2 \right) \sqrt{x} + 9 \right) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

2. a. $g(x) = \left(\frac{18}{\sqrt{x}} - 6 \right) x + 15$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{18}{\sqrt{x}} - 6 \right) = -6$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

2. b. g est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et $g'(x) = 18 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - 6 = \frac{9 - 6\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

$g'(x) > 0 \iff 3 - 2\sqrt{x} > 0$ et $x > 0 \iff \sqrt{x} < \frac{3}{2}$ et $x > 0$

$g'(x) > 0 \iff 0 < x < \frac{9}{4}$

$g'(x) < 0 \iff x > \frac{9}{4}$

$g'(x) = 0 \iff x = \frac{9}{4}$

2. c. $g\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{57}{2}$

x	0	$\frac{9}{4}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	15	$\frac{57}{2}$	$-\infty$

2. d. g est croissante sur $[0 ; 9/4]$ et $g(0) = 15$ donc pour tout x de $[0 ; 9/4]$, $g(x) \geq 15$ donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution sur $[0 ; 9/4]$.

f est définie dérivable, strictement décroissante sur $]9/4 ; +\infty[$, $g(]9/4 ; +\infty[) =]-\infty ; 57/2[$, donc $0 \in g(]9/4 ; +\infty[)$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution $\mathbf{a}$ sur $]9/4 ; +\infty[$.

l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution $\mathbf{a}$ sur $[0 ; +\infty[$.

2. e. $g(13,538) > 0$ et $g(13,539) < 0$ de plus l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution $\mathbf{a}$ sur $[0 ; +\infty[$ donc $13,538 < \mathbf{a} < 13,539$

2. f. $g(x) = 0 \iff 18\sqrt{x} = 6x - 15$ et $x \geq 0 \iff 6\sqrt{x} = 2x - 5$ et $x \geq 0$

$\iff 36x = (2x - 5)^2$ et $x \geq 0 \iff 36x = 4x^2 - 20x + 25$ et $x \geq 0 \iff 4x^2 - 56x + 25 = 0$ et $x \geq 0$

$\Delta = 56^2 - 4 \times 4 \times 25 = 16 \times 9 \times 19$ donc $x_1 = \frac{56 + 12\sqrt{19}}{8}$ et $x_2 = \frac{56 - 12\sqrt{19}}{8}$

$x_2 < 0$ donc ne convient pas car il est négatif donc $\mathbf{a} = x_1 = \frac{14 + 3\sqrt{19}}{2}$

2. g.

x	0	$\frac{9}{4}$	$\mathbf{a}$	$+\infty$
$g'(x)$		+	0	-
g	15	$\nearrow$	$\frac{57}{2}$	$\searrow$ 0 $-\infty$
$g(x)$		+	0	-

3. $f'(x) = -2\sqrt{x} + (15 - 2x) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} + 9$

$$f'(x) = \frac{-4x + 15 - 2x + 18\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{g(x)}{2\sqrt{x}}$$

4. Pour tout $x > 0$, $f'(x)$ a le même signe que $g(x)$ donc

x	0	$\mathbf{a}$	$+\infty$	
$g(x)$		+	0	-
$f'(x)$		+	0	-
f	0	$\nearrow$	M	$\searrow$ $-\infty$

$$M = f(\mathbf{a}) = (15 - 2\mathbf{a})\sqrt{\mathbf{a}} + 9\mathbf{a}$$

ENONCE

A. Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = 2x^3 + x^2 - 1.$$

1° Étudier les variations de g .

2° En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $\mathbb{R}$ une unique solution α telle que $0,65 < \alpha < 0,66$.

B. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{3} \left(x^2 + x + \frac{1}{x} \right)$.

On désigne par C , sa courbe représentative.

1° Étudier les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition.

2° En utilisant la partie A, déterminer les variations de f et dresser son tableau des variations.

3° Soit I le point de C , d'abscisse -1 et J le point de C , d'abscisse 1 .

a) Vérifier que la droite (IJ) est tangente en J à C .

b) Déterminer une équation de la tangente T en I à C .

c) Étudier la position de C , par rapport à T .

4° Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1}{3}(x^2 + x)$ et P sa courbe représentative dans le même repère que la courbe C .

a) Déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de la fonction $x \rightarrow f(x) - h(x)$.

Que peut-on dire des courbes C et P en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Étudier la position relative des courbes C et P .

5° Construire P , (IJ) , T et la courbe C .

CORRECTION

Partie A

1. $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$ donc $g'(x) = 6x^2 + 2x = 2x(3x + 1)$

d'où le signe de $g'(x)$:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	0	$+\infty$
$2x$	-	-	0	+
$3x + 1$	-	0	+	+
$g'(x)$	+	0	-	0
g

$$g\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{26}{27} \text{ et } g(0) = -1$$

2. g est croissante sur $]-\infty; -1/3[$ et décroissante sur $]-1/3; 0]$ donc g admet un maximum en $-\frac{1}{3}$; $g\left(-\frac{1}{3}\right) < 0$ donc pour

tout x de $]-\infty; 0]$, $g(x) \leq -\frac{26}{27}$ donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution sur $]-\infty; 0]$

g est définie dérivable, strictement croissante sur $]0; +\infty[$, $g(]0; +\infty[) =]-1; +\infty[$, donc $0 \in g(]0; +\infty[)$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α sur $]0; +\infty[$ donc sur $\mathbb{R}$.

$g(0,65) < 0$ et $g(0,66) > 0$ et l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α sur $]0; +\infty[$ donc $0,65 < \alpha < 0,66$.

Partie B

1. $x^2 + x = x(x + 1)$ donc $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} x^2 + x = +\infty$ de plus $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ donc $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$

2. $f'(x) = \frac{1}{3} \left(2x + 1 - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{g(x)}{3x^2}$ donc $f'(x)$ a le même signe que $g(x)$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	0	α	$+\infty$
g
$g(x)$	-	-	-	0	+

donc si $x < \mathbf{a}$, $g(x) < 0$; si $x = \mathbf{a}$, $g(x) = 0$; si $x > \mathbf{a}$, $g(x) > 0$
 d'où le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	$\mathbf{a}$	$+\infty$
$f'(x)$	-		- 0 +	
f	$+\infty$	$-\infty$	m	$+\infty$

avec $m = f(\mathbf{a})$

3. a. $f'(1) = \frac{2}{3}$ et $f(1) = 1$ donc une équation de la tangente T' en J à C est $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$

$f(-1) = -\frac{1}{3}$ donc I a pour coordonnées $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$

Le point d'abscisse -1 de la tangente T' a pour ordonnée :

$y = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$ donc I appartient à T' donc $T' = (IJ)$

3. b. $f'(-1) = -\frac{2}{3}$ et $f(-1) = -\frac{1}{3}$ donc une équation de la tangente T en I à C est $y = -\frac{2}{3}x - 1$

3. c. $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) = \frac{1}{3} \left(x^2 + 3x + \frac{1}{x} + 3\right)$

$f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) = \frac{1}{3x} [x^3 + 3x^2 + 3x + 1]$

$f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) = \frac{1}{3x} (x+1)^3$

donc $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right)$ a le même signe que $\frac{1}{3x} (x+1)^3$ donc que $\frac{x+1}{x}$

si $x < -1$, $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) > 0$ donc C est au dessus de T

Si $x = -1$, $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) = 0$, I est point de contact de C et de T .

si $-1 < x < 0$, $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) < 0$ donc C est en dessous de T

si $x > 0$, $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x - 1\right) > 0$ donc C est au dessus de T

4. a. $f(x) - h(x) = \frac{1}{3x}$ donc $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - h(x) = 0$

La courbe P est asymptote à la courbe C en $+\infty$ et $-\infty$.

4. b. $f(x) - h(x) = \frac{1}{3x}$ donc

si $x < 0$, $f(x) - h(x) < 0$ donc C est en dessous de T

si $x > 0$, $f(x) - h(x) > 0$ donc C est au dessus de T

ENONCE

1. On désigne par g la fonction numérique définie sur $[0 ; \pi]$ par : $g(x) = x \cos x - \sin x$.
Étudier g et dresser son tableau de variation.
En déduire le signe de $g(x)$ sur $[0 ; \pi]$.

2. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $[0 ; \pi]$ par :
$$\begin{cases} \text{si } x = 0, & f(0) = 1 \\ \text{si } x \in]0 ; \pi], & f(x) = \frac{\sin x}{x} \end{cases}$$

On rappelle que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

3. Étudier les variations de f sur $]0 ; \pi]$.
Étude de f en 0

- a. Prouver que, pour tout nombre réel $x \geq 0$: $0 \leq x - \sin x \leq \frac{x^3}{6}$

(Pour cela, on introduira la fonction $\square$ définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $\square(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$

on calculera les dérivées $\square'$, $\square''$ et $\square'''$ et on en déduira le signe de $\square$.)

- b. Prouver que f est dérivable au point 0 et calculer $f'(0)$.

4. Construire la courbe représentative (C) de la fonction f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. (On prendra 3 cm pour unité.)
On tracera les tangentes connues.

CORRECTION

1. $g'(x) = 1 \times \cos x + x \times (-\sin x) - \cos x$ donc $g'(x) = -x \sin x$
 $x \in [0 ; \pi]$ donc $\sin x \geq 0$

x	0		π
$g'(x)$	0	-	0
g	0	$\searrow$	
			$-\pi$

g est strictement décroissante sur $[0 ; \pi]$ et $g(0) = 0$ donc pour tout x de $[0 ; \pi]$, $g(x) \leq 0$

2. si $x \in]0 ; \pi]$, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$

Pour tout x de $]0 ; \pi]$, $g(x) < 0$ donc pour tout x de $]0 ; \pi]$, $f'(x) < 0$ donc f est strictement décroissante sur $]0 ; \pi]$.

3. a. $\square(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$

$$\square''(x) = (\square'(x))' = -\sin x + x$$

$$\square'''(x) = (\square''(x))' = -\cos x + 1$$

Pour tout x de $[0 ; +\infty[$ $\cos x \leq 1$ donc $\square'''(x) \geq 0$

$\square'''$ est la dérivée de $\square''$ donc $\square''$ est croissante sur $[0 ; +\infty[$

$\square''(0) = 0$ donc pour tout x de $[0 ; +\infty[$, $\square''(x) \geq 0$ donc pour tout $x \geq 0$, $x - \sin x \geq 0$

Pour tout x de $[0 ; +\infty[$ $\square'(x) \geq 0$

$\square'$ est la dérivée de $\square$ donc $\square$ est croissante sur $[0 ; +\infty[$

$\square'(0) = 0$ donc pour tout x de $[0 ; +\infty[$, $\square'(x) \geq 0$

Pour tout x de $[0 ; +\infty[$ $\square(x) \geq 0$

$\square$ est croissante sur $[0 ; +\infty[$

$\square(0) = 0$ donc pour tout x de $[0 ; +\infty[$, $\square(x) \geq 0$

soit $\sin x - x + \frac{x^3}{6} \geq 0$ donc $\frac{x^3}{6} \geq x - \sin x$ donc pour tout nombre réel $x \geq 0$, $0 \leq x - \sin x \leq \frac{x^3}{6}$

- b.
$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \frac{\sin x - x}{x^2}$$
 or pour tout nombre réel $x \geq 0$, $0 \leq x - \sin x \leq \frac{x^3}{6}$

si $x \neq 0$, $x^2 > 0$, donc $0 \leq \frac{\sin x - x}{x^2} \leq \frac{x}{6}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{6} = 0 \text{ donc d'après le théorème des gendarmes, } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$

4.

x	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	π
$f(x)$	1	0,97	0,90	0,78	0,62	0,45	0,28	0,12	0

Sur la figure ci-dessous, sont représentées la courbe représentative C dans le repère orthonormal $(O; i, j)$ d'une fonction f définie et dérivable sur E ainsi que son asymptote D et sa tangente C, au point d'abscisse 0.

On sait que le point $J(0; 1)$ est centre de symétrie de la courbe C, que l'asymptote D passe par les points $K(-1; 0)$ et J que la tangente C, a pour équation $y = (1 - e)x + 1$.

Partie A - Expression de f

1. Déterminer une équation de D.
2. On suppose qu'il existe deux réels m et p et une fonction $\square$ définie sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout réel x , $f(x) = mx + p + \square(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} \square(x) = 0$.
 - a. Déterminer m et p .
 - b. Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) + f(-x) = 2$.
 - c. En déduire que la fonction $\square$ est impaire puis que la fonction f' , dérivée de f , est paire.
3. On suppose maintenant que, pour tout réel x : $\square(x) = (ax + b)e^{-x^2}$ où a et b sont des réels. Démontrer, en utilisant les données et les résultats précédents, que $a = -e$ et $b = 0$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + x - xe^{-x^2}$ et on suppose que la courbe C représente la fonction f dans le repère $(O; i, j)$.

1. a. Vérifier que, pour tout réel x : $f'(x) = 1 + (2x^2 - 1)e^{-x^2+1}$. Calculer $f'(0)$.
- b. Vérifier que C, est bien la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Étudier la position relative de la courbe C et de sa tangente C.
2. Le graphique suggère l'existence d'un minimum relatif de f sur $[0; 1]$.
 - a. Démontrer que $f''(x)$ est du signe de $6x - 4x^3$.
 - b. Démontrer que l'équation $f''(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]0; 1[$.
 - c. Démontrer que $0,51 < \alpha < 0,52$.
 - d. Exprimer $f(\alpha)$ sous la forme d'un quotient de deux polynômes en α .

CORRECTION

PARTIE A

1. (JK) est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées donc a une équation de la forme $y = ax + b$

Cette droite passe par les points J et K de coordonnées $(0; 1)$ et $(-1; 0)$ donc $\begin{cases} 1 = a \times 0 + b \\ 0 = a \times (-1) + b \end{cases}$ donc $a = b = 1$

(JK) a pour équation $y = x + 1$.

2. a. $f(x) - (mx + p) = \square(x)$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \square(x) = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + p) = 0$

donc la droite d'équation $y = mx + p$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$, or la droite (JK) est asymptote à C en $+\infty$, donc $m = 1$ et $p = 1$ donc $f(x) = x + 1 + \square(x)$

2. b. $J(a; b)$ est centre de symétrie de C donc pour tout x réel : $f(2a - x) + f(x) = 2b$

Ici $a = 0$ et $b = 1$ donc $f(x) + f(-x) = 2$

2. c. $f(x) = x + 1 + \square(x)$ donc $f(-x) = -x + 1 + \square(-x)$ en remplaçant dans $f(x) + f(-x) = 2$:

$x + 1 + \square(x) - x + 1 + \square(-x) = 2$ soit $\square(x) + \square(-x) = 0$ donc pour tout x réel : $\square(-x) = -\square(x)$ donc $\square$ est impaire

f est définie dérivable sur $\mathbb{R}$

$f(x) + f(-x) = 2$ donc en dérivant : pour tout x réel : $f'(x) + [-f'(-x)] = 0$ soit $f'(-x) = f'(x)$ donc f' est paire

3. $\square$ est impaire donc $\square(-x) = -\square(x)$ donc pour tout x réel : $(-ax + b)e^{-x^2} = - (ax + b)e^{-x^2}$

pour tout x réel $e^{-x^2} \neq 0$, donc pour tout x réel : $-ax + b = -ax - b$
 soit pour tout x réel : $2b = 0$ donc $b = 0$

$$f(x) = x + 1 + ax e^{-x^2}$$

Soit $u(x) = e^{-x^2}$ donc $u'(x) = -2x e^{-x^2}$

donc $f'(x) = 1 + a e^{-x^2} - 2ax^2 e^{-x^2}$

La tangente en J a pour coefficient directeur $1 - e$ donc $f'(0) = 1 - e$ donc $1 + a = 1 - e$ donc $a = -e$

$$f(x) = x + 1 - e x e^{-x^2} \text{ soit } f(x) = x + 1 - x e^{-x^2+1}$$

PARTIE B

1. a. D'après la première partie : $f'(x) = 1 - a e^{-x^2} + 2ax^2 e^{-x^2}$ avec $a = -e$

soit $f'(x) = 1 - e^{-x^2+1} + 2x^2 e^{-x^2+1}$ donc $f'(x) = 1 + (2x^2 - 1) e^{-x^2+1}$

$$f'(0) = 1 - e$$

1. b. La tangente T au point de la courbe d'abscisse 0 a pour équation $y = f'(0)x + f(0)$

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 1 - e$ donc T a pour équation $y = (1 - e)x + 1$

$$f(x) - [(1 - e)x + 1] = x + 1 - x e^{-x^2+1} - (1 - e)x - 1$$

$$f(x) - [(1 - e)x + 1] = (e - e^{-x^2+1})x$$

$$f(x) - [(1 - e)x + 1] = e(1 - e^{-x^2})x$$

Pour tout x réel, $-x^2 \leq 0$ donc $e^{-x^2} \leq 1$ donc si $1 - e^{-x^2} \geq 0$

$f(x) - [(1 - e)x + 1]$ a le même signe que x donc si $x < 0$, la courbe est en dessous de la tangente

si $x = 0$, point de contact de la courbe et de la tangente

si $x > 0$, la courbe est au dessus de la tangente

2. a. $f'(x) = 1 + (2x^2 - 1) e^{-x^2+1}$

$$f''(x) = 4x e^{-x^2+1} + (2x^2 - 1)(-2x e^{-x^2+1})$$

$$f''(x) = 2x e^{-x^2+1} [2 - (2x^2 - 1)]$$

$$f''(x) = 2x e^{-x^2+1} (3 - 2x^2)$$

Pour tout x réel, $e^{-x^2} > 0$

donc $f''(x)$ a le même signe que $2x(3 - 2x^2)$

soit $f''(x)$ a le même signe que $6x - 4x^3$

2. b. $3 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{\frac{3}{2}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$ donc $3 - 2x^2$ est positif entre les racines donc sur $[0 ; 1]$

donc sur $]0 ; 1]$, $2x(3 - 2x^2) > 0$ d'où le tableau de variation de f' :

x	0	1
$f''(x)$	0	+
f'	$1 - e$	2

La fonction f' est définie continue strictement croissante sur $[0 ; 1]$, $f'([0 ; 1]) = [1 - e ; 2]$

$0 \notin [1 - e ; 2]$ donc l'équation $f'(x) = 0$ admet une seule solution $\mathbf{u}$ sur $[0 ; 1]$.

2. c. $f'(0,51) < 0$ et $f'(0,52) > 0$ et f' est strictement croissante sur $[0 ; 1]$, donc $0,51 < \mathbf{u} < 0,52$.

2. d. $f'(\mathbf{u}) = 0 \iff 1 + (2\mathbf{u}^2 - 1) e^{-\mathbf{u}^2+1}$

donc $e^{-\mathbf{u}^2+1} = \frac{-1}{2\mathbf{u}^2 - 1}$

$$f(\mathbf{u}) = 1 + \mathbf{u} - \mathbf{u} e^{-\mathbf{u}^2+1} \text{ donc } f(\mathbf{u}) = 1 + \mathbf{u} + \frac{\mathbf{u}}{2\mathbf{u}^2 - 1}$$

$$f(\mathbf{u}) = \frac{2\mathbf{u}^3 + 2\mathbf{u}^2 - 1}{2\mathbf{u}^2 - 1}$$

ENONCE

Sur la figure ci-contre, sont représentées la courbe représentative C dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que son asymptote D et sa tangente T au point d'abscisse 0.

On sait que le point $J(0; 1)$ est centre de symétrie de la courbe C, que l'asymptote D passe par les points $K(-1; 0)$ et J, que la tangente T a pour équation $y = (1 - e)x + 1$.

Partie A - Expression de f

- Déterminer une équation de D.
- On suppose qu'il existe deux réels m et p et une fonction $\square$ définie sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout réel x , $f(x) = mx + p + \square(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} \square(x) = 0$.

- Déterminer m et p .
- Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) + f(-x) = 2$.
- En déduire que la fonction $\square$ est impaire puis que la fonction f' , dérivée de f , est paire.

- On suppose maintenant que, pour tout réel x $\square(x) = (ax + b)e^{-x^2}$ où a et b sont des réels.
Démontrer, en utilisant les données et les résultats précédents, que $a = -e$ et $b = 0$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + x - xe^{-x^2+1}$ et on suppose que la courbe C représente la fonction f dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Vérifier que, pour tout réel x : $f'(x) = 1 + (2x^2 - 1)e^{-x^2+1}$.
Calculer $f'(0)$.
 - Vérifier que T est bien la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Étudier la position relative de la courbe C et de sa tangente T.
- Le graphique suggère l'existence d'un minimum relatif de f sur $[0; 1]$.
 - Démontrer que $f''(x)$ est du signe de $6x - 4x^3$.
 - Démontrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[0; 1]$.
 - Démontrer que $0,51 < \alpha < 0,52$.
 - Exprimer $f(\alpha)$ sous la forme d'un quotient de deux polynômes en α .

CORRECTION

PARTIE A

- (JK) est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées donc a une équation de la forme $y = ax + b$

Cette droite passe par les points J et K de coordonnées $(0; 1)$ et $(-1; 0)$ donc $\begin{cases} 1 = a \times 0 + b \\ 0 = a \times (-1) + b \end{cases}$ donc $a = b = 1$

(JK) a pour équation $y = x + 1$.

- $f(x) - (mx + p) = \square(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \square(x) = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + p) = 0$

donc la droite d'équation $y = mx + p$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$, or la droite (JK) est asymptote à C en $+\infty$, donc $m = 1$ et $p = 1$ donc $f(x) = x + 1 + \square(x)$

- $J(a; b)$ est centre de symétrie de C donc pour tout x réel : $f(2a - x) + f(x) = 2b$
Ici $a = 0$ et $b = 1$ donc $f(x) + f(-x) = 2$

- $f(x) = x + 1 + \square(x)$ donc $f(-x) = -x + 1 + \square(-x)$ en remplaçant dans $f(x) + f(-x) = 2$:
 $x + 1 + \square(x) - x + 1 + \square(-x) = 2$ soit $\square(x) + \square(-x) = 0$ donc pour tout x réel : $\square(-x) = -\square(x)$
 $\square$ est impaire

f est définie dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f(x) + f(-x) = 2$ donc en dérivant : pour tout x réel : $f'(x) + [-f'(-x)] = 0$ soit $f'(-x) = f'(x)$
 f' est paire

- $\square$ est impaire donc $\square(-x) = -\square(x)$ donc pour tout x réel : $(-ax + b)e^{-x^2} = -(ax + b)e^{-x^2}$

pour tout x réel $e^{-x^2} \neq 0$, donc pour tout x réel : $-ax + b = -ax - b$ soit pour tout x réel : $2b = 0$ donc $b = 0$

$$f(x) = x + 1 + axe^{-x^2}$$

$$\text{Soit } u(x) = e^{-x^2} \text{ donc } u'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$\text{donc } f'(x) = 1 + a e^{-x^2} - 2ax^2 e^{-x^2}$$

La tangente en J a pour coefficient directeur $1 - e$
 donc $f'(0) = 1 - e$ donc $1 + a = 1 - e$ donc $a = -e$
 $f(x) = x + 1 - e x e^{-x^2}$ soit $f(x) = x + 1 - x e^{-x^2+1}$

PARTIE B

1. a. D'après la première partie :

$$f'(x) = 1 - a e^{-x^2} + 2 a x^2 e^{-x^2} \text{ avec } a = -e$$

$$\text{soit } f'(x) = 1 - e^{-x^2+1} + 2 x^2 e^{-x^2+1}$$

$$f'(x) = 1 + (2 x^2 - 1) e^{-x^2+1}$$

$$f'(0) = 1 - e$$

1. b. La tangente T au point de la courbe d'abscisse 0 a pour équation $y = f'(0) x + f(0)$

$$f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 1 - e \text{ donc T a pour équation } y = (1 - e) x + 1$$

$$f(x) - [(1 - e) x + 1] = x + 1 - x e^{-x^2+1} - (1 - e) x - 1$$

$$f(x) - [(1 - e) x + 1] = (e - e^{-x^2+1}) x$$

$$f(x) - [(1 - e) x + 1] = e (1 - e^{-x^2}) x$$

Pour tout x réel, $-x^2 \leq 0$ donc $e^{-x^2} \leq 1$ donc si $1 - e^{-x^2} \geq 0$

$f(x) - [(1 - e) x + 1]$ a le même signe que x donc

si $x < 0$, la courbe est en dessous de la tangente

si $x = 0$, point de contact de la courbe et de la tangente

si $x > 0$, la courbe est au dessus de la tangente

$$2. a. f'(x) = 1 + (2 x^2 - 1) e^{-x^2+1}$$

$$f''(x) = 4 x e^{-x^2+1} + (2 x^2 - 1) (-2 x e^{-x^2+1})$$

$$f''(x) = 2 x e^{-x^2+1} [2 - (2 x^2 - 1)]$$

$$f''(x) = 2 x e^{-x^2+1} (3 - 2 x^2)$$

Pour tout x réel, $e^{-x^2} > 0$

donc $f''(x)$ a le même signe que $2 x (3 - 2 x^2)$ soit $f''(x)$ a le même signe que $6 x - 4 x^3$

$$2. b. 3 - 2 x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{3}{2}} \text{ donc } 3 - 2 x^2 \text{ est positif entre les racines donc sur } [0 ; 1]$$

donc sur $] 0 ; 1]$, $2 x (3 - 2 x^2) > 0$ d'où le tableau de variation de f' :

x	0	1
$f''(x)$	0	+
f'	$1 - e$	2

La fonction f' est définie continue strictement croissante sur $[0 ; 1]$, $f'([0 ; 1]) = [1 - e ; 2]$

$0 \notin [1 - e ; 2]$ donc l'équation $f'(x) = 0$ admet une seule solution $\mathbf{a}$ sur $[0 ; 1]$.

2. c. $f'(0,51) < 0$ et $f'(0,52) > 0$ et f' est strictement croissante sur $[0 ; 1]$, donc $0,51 < \mathbf{a} < 0,52$.

$$2. d. f'(\mathbf{a}) = 0 \Leftrightarrow 1 + (2 \mathbf{a}^2 - 1) e^{-\mathbf{a}^2+1}$$

$$\text{donc } e^{-\mathbf{a}^2+1} = \frac{-1}{2 \mathbf{a}^2 - 1}$$

$$f(\mathbf{a}) = 1 + \mathbf{a} - \mathbf{a} e^{-\mathbf{a}^2+1} \text{ donc } f(\mathbf{a}) = 1 + \mathbf{a} + \frac{\mathbf{a}}{2 \mathbf{a}^2 - 1}$$

$$f(\mathbf{a}) = \frac{2 \mathbf{a}^3 + 2 \mathbf{a}^2 - 1}{2 \mathbf{a}^2 - 1}$$

ENONCE

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire

La fonction h est définie sur $] -1 ; +\infty [$ par : $h(x) = \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

1. Calculer la fonction dérivée h' . En déduire les variations de h sur $] -1 ; +\infty [$.
2. Déterminer les limites de h en -1 et en $+\infty$.
3. Montrer que, pour tout $x > -1$, on a : $0 < h(x) < e$.

Partie B : Etude de la fonction f

Dans cette partie, on s'intéresse à la fonction f définie sur l'intervalle $] -1 ; +\infty [$ par : $f(x) = x + 1 - \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

On appelle C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormal, l'unité graphique étant 5 cm. On désigne par f' et f'' les dérivées premières et seconde de f .

1. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x - e + 1$ est asymptote, à la courbe C_f , au voisinage de $+\infty$.

Préciser la position relative de (D) et C_f .

2. Etude des variations de la fonction f' sur $] -1 ; +\infty [$
 - a. Pour $x \in] -1 ; +\infty [$ calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.

Vérifier que $f''(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^4} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$ En déduire le sens de variation de f' .

- b. Dresser le tableau de variation de f' . (On admettra que $\lim_{x \rightarrow -1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$.)
3. Démontrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet sur $] -1 ; +\infty [$ deux solutions dont l'une est 0. Dans la suite de l'exercice on notera α la solution non nulle. Donner une valeur approchée de α au centième près
 4. Etude des variations de f sur $] -1 ; +\infty [$
 - a. Etudier les variations de f .
 - b. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
 - c. Dresser le tableau de variation de f .

Partie C : Prolongement de la fonction f en -1

On pourra utiliser sans justification que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$

On considère la fonction g définie sur $] -1 ; +\infty [$ par : $\begin{cases} g(-1) = 0 \\ g(x) = f(x) \text{ si } x > -1. \end{cases}$

On appelle C_g la courbe représentative de la fonction g dans le repère de la partie B.

Etude de la dérivabilité de g en -1 .

- a. Montrer que l'on peut écrire : $\frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{x}{x+1} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) \right)$

- b. Pour $x \in] -1 ; +\infty [$ déterminer la limite lorsque x tend vers -1 de $\frac{x}{x+1}$ puis de $\frac{x}{x+1} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

- c. En déduire que g est dérivable en -1 et préciser sa dérivée $g'(-1)$.

CORRECTION

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire

1. h est définie dérivable sur $] - 1 ; + \infty [$ et $h'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$ donc $h'(x) > 0$

h est donc strictement croissante sur $] - 1 ; + \infty [$.

2. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x+1} = -\infty$. Soit $X = \frac{x}{x+1}$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} X = -\infty$ or $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^X = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = e$

3. h est strictement croissante sur $] - 1 ; + \infty [$, donc pour tout $x > -1$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) < h(x) < \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$
donc pour tout $x > -1$, on a : $0 < h(x) < e$.

Partie B : Etude de la fonction f

1. $f(x) - (x - e + 1) = e - \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) = e - h(x)$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = e$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x - e + 1) = 0$

La droite (D) d'équation $y = x - e + 1$ est asymptote, à la courbe C_f , au voisinage de $+\infty$.

$$e - \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) > 0 \iff e > \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) \iff 1 > \frac{x}{x+1} \iff 1 - \frac{x}{x+1} > 0 \iff \frac{1}{x+1} > 0$$

$x > -1$ donc $x+1 > 0$ donc pour tout $x > -1$, $e - \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) > 0$ soit $f(x) - (x - e + 1) > 0$

La courbe C_f est donc au dessus de (D) sur $] - 1 ; + \infty [$.

2. a. $f(x) = x + 1 - h(x)$ donc $f'(x) = 1 - h'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

Soit $u(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$ alors $u'(x) = \frac{2(x+1)}{(x+1)^4}$

$v(x) = \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$ donc $v'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

donc $f''(x) = \frac{2(x+1)}{(x+1)^4} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right) - \frac{1}{(x+1)^4} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

$f''(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^4} \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$

$(x+1)^4 > 0$ sur $] - 1 ; + \infty [$ et la fonction exponentielle étant strictement positive, le signe de f'' est celui de $2x+1$

x	-1	-0,5	+∞
$2x+1$	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+
f'	1	$1 - 4e^{-1}$	1

3. Soit $I =] - 1 ; - 0,5 [$ f' est définie continue sur I , strictement décroissante sur I ; $f'(I) =] 1 - 4e^{-1} ; 1 [$ $0 \notin f(I)$ donc l'équation $f'(x) = 0$ admet une seule solution $\mathbf{a}$ sur I .

Soit $J =] - 0,5 ; + \infty [$ f' est définie continue sur J , strictement croissante sur J ;

$f'(J) =] 1 - 4e^{-1} ; 1 [$ $0 \notin f(J)$ donc l'équation $f'(x) = 0$ admet une seule solution sur J .

$f'(0) = 0$ et $0 \notin J$ donc la solution de $f'(x) = 0$ sur J est 0.

$f'(-0,72) > 0$ et $f'(-0,71) > 0$ de plus f' est strictement décroissante sur I donc $-0,72 < \mathbf{a} < -0,71$

On en déduit le signe de $f'(x)$:

x	-1	$\mathbf{a}$	0	+∞
f'	+	0	-	+
f	0	$f(\mathbf{a})$	0	+∞

b. $f(x) = x + 1 - h(x)$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = e$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$

Partie C: Prolongement de la fonction f en -1

a. Si $x \neq -1$, $\frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = \frac{f(x) - 0}{x + 1} = \frac{1}{x + 1} \left(x + 1 - \exp\left(\frac{x}{x + 1}\right) \right)$

$\frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = 1 - \frac{1}{x + 1} \exp\left(\frac{x}{x + 1}\right)$ donc $\frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{x}{x + 1} \exp\left(\frac{x}{x + 1}\right) \right)$

b. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x + 1} = -\infty$. Soit $X = -\frac{x}{x + 1}$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} X = +\infty$

$\left(\frac{x}{x + 1} \exp\left(\frac{x}{x + 1}\right) \right) = -X e^{-X}$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} X e^{-X} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{x}{x + 1} \exp\left(\frac{x}{x + 1}\right) \right) = 0$

$\lim_{x \rightarrow -1^+} 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{x}{x + 1} \exp\left(\frac{x}{x + 1}\right) \right) = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = 1$

c. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = 1$ donc g est dérivable en -1 et $g'(-1) = 1$

ENONCE

Soit a et b deux nombres réels et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^{(x^2+ax+b)}$.

Quelles sont les valeurs de a et de b pour lesquelles le tableau de variations de g est celui donné ci-dessous ?

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$		
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$e^{-\frac{5}{4}}$	$\nearrow$	$+\infty$

CORRECTION

$$g'(1,5) = 0 \text{ or } g'(x) = (2x+a) e^{(x^2+ax+b)}$$

La fonction exponentielle ne s'annule pas donc $3+a=0$ soit $a=-3$

$$g(1,5) = e^{-\frac{5}{4}} \text{ donc } \frac{9}{4} + a \frac{3}{2} + b = -\frac{5}{4} \text{ donc } \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + b = -\frac{5}{4} \text{ donc } b = 1$$

Énoncé

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (x-1)(2 - e^{-x}).$$

Sa courbe représentative C est tracée dans le repère orthonormal ci-contre.

1. a. Étudier la limite de f en $+\infty$.
- b. Montrer que la droite Δ d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à C .

On pourra utiliser sans justification que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$

- c. Étudier la position relative de C et Δ .
- d. Calculer $f'(x)$. Montrer que $f'(x) = x e^{-x} + 2(1 - e^{-x})$.
- e. En déduire que, pour tout réel x strictement positif, $f'(x) \geq 0$.
- c. Préciser la valeur de $f'(0)$, puis établir le tableau de variations de f .
2. Déterminer le point A de C où la tangente à C est parallèle à Δ .
3. Soit m un réel, $m \geq -1$.
Montrer que l'équation $f(x) = m$ admet une seule solution sur $[0; +\infty[$.
Dans le cas où $m = 1$, donner un encadrement à 10^{-2} près de cette solution.

Correction

1. a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- b. $f(x) - (2x - 2) = (x-1)(2 - e^{-x}) - (2x - 2)$
 $f(x) - (2x - 2) = 2x - 2 - (x-1)e^{-x} - 2x + 2$
 $f(x) - (2x - 2) = -x e^{-x} + e^{-x}$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$
 donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (2x - 2) = 0$

la droite Δ d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à C en $+\infty$.

- c. $f(x) - (2x - 2) = -(x-1)e^{-x}$
La fonction exponentielle est strictement positive donc $f(x) - (2x - 2)$ a le même signe que $-(x-1)$

Si $x > 1$ alors $x - 1 > 0$ donc $-(x-1) < 0$ donc C est en dessous de Δ .

Si $x = 1$ alors $-(x-1)e^{-x} = 0$ donc C et Δ se coupent au point d'abscisse 1.

Si $x < 1$ alors $x - 1 < 0$ donc $-(x-1) > 0$ donc C est au dessus de Δ .

- d. Soit $u(x) = x - 1$ $u'(x) = 1$
 $v(x) = e^{-x}$ $v'(x) = -e^{-x}$
 $f'(x) = (2 - e^{-x}) + (x-1)e^{-x} = 2 - e^{-x} + x e^{-x} - e^{-x}$
 $f'(x) = 2 - 2e^{-x} + x e^{-x}$
 $f'(x) = x e^{-x} + 2(1 - e^{-x})$.

- e. Pour tout $x \geq 0$, $e^{-x} \leq 1$ donc $1 - e^{-x} \geq 0$
 $x e^{-x} \geq 0$ donc $f'(x) \geq 0$ (somme de termes positifs).

e.

$f'(0) = 0$		
x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	+
f	-1	$+\infty$

2. Pour que T et Δ soient parallèles, il faut que leurs coefficients directeurs soient égaux.

Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x_0 est $f'(x_0)$. Le coefficient directeur de Δ est 2, il faut donc résoudre $f'(x) = 2$.

$$f'(x) = 2 - 2e^{-x} + x e^{-x} = 2 \iff -2e^{-x} + x e^{-x} = 0$$

$$\iff (x-2)e^{-x} = 0 \iff x = 2$$

$f(2) = 2 - e^{-2}$ donc le point A de C où la tangente à C est parallèle à Δ est $A(2; 2 - e^{-2})$

3. f est définie continue strictement croissante sur $[0; +\infty[$, $f([0; +\infty[) = [-1; +\infty[$
 $m \geq -1$ donc $m \in [-1; +\infty[$ donc l'équation $f(x) = m$ admet une seule solution sur $[0; +\infty[$.

$f(1,55) < 1$ et $f(1,56) > 1$ donc $1,55 < \alpha < 1,56$.

L'asymptote Δ est en rouge, la tangente T au point A d'abscisse 2 en bleu, la courbe C en noir.

LA REUNION juin 2007

On pourra utiliser sans justification que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1} \text{ si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

On note C la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a. Déterminer la limite de f en $-\infty$.
- b. Établir que, pour tout nombre réel x non nul, on a :

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

En déduire la limite de f en $+\infty$.

2. Donner, sans démontrer, la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1}$

et démontrer que f est continue en 0.

3. a. Démontrer que, pour tout nombre réel x , on a :

$$e^x \geq x + 1,$$

et que l'égalité n'a lieu que pour $x = 0$.

- b. Calculer la dérivée f' de la fonction f et déterminer la fonction g telle que, pour tout nombre réel x non nul,

$$f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(e^x - 1)^2}.$$

- c. Donner le tableau des variations de f .
4. Soient x un nombre réel non nul et les points $M(x; f(x))$ et $M'(-x; f(-x))$ de la courbe C .

- a. Établir que $f(-x) = \frac{x}{e^x - 1}$, puis déterminer le coefficient directeur de la droite (MM') .
- b. On admet que la fonction f est dérivable en 0. Que suggère alors le résultat précédent ?

CORRECTION

1. a. Soit $X = -x$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} X = 0$ et $x e^x = X e^{-X}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} X e^{-X} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \text{ de plus } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

- b. pour tout nombre réel x non nul, $f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1}$ or $x \left(1 + \frac{1}{e^x - 1} \right) = x \frac{e^x - 1 + 1}{e^x - 1} = \frac{x e^x}{e^x - 1} = f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{e^x - 1} \right) = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x}{e^x - 1} = 0 \times 1 = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \text{ donc } f \text{ est continue en } 0.$$

3. a. Soit $h(x) = e^x - (x + 1)$, $h'(x) = e^x - 1$ donc on obtient le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$		0	$+$
h		0	

h est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et strictement croissante sur $[0 ; +\infty [$ h admet un minimum en 0 pour tout nombre réel x , on a : $h(x) \geq 0$ donc $e^x \geq x + 1$, et l'égalité n'a lieu que pour $x = 0$.

$$b. f'(x) = \frac{(x+1)e^x(e^x-1) - e^x x e^x}{(e^x-1)^2} \text{ donc } f'(x) = e^x \frac{e^x - (x+1)}{(e^x-1)^2} \text{ soit } g(x) = e^x - (x+1)$$

c.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		0	$+$
f	0	0	$+\infty$

$$4. a. f(-x) = -x \frac{e^{-x}}{e^{-x} - 1} = -x \frac{e^{-x} \times e^x}{(e^{-x} - 1) e^x} = \frac{x}{e^x - 1}$$

$$\text{Le coefficient directeur de la droite } (MM') \text{ est égal à : } \frac{y_M - y_{M'}}{x_M - x_{M'}} \text{ or } y_M - y_{M'} = \frac{x e^x}{e^x - 1} - \frac{x}{e^x - 1} = x$$

$$x_M - x_{M'} = x - (-x) = 2x \text{ donc } \frac{y_M - y_{M'}}{x_M - x_{M'}} = \frac{1}{2}$$

- b. On sait que la tangente au point A d'abscisse 0 est, quand elle existe, la position limite de la droite (AM) quand M est un point de la courbe qui tend vers A donc d'après la question précédente on pourrait penser que $f'(0) = \frac{1}{2}$

Quand on a à chercher une limite et qu'il y a une difficulté, il faut distinguer 2 cas :

- x tend vers ∞ ($+\infty$ ou $-\infty$) : on met alors x avec le plus grand exposant possible en facteur et on SIMPLIFIE
- x tend vers une valeur finie a : on met alors $x - a$ en facteur avec le plus grand exposant possible et on SIMPLIFIE.

EXERCICE 1

$$f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x^2 - 4} \quad D_f =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$$

Déterminer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

x tend vers ∞ ($+\infty$ ou $-\infty$) : on met alors x avec le plus grand exposant possible en facteur et on SIMPLIFIE

$$f(x) = \frac{x^3 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} \quad \text{donc } f(x) = x \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)}{\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)}$$

Quand x tend vers $-\infty$ ou vers $+\infty$ alors $\left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)$ tend vers 1 et $\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)$ tend vers 1 donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)}{\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} = 1 \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)}{\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} = -\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)}{\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} = 1 \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{6}{x^3}\right)}{\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Déterminer les limites de f en -2 et 2 .

$$f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x^2 - 4}$$

Quand x tend vers -2 alors $x^3 - x - 6$ tend vers -12 et $x^2 - 4$ tend vers 0 donc $f(x)$ tend vers ∞ mais il faut déterminer le signe

$x^2 - 4$ est une expression du second degré qui s'annule en -2 et 2

donc $x^2 - 4 > 0$ si $x < -2$ et $x^2 - 4 < 0$ si $-2 < x < 2$ donc 2 cas se présentent :

x tend vers -2 et $x < -2$

$$\text{alors } \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} x^2 - 4 = 0^+$$

$$\text{et } \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} x^3 - x - 6 = -12 \quad \text{donc} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} f(x) = -\infty \quad (\text{d'après la règle des signes})$$

x tend vers -2 et $-2 < x < 2$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} x^2 - 4 = 0^- \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} x^3 - x - 6 = -12 \quad \text{donc} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} f(x) = +\infty \quad (\text{d'après la règle des signes})$$

on n'a pas à traiter le cas $x > 2$, car on ne peut avoir simultanément, x tend vers -2 en restant plus grand que 2

Quand x tend vers 2 alors $x^3 - x - 6$ tend vers 0 et $x^2 - 4$ tend vers 0 donc on a une forme indéterminée.

x tend vers une valeur finie 2 : on met alors $x - 2$ en facteur avec le plus grand exposant possible et on SIMPLIFIE.

$$x^3 - x - 6 = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$$

$$x^3 - x - 6 = ax^3 + (-2a + b)x^2 + (-2b + c)x - 2c$$

donc par identification : $a = 1$; $-2a + b = 0$; $-2b + c = -1$ et $-2c = -6$

donc $a = 1$; $b = 2$ et $c = 3$

$$x^3 - x - 6 = (x - 2)(x^2 + 2x + 3)$$

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$\text{donc } f(x) = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 3)}{(x - 2)(x + 2)}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 2}$$

Quand x tend vers 2 alors $x^2 + 2x + 3$ tend vers 11 et $x + 2$ tend vers 4 donc $f(x)$ tend vers $\frac{11}{4}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{11}{4}$$

EXERCICE 2

$$f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 + 7x - 8} \quad D_f =]-\infty; -8[\cup]-8; 1[\cup]1; +\infty[$$

Déterminer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

x tend vers ∞ ($+\infty$ ou $-\infty$) : on met alors x avec le plus grand exposant possible en facteur et on SIMPLIFIE

$$f(x) = \frac{x^2 \left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)}$$

$$\text{donc } f(x) = \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)}$$

Quand x tend vers $-\infty$ ou vers $+\infty$ alors $\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)$ tend vers 2 et $\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)$ tend vers 1 donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = 2 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = 2 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Déterminer les limites de f en -8 et 1 .

$$f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 + 7x - 8}$$

Quand x tend vers -8 alors :

$2x^2 - 5x + 3$ tend vers 171 et $x^2 + 7x - 8$ tend vers 0

donc $f(x)$ tend vers ∞ mais il faut déterminer le signe

$x^2 + 7x - 8$ est une expression du second degré qui s'annule en -8 et 1

donc $x^2 + 7x - 8 > 0$ si $x < -8$ et $x^2 + 7x - 8 < 0$ si $-8 < x < 1$

donc 2 cas se présentent :

x tend vers -8 et $x < -8$

alors $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x < -8}} x^2 + 7x - 8 = 0^+$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x < -8}} 2x^2 - 5x + 3 = 171$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x < -8}} f(x) = +\infty$ (d'après la règle des signes)

x tend vers -8 et $-2 < x < 1$

$\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x > -8}} x^2 + 7x - 8 = 0^-$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x > -8}} 2x^2 - 5x + 3 = 171$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x > -8}} f(x) = -\infty$ (d'après la règle des signes)

on n'a pas à traiter le cas $x > 1$, car on ne peut avoir simultanément, x tend vers -8 en restant plus grand que 1

Quand x tend vers 1 alors

$2x^2 - 5x + 3$ tend vers 0 et $x^2 + 7x - 8$ tend vers 0

donc on a une forme indéterminée.

x tend vers une valeur finie 1 : on met alors $x - 1$ en facteur avec le plus grand exposant possible et on SIMPLIFIE.

$$2x^2 - 5x + 3 = (x - 1)(2x - 3)$$

$$x^2 + 7x - 8 = (x - 1)(x + 8)$$

$$\text{donc } f(x) = \frac{(x - 1)(2x - 3)}{(x - 1)(x + 8)} \text{ après simplification : } f(x) = \frac{2x - 3}{x + 8}$$

Quand x tend vers 1 alors $2x - 3$ tend vers -1 et $x + 8$ tend vers 9 donc $f(x)$ tend vers $-\frac{1}{9}$ soit $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{1}{9}$.

EXERCICE 3

$$f(x) = \frac{-2x^2 + 5x + 3}{x^2 + 7x - 8}$$

$$D_f =]-\infty; -8[\cup]-8; 1[\cup]1; +\infty[$$

Déterminer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

x tend vers ∞ ($+\infty$ ou $-\infty$) : on met alors x avec le plus grand exposant possible en facteur et on SIMPLIFIE

$$f(x) = \frac{x^2 \left(-2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)}$$

$$\text{donc } f(x) = \frac{\left(-2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)}$$

Quand x tend vers $-\infty$ ou vers $+\infty$ alors $\left(-2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} \right)$ tend vers 2 et $\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)$ tend vers 1 donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = -2$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{\left(2 - \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(-2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = -2$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{\left(-2 + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} \right)}{\left(1 + \frac{7}{x} - \frac{8}{x^2} \right)} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Déterminer les limites de f en -8 et 1 .

$$f(x) = \frac{-2x^2 + 5x + 3}{x^2 + 7x - 8}$$

Quand x tend vers -8 alors :

$-2x^2 + 5x + 3$ tend vers $-8,5$ et $x^2 + 7x - 8$ tend vers 0

donc $f(x)$ tend vers ∞ mais il faut déterminer le signe

$x^2 + 7x - 8$ est une expression du second degré qui s'annule en -8 et 1

donc $x^2 + 7x - 8 > 0$ si $x < -8$ et $x^2 + 7x - 8 < 0$ si $-8 < x < 1$ et $x^2 + 7x - 8 > 0$ si $x > 1$

donc 2 cas se présentent :

x tend vers -8 et $x < -8$

$$\text{alors } \lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x < -8}} x^2 + 7x - 8 = 0^+$$

$$\text{et } \lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x < -8}} -2x^2 + 5x + 3 = -8,5 \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x < -8}} f(x) = -\infty \text{ (d'après la règle des signes)}$$

x tend vers -8 et $-8 < x < 1$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x > -8}} x^2 + 7x - 8 = 0^-$$

et $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x > -8}} -2x^2 + 5x + 3 = -8,5$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow -8 \\ x > -8}} f(x) = +\infty$ (d'après la règle des signes)

on n'a pas à traiter le cas $x > 1$, car on ne peut avoir simultanément, x tend vers -8 en restant plus grand que 1

Quand x tend vers 1 alors

$-2x^2 + 5x + 3$ tend vers $-8,5$ et $x^2 + 7x - 8$ tend vers 0

donc $f(x)$ tend vers ∞ mais il faut déterminer le signe

$x^2 + 7x - 8$ est une expression du second degré qui s'annule en -8 et 1 donc $x^2 + 7x - 8 > 0$ si $x < -8$ et $x^2 + 7x - 8 < 0$ si $-8 < x < 1$ et $x^2 + 7x - 8 > 0$ si $x > 1$

donc 2 cas se présentent :

x tend vers 1 et $-8 < x < 1$

alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} x^2 + 7x - 8 = 0^-$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} -2x^2 + 5x + 3 = -8,5$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = +\infty$ (d'après la règle des signes)

x tend vers 1 et $x > 1$

$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} x^2 + 7x - 8 = 0^+$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} -2x^2 + 5x + 3 = -8,5$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = -\infty$ (d'après la règle des signes)

on n'a pas à traiter le cas $x < -8$, car on ne peut avoir simultanément, x tend vers 1 en restant plus petit que -8 .

Centres étrangers juin 2007

Le but de l'exercice est démontrer que l'équation (E) : $e^x = \frac{1}{x}$, admet une unique solution dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

I. Existence et unicité de la solution

On note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - e^{-x}$.

1. Démontrer que x est solution de l'équation (E) si et seulement si $f(x) = 0$.
2. Étude du signe de la fonction f
 - a. Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
 - b. En déduire que l'équation (E) possède une unique solution sur $\mathbb{R}$, notée α .
 - c. Déterminer un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} .
 - d. Étudier le signe de f sur l'intervalle $[0 ; \alpha]$.

II. Deuxième approche

On note g la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; 1]$ par : $g(x) = \frac{1+x}{1+e^x}$.

1. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ est équivalente à l'équation $g(x) = x$.
2. En déduire que α est l'unique réel vérifiant : $g(\alpha) = \alpha$.
3. Exprimer $g'(x)$ en fonction de $f(x)$. En déduire le sens de variations de la fonction g sur l'intervalle $[0 ; 1]$.

Correction

I. Existence et unicité de la solution

1. x est solution de l'équation (E) $\Leftrightarrow e^x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow \frac{1}{e^x} = x \Leftrightarrow e^{-x} = x \Leftrightarrow x - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$

2. a. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 1 + e^{-x}$ or la fonction exponentielle est positive sur $\mathbb{R}$ donc $f'(x) > 0$

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

f est définie continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, $0 \in f(\mathbb{R})$ donc l'équation (E) possède une unique solution sur $\mathbb{R}$, notée α .

2. c. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $f(0,56) < 0$ et $f(0,57) > 0$ donc $0,56 < \alpha < 0,57$

2. d. f est strictement croissante sur $[0 ; 1]$ et $f(\alpha) = 0$ donc si $0 \leq x < \alpha$ alors $f(x) < 0$; si $\alpha < x \leq 1$ alors $f(x) > 0$ et $f(\alpha) = 0$

II. Deuxième approche

1. $g(x) = x \Leftrightarrow \frac{1+x}{1+e^x} = x \Leftrightarrow 1+x = x + x e^x \Leftrightarrow 1 = x e^x \Leftrightarrow e^{-x} = x \Leftrightarrow f(x) = 0$

2. Résoudre $g(x) = x$ est équivalent à résoudre $f(x) = 0$ or cette équation admet une seule solution sur $\mathbb{R}$, donc α est l'unique réel vérifiant : $g(\alpha) = \alpha$.

3. Exprimer $g'(x)$ en fonction de $f(x)$. En déduire le sens de variations de la fonction g sur l'intervalle $[0 ; 1]$.

$$g'(x) = \frac{1+e^x - (1+x)e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{1-xe^x}{(1+e^x)^2} = -e^x \frac{e^{-x} - x}{(1+e^x)^2} = -e^x \frac{f(x)}{(1+e^x)^2}$$

si $0 \leq x < \alpha$ alors $f(x) < 0$ donc $g'(x) > 0$ donc g est strictement croissante sur $[0 ; \alpha]$

si $\alpha < x \leq 1$ alors $f(x) > 0$ donc $g'(x) < 0$ donc g est strictement décroissante sur $[\alpha ; 1]$

EXERCICE 2 Nouvelle Calédonie novembre 2008

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$.

1. Restitution organisée de connaissances :

La fonction exponentielle est l'unique fonction g dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :
$$\begin{cases} g'(x) = g(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

Démontrer que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

2. Déterminer la limite de la fonction f en 0.

Correction

1. g est dérivable en 0 donc $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = g'(0)$ or $g'(0) = g(0)$ donc $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = g(0)$

or $g(x) = e^x$ et $g(0) = 1$ donc en remplaçant dans $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = g(0)$, on obtient $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

2. $f(x) = \frac{1}{\frac{e^x - 1}{x}}$ or $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

Partie A

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x - x - 1$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormal du plan. La droite (D) d'équation $y = -x - 1$ est asymptote à (C) . On a représenté sur la feuille annexe la courbe (C) et la droite (D) .

1. Soit a un nombre réel. Écrire, en fonction de a , une équation de la tangente (T) à (C) au point M d'abscisse a .
2. Cette tangente (T) coupe la droite (D) au point N d'abscisse b . Vérifier que $b - a = -1$.
3. En déduire une construction, à effectuer sur la feuille annexe, de la tangente (T) à (C) au point M d'abscisse 1,5. On fera apparaître le point N correspondant.

Partie B

1. Déterminer graphiquement le signe de f .
2. En déduire pour tout entier naturel non nul n les inégalités suivantes :

$$(1) \quad e^{\frac{1}{n}} \geq 1 + \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad (2) \quad e^{-\frac{1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{n+1}$$

3. En utilisant l'inégalité (1), démontrer que pour tout entier naturel non nul n : $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$
4. a. En utilisant l'inégalité (2), démontrer que pour tout entier naturel non nul n : $e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$.
4. b. En déduire que $1,01^{100} \leq e \leq 1,01^{101}$

Correction

1. La tangente (T) à (C) au point d'abscisse a est une droite de coefficient directeur $f'(a) = e^a - 1$ donc d'équation $y = (e^a - 1)x + p$
 Cette droite passe par le point de (C) d'abscisse a donc de coordonnées $(a; e^a - a - 1)$ donc $e^a - a - 1 = a(e^a - 1) + p$
 donc $p = e^a - a - 1 - ae^a + a$ soit $p = e^a - ae^a - 1$
 La tangente (T) à (C) au point d'abscisse a est la droite d'équation $y = (e^a - 1)x + e^a - ae^a - 1$

2. Cette tangente (T) coupe la droite (D) au point N d'abscisse b .
 N appartient à (T) donc $y_N = (e^a - 1)b + e^a - ae^a - 1$ de plus N appartient à (D) donc $y_N = -b - 1$
 donc $(e^a - 1)b + e^a - ae^a - 1 = -b - 1$ donc en isolant b : $b(e^a - 1) + b = ae^a - e^a$
 soit $b e^a = (a - 1)e^a$ or la fonction exponentielle est strictement positive donc $e^a \neq 0$ donc $b = a - 1$ soit $b - a = -1$
 donc N a pour coordonnées $(a - 1; -a)$ donc N est le point de D d'abscisse $a - 1$

3. Pour tracer la tangente (T) à (C) au point M d'abscisse 1,5, il suffit de placer le point M sur (C) et de placer le point N d'abscisse 0,5 sur (D) puis de tracer la droite (MN)

Partie B

1. Graphiquement $f(x) \geq 0$

2. Pour tout réel x , $f(x) \geq 0$ donc en particulier pour tout entier naturel n , $f\left(\frac{1}{n}\right) \geq 0$ donc $e^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} - 1 \geq 0$ soit $e^{\frac{1}{n}} \geq 1 + \frac{1}{n}$

Pour tout entier naturel n , $f\left(\frac{-1}{n+1}\right) \geq 0$ donc $e^{-\frac{1}{n+1}} - \frac{-1}{n+1} - 1 \geq 0$ soit $e^{-\frac{1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{n+1}$

3. $e^{\frac{1}{n}} \geq 1 + \frac{1}{n}$ donc $\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ donc pour tout entier naturel non nul n : $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$

4. a. $e^{-\frac{1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{n+1}$ or $1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$ donc $e^{-\frac{1}{n+1}} \geq \frac{n}{n+1} > 0$

soit en passant aux inverses $0 < e^{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{n+1}{n}$

donc $\left(e^{\frac{1}{n+1}}\right)^{n+1} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ donc pour tout entier naturel non nul n : $e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

4. b. Pour tout entier naturel n , $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ donc pour $n = 100$ alors $1,01^{100} \leq e \leq 1,01^{101}$

Soit f la fonction définie sur $] -\infty ; 2]$ par $f(x) = \sqrt{4-2x}$.

Variations de f :

- Écrire f comme composée de deux fonctions usuelles que l'on explicitera.
- En déduire le sens de variations de f sur $] -\infty ; 2]$.

Dérivabilité de f :

- Déterminer $f'(x)$ pour tout x de $] -\infty ; 2]$.
- Étudier la dérivabilité de f en 2 et interpréter graphiquement le résultat obtenu.

Approximation affine:

- Déterminer l'approximation affine de f au voisinage de 0.
- En déduire une valeur approchée de $\sqrt{3,998}$.

CORRECTION

1. a. Soit $u(x) = 4 - 2x$ et $v(x) = \sqrt{x}$ alors $x \mapsto 4 - 2x \mapsto \sqrt{4 - 2x}$ donc $f = v \circ u$

1. b. La fonction u est une fonction affine (de la forme $u(x) = ax + b$ avec $a < 0$) donc est décroissante sur $] -\infty ; 2]$

Sur $] -\infty ; 2]$, $x \leq 2$ donc $2x \leq 4$ donc $4 - 2x \geq 0$ or sur $[0 ; +\infty[$, la fonction v est croissante

La composée d'une fonction croissante v et d'une fonction décroissante u est une fonction décroissante donc f est décroissante sur $] -\infty ; 2]$

2. a. La dérivée de $\sqrt{u}$ est $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$, ici $u(x) = 4 - 2x$ donc $u'(x) = -2$ et $f'(x) = \frac{-2}{2\sqrt{4-2x}} = -\frac{1}{\sqrt{4-2x}}$.

2. b. f est définie sur $] -\infty ; 2]$ donc pour étudier la dérivabilité de f en 2, il faut déterminer la limite quant h tend vers 0^- de

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\sqrt{4-2(2+h)} - \sqrt{4-2 \times 2}}{h} = \frac{\sqrt{-2h} - 0}{h} = \frac{\sqrt{-2h} \times \sqrt{-2h}}{h \sqrt{-2h}} = \frac{-2h}{h \sqrt{-2h}} = \frac{-2}{\sqrt{-2h}}$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} -2h = 0^+ \text{ or } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt{x} = 0^+ \text{ donc } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \sqrt{-2h} = 0^+ \text{ donc } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{1}{\sqrt{-2h}} = +\infty \text{ donc } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{-2}{\sqrt{-2h}} = -\infty$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = -\infty$$

f n'est pas dérivable en 2, $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = -\infty$ donc la courbe de f admet au point d'abscisse 2 une tangente verticale.

3. a. une approximation affine de f au voisinage de 0 est $f(0) + x f'(0)$

$$f(0) = \sqrt{4-2 \times 0} = 2 \text{ et } f'(0) = -\frac{1}{\sqrt{4-2 \times 0}} = -\frac{1}{2} \text{ une approximation affine de } f \text{ au voisinage de 0 est } 2 - \frac{1}{2}x$$

3. b. $3,998 = 4 - 2 \times 0,001$ donc $3,998 = f(0,001)$ or une approximation affine de f au voisinage de 0 est $2 - \frac{1}{2}x$ donc $f(0,001)$ est

approximativement égal à $2 - \frac{1}{2} \times 0,001$ soit à 1,9995

Une valeur approchée de $\sqrt{3,998}$ est 1,9995

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{3\}$ par : $f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 7}{x-3}$ et C sa représentation graphique dans un repère orthonormé

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique: 1 cm).

1. a. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
 - b. Étudier le comportement asymptotique de f en 3. Interpréter les résultats graphiquement.
 2. a. Déterminer la dérivée de f et étudier les variations de f . Dresser le tableau de variations complet de f .
 3. a. Montrer que la courbe de f admet la droite d'équation $y = -2x - 3$ comme asymptote oblique en $+\infty$ et $-\infty$.
 - b) Déterminer algébriquement la position relative de C et de D .
 4. Soit $S(3; -9)$. Montrer que S est centre de symétrie de C .
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C avec l'axe des abscisses.
5. Construire C , y faire apparaître les éléments remarquables.

CORRECTION

$$1. \quad f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 7}{x-3} = \frac{x^2 \left(-2 + \frac{3}{x} + \frac{7}{x^2} \right)}{x \left(1 - \frac{3}{x} \right)} = x \frac{\left(-2 + \frac{3}{x} + \frac{7}{x^2} \right)}{\left(1 - \frac{3}{x} \right)}$$

$$\text{or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x^2} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(-2 + \frac{3}{x} + \frac{7}{x^2} \right)}{\left(1 - \frac{3}{x} \right)} = -2 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{x^2} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(-2 + \frac{3}{x} + \frac{7}{x^2} \right)}{\left(1 - \frac{3}{x} \right)} = -2 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$\lim_{x \rightarrow 3} x - 3 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 3} -2x^2 + 3x + 7 = -2$, il faut donc déterminer le signe de $x - 3$

si $x > 3$; $x - 3 > 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} x - 3 = 0^+$ donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty$

si $x < 3$; $x - 3 < 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} x - 3 = 0^-$ donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$

La droite d'équation $x = 3$ est asymptote à la courbe de f .

$$2. \quad u(x) = -2x^2 + 3x + 7 \text{ donc } u'(x) = -4x + 3$$

$$v(x) = x - 3 \text{ donc } v'(x) = 1$$

$$f'(x) = \frac{(-4x + 3)(x - 3) - (-2x^2 + 3x + 7)}{(x - 3)^2} = \frac{-4x^2 + 3x + 12x - 9 + 2x^2 - 3x - 7}{(x - 3)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 12x - 16}{(x - 3)^2} = -2 \frac{x^2 - 6x + 8}{(x - 3)^2}$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4 \times 8 \text{ donc } x^2 - 6x + 8 = 0 \quad \square \quad x = 2 \text{ ou } x = 4 \text{ donc :}$$

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$
$x^2 - 6x + 8$	+	0	-	0	+
signe de $f'(x)$	-		+		-
variation de f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$
		-5		-1	
			$-\infty$		$-\infty$

$$3. a. \quad f(x) - (-2x - 3) = \frac{-2x^2 + 3x + 7}{x - 3} + 2x + 3 = \frac{-2x^2 + 3x + 7 + (x - 3)(2x + 3)}{x - 3}$$

$$f(x) - (-2x - 3) = \frac{-2x^2 + 3x + 7 + 2x^2 - 6x + 3x - 9}{x - 3} = \frac{-2}{x - 3}$$

$$\text{or } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 3 = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{x - 3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-2x - 3)] = 0$$

$$\text{or } \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 3 = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{x - 3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x - 3)] = 0$$

La droite d'équation $y = -2x - 3$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$ et $-\infty$.

3. b. Pour connaître la position relative de $\mathcal{C}$ et de $\mathcal{D}$, il suffit d'étudier le signe de $f(x) - (-2x - 3)$ donc de $\frac{-2}{x-3}$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$x-3$		-	+
signe de $f'(x)$		+	-
Position relative de $\mathcal{C}$ et de $\mathcal{D}$		$\mathcal{C}$ est au dessus de $\mathcal{D}$	$\mathcal{C}$ est en dessous de $\mathcal{D}$

4. Pour montrer que S est centre de symétrie de C, il suffit de prouver que pour tout h non nul, $f(3-h) + f(3+h) = -18$

D'après la question précédente $f(x) = -2x - 3 - \frac{2}{x-3}$

$$f(3-h) = -2(3-h) - 3 - \frac{2}{3-h-3} = -9 + 2h + \frac{2}{h}$$

$$f(3+h) = -2(3+h) - 3 - \frac{2}{3+h-3} = -9 - 2h - \frac{2}{h}$$

$$f(3+h) + f(3-h) = -9 + 2h + \frac{2}{h} - 9 - 2h - \frac{2}{h} = -18 \text{ donc le point S de coordonnées } (3; -9) \text{ est centre de symétrie de } \mathcal{C}.$$

5. Pour déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre $f(x) = 0$

soit $\frac{-2x^2 + 3x + 7}{x-3} = 0$ ou encore $-2x^2 + 3x + 7 = 0$ avec $x \neq 3$

$$\Delta = 9 - 4 \times (-2) \times 7 = 65 \text{ donc } x_1 = \frac{-3 + \sqrt{65}}{-4} \text{ et } x_2 = \frac{-3 - \sqrt{65}}{-4}$$

Il existe deux points d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses, l'un A de coordonnées $\left(\frac{3 + \sqrt{65}}{4}; 0\right)$ l'autre B de coordonnées

$$\left(\frac{3 - \sqrt{65}}{4}; 0\right).$$

ENONCE

a, b, c et d sont des réels tels que pour tout réel $x \neq -1, f(x) = ax + b + \frac{c}{x+d}$.

Le tableau de variation de f est le suivant :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	0			0		
f	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

1. a) Quelle est la valeur de d ?

1. b) Calculer $f'(x)$ en fonction de a et c .

1. c) Préciser, $f(0), f(-2), f'(0), f'(-2)$. En déduire que a, b, c sont solutions du système :

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b + c = 2 \\ -2a + b - c = -2 \end{cases}$$

Déterminer les réels a, b et c .

2. a) Soit la fonction $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x+1}$

Montrer que le point $I(-1; 0)$ est centre de symétrie de la courbe

2. b) Démontrer que, dans un repère, la courbe représentative C de f admet la droite D d'équation $y = x + 1$ pour asymptote en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. c) Étudier la position de C par rapport à D

CORRECTION

1. a) $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+d}$ donc f est définie pour tous les x réels tels que $x+d \neq 0$ soit $x \neq -d$ or d'après le tableau de variation,

f n'est pas définie pour $x = -1$, donc $-d = -1$ soit $d = 1$ donc $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$

1. b) $f'(x) = a - \frac{c}{(x+1)^2}$

1. c) D'après le tableau de variation : $f(0) = 2$ donc $b + c = 2$ de plus $f'(0) = 0$ donc $a - c = 0$

$f(-2) = -2$ donc $-2a + b - c = -2$ de plus $f'(-2) = 0$ donc $a - c = 0$

a, b, c sont solutions du système :

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b + c = 2 \\ -2a + b - c = -2 \end{cases}$$

$a = c$ donc en remplaçant dans le système :

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b + c = 2 \\ b - 3c = -2 \end{cases} \quad \text{en soustrayant la deuxième et la troisième ligne : } \begin{cases} a - c = 0 \\ b + c = 2 \\ 4c = 4 \end{cases} \quad \text{donc } a = c = 1 \text{ et } b = 1$$

2. a) $f(-2-x) + f(x) = -1 - x - \frac{1}{x+1} + x + 1 + \frac{1}{x+1}$ donc le point $I(-1; 0)$ est centre de symétrie de la courbe.

2. b) $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x+1}$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+1} = 0$ donc la courbe représentative C de f admet la droite D d'équation $y = x + 1$ pour asymptote en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. c) $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x+1}$ donc si $x < -1, x+1 < 0$ donc $f(x) - (x+1) < 0$ la courbe C est en dessous de D sur $] -\infty; -1[$.

si $x > -1, x+1 > 0$ donc $f(x) - (x+1) > 0$ la courbe C est au dessus de D sur $] -1; +\infty[$.

1. Soit la fonction polynôme P définie sur $\mathbb{R}$ par : $P(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2$.
- Étudier les variations de P.
 - Montrer que, sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$, l'équation (E) $P(x) = 0$ admet une solution unique α .
 - Montrer que sur l'intervalle $] -\infty ; 0]$, l'équation (E) n'admet pas de solution.
2. Soit l'intervalle $] -1 ; +\infty [$, noté I. On considère la fonction f définie sur I par : $f(x) = \frac{2x+1}{x^3+1}$

On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 4 cm).

- En utilisant les résultats de la question 1), étudier les variations de f.
 - Déterminer une équation de la tangente (T) à C au point d'abscisse 0.
 - Étudier les positions respectives de C et de (T) pour $x \in] -1 ; +\infty [$.
3. a. Vérifier et justifier la proposition suivante : α est compris entre 0,60 et 0,61.
- Démontrer que $f(\alpha) = \frac{2}{3\alpha^2}$.
 - En déduire que $f(\alpha)$ est compris entre 1,7 et 1,9.
4. a. Démontrer que C admet deux droites asymptotes que l'on précisera par leurs équations.
- Représenter C, (T) et les droites asymptotes à C.

CORRECTION

1. a. P est un polynôme donc est continu et dérivable sur $\mathbb{R}$. Ses limites à l'infini sont celles de son terme de plus haut degré,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^3 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 = -\infty.$$

$P'(x) = 12x^2 + 6x = 6x(2x+1)$ donc $P'(x)$ est un polynôme du second degré qui s'annule en 0 et $-0,5$ d'où le tableau de variations de P :

x	$-\infty$	$-0,5$	0	$+\infty$			
$P'(x)$		+	0	-	0	+	
P	$-\infty$	$\nearrow$	-1,75	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

b. P est défini continu, strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$, $P([0 ; +\infty[) = [-2 ; +\infty[$, donc $0 \in P([0 ; +\infty[)$ donc l'équation $P(x) = 0$ admet une seule solution α sur $[0 ; +\infty[$.

c. Montrer que sur l'intervalle $] -\infty ; 0]$, l'équation (E) n'admet pas de solution.

P est croissante sur $] -\infty ; -0,5]$ et croissante sur $[-0,5 ; 0 [$ donc P admet un maximum en $-0,5$; $P(-0,5) = -0,75$ donc pour tout x de $] -\infty ; 0 [$, $P(x) \leq -0,75$ donc sur l'intervalle $] -\infty ; 0]$, l'équation (E) n'admet pas de solution.

2. a. En utilisant les résultats de la question 1), étudier les variations de f.

$$f'(x) = \frac{2(x^3+1) - 3x^2(2x+1)}{(x^3+1)^2} = \frac{-(4x^3+3x^2-2)}{(x^3+1)^2} = -\frac{P(x)}{(x^3+1)^2}$$

P est strictement négatif sur $] -\infty ; \alpha [$, nul en α et strictement positif sur $] \alpha ; +\infty [$ donc :

x	-1	α	$+\infty$		
-1		-	-		
$P(x)$		-	0	+	
$f'(x)$		+	-		
f		$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$	0

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^3+1} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

b. $f'(0) = 2$ donc (T) a pour équation $y = 2x + b$

$f(0) = 1$ donc (T) passe par le point de coordonnées $(0 ; 1)$ donc $1 = 2 \times 0 + b$ donc $b = 1$ donc (T) a pour équation $y = 2x + 1$

$$c. \quad f(x) - (2x+1) = \frac{2x+1}{x^3+1} - (2x+1) = (2x+1) \left(\frac{1}{x^3+1} - 1 \right) = (2x+1) \left(\frac{-x^3}{x^3+1} \right)$$

x	-1	$-0,5$		0	$+\infty$	
$-x^3$		$+$		$+$	0	
$2x+1$		$-$	0	$+$	$+$	
$f(x) - (2x+1)$		$-$	0	$+$	0	
		C est en dessous de (T)	Point d'intersection	C est au dessus de (T)	Point d'intersection	C est en dessous de (T)

3. a. $P(0,60) < 0$ et $P(0,61) > 0$ or P est continue sur $\mathbb{R}$ donc P s'annule sur $[0,60 ; 0,61]$ donc $0,60 \leq u \leq 0,61$.

3. b. $P(u) = 0$ donc $4u^3 + 3u^2 - 2 = 0$ donc $4u^3 = 2 - 3u^2$

$$f(u) - \frac{2}{3u^2} = \frac{2u+1}{u^3+1} - \frac{2}{3u^2} = \frac{3u^2(2u+1) - 2(u^3+1)}{3(u^3+1)u^2}$$

$$f(u) - \frac{2}{3u^2} = \frac{6u^3 + 3u^2 - 2u^3 - 2}{3(u^3+1)u^2} \text{ donc } f(u) - \frac{2}{3u^2} = \frac{4u^3 + 3u^2 - 2}{3(u^3+1)u^2} = \frac{P(u)}{3(u^3+1)u^2} = 0 \text{ donc } f(u) - \frac{2}{3u^2}$$

3. c. $0,60 \leq u \leq 0,61$ donc $0,60^2 \leq u^2 \leq 0,61^2$

$$3 \times 0,36 \leq 3u^2 \leq 3 \times 0,3721 \text{ soit } 1,08 \leq 3u^2 \leq 1,1163 \text{ donc } \frac{1}{1,1163} \leq \frac{1}{3u^2} \leq \frac{1}{1,08} \text{ donc } \frac{2}{1,1163} \leq \frac{2}{3u^2} \leq \frac{2}{1,08}$$

$$\frac{2}{1,1163} \approx 1,792 \text{ et } \frac{2}{1,08} \approx 1,852 \text{ donc } 1,7 \leq f(u) \leq 1,9$$

4. a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ donc la droite d'équation $y = 0$ est asymptote à C

$$f(x) = \frac{2x+1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{x+1} \times \frac{2x+1}{x^2-x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x+1}{(x^2-x+1)} = -\frac{1}{3} \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} \frac{1}{x+1} = +\infty \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = -\infty, \text{ la droite d'équation } x = -1 \text{ est asymptote à } C.$$

Soit f la fonction définie sur $] -\infty ; -7] \cup [1 ; +\infty [$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 6x - 7}$.

Justifier que la fonction f est bien définie sur $] -\infty ; -7] \cup [1 ; +\infty [$.

1. a. Déterminer la forme canonique du trinôme du second degré $x^2 + 6x - 7$.
1. b. Démontrer que la droite d'équation : $x = -3$ est un axe de symétrie de la courbe de f .
2. a. Conjecturer la dérivabilité de f en -7 et en 1 à l'aide de la calculatrice. Expliquer.
2. b. Démontrer le résultat conjecturé pour la dérivabilité en 1 .

CORRECTION

Soit $D_f =] -\infty ; -7] \cup [1 ; +\infty [$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 6x - 7}$.

1. La fonction racine carrée est définie sur $[0 ; +\infty [$

$x^2 + 6x - 7$ est un trinôme du second degré, $x^2 + 6x - 7 = 0 \iff x = 1$ ou $x = -7$

$x^2 + 6x - 7 \geq 0 \iff x \in] -\infty ; -7] \cup [1 ; +\infty [$ donc pour tout x de $] -\infty ; -7] \cup [1 ; +\infty [$, $x^2 + 6x - 7 > 0$ donc f est définie sur $] -\infty ; -7] \cup [1 ; +\infty [$

2. a. $x^2 + 6x - 7 = (x + 3)^2 - 9 - 7 = (x + 3)^2 - 16$

2. b. Soit h un réel tel que $-3 + h$ et $-3 - h \in D_f$

$h \geq 4$ ou $h \leq -3$ alors $-3 + h \geq 1$ ou $-3 + h \leq -7$, donc $-3 + h \in D_f$

$f(-3 + h) = (-3 + h - 3)^2 - 16 = h^2 - 16$

si $h \geq 4$ ou $h \leq -3$ alors $-3 - h \leq 7$ ou $-3 - h \geq 1$, donc $-3 - h \in D_f$

$f(-3 - h) = (-3 - h - 3)^2 - 16 = h^2 - 16$ donc pour tout h réel, $f(-3 + h) = f(-3 - h)$

La droite d'équation : $x = -3$ est un axe de symétrie de la courbe de f .

3. a. f est dérivable en 1 si et seulement si $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ existe, on a alors $f'(1) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.

$f(1) = 0$ et $f(1+h) = \sqrt{(1+h+3)^2 - 16} = \sqrt{(4+h)^2 - 16} = \sqrt{h^2 + 8h}$ donc $\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\sqrt{h^2 + 8h}}{h}$

donc sur la calculatrice, dans le menu TABLE, on écrit $\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\sqrt{h^2 + 8h}}{h}$

Dans RANG, il faut choisir des valeurs de h de plus en plus proches de 0 :

par exemple demander des valeurs de h en partant de $0,2$ et en allant vers 0 en diminuant à chaque fois de $0,01$

Table Setting
X

```
Start:0.2
End :0
Step :-0.01
```

en demandant la table, la calculatrice affiche :

X	Y1
0.04	14.177
0.03	16.36
0.02	20.024
0.01	28.301

0.04

FORM DEL ROW EDIT G-COM G-PLT

On constate que plus h se rapproche de 0 , plus la valeur de $\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\sqrt{h^2 + 8h}}{h}$ augmente et donc, on peut supposer que

$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = +\infty$, donc f n'est pas dérivable en 1 mais sa courbe admet une tangente verticale en 1 .

La droite d'équation : $x = -3$ est un axe de symétrie de la courbe de f , le résultat est identique en -7 :

f n'est pas dérivable en -7 mais sa courbe admet une tangente verticale en -7 .

3. b. Démontrer le résultat conjecturé pour la dérivabilité en 1 .

$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\sqrt{h^2 + 8h}}{h} = \frac{\sqrt{h^2 \left(1 + \frac{8}{h}\right)}}{h} = \sqrt{1 + \frac{8}{h}}$ or $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} 1 + \frac{8}{h} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ donc

$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \sqrt{1 + \frac{8}{h}} = +\infty$ soit $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = +\infty$. f n'est pas dérivable en 1 mais sa courbe admet une tangente verticale en 1 .

Déterminer la limite en $\frac{\pi}{4}$ de $\frac{\sin x - \cos x}{4x - \pi}$

CORRECTION

Méthode générale

On peut depuis le début poser $h = x - \frac{\pi}{4}$ donc remplacer x par $h + \frac{\pi}{4}$ dans $\frac{\sin x - \cos x}{4x - \pi}$

Il faut alors développer $\frac{\sin\left(h + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(h + \frac{\pi}{4}\right)}{4\left(h + \frac{\pi}{4}\right) - \pi}$ ce qui conduit après simplification à $\frac{\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sin h}{h}$ puis ensuite chercher la limite

en 0 de cette expression.

Méthode particulière : au lieu de poser $h = x - \frac{\pi}{4}$, on développe $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ à la recherche de simplification d'écriture.

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin x \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos x \text{ donc } \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sin x - \cos x)$$

$$\text{donc } \sin x - \cos x = \frac{2}{\sqrt{2}} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$4x - \pi = 4\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \text{ donc } \frac{\sin x - \cos x}{4x - \pi} = \frac{\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}}$$

$$\text{En posant } h = x - \frac{\pi}{4} \text{ on obtient : } \frac{\sin x - \cos x}{4x - \pi} = \frac{\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sin h}{h}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} h = 0 \text{ et } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{4x - \pi} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

ENONCE

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R} - \{-3\}$, dont le tableau de variation est le suivant :

x	$-\infty$	-4	-3	-1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	10	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	
				$\nearrow$	$-\frac{7}{2}$	$\searrow$	$+\infty$

On sait, de plus, que pour tout réel $x \neq -3$, $f(x)$ peut s'écrire sous la forme : $ax^2 + b + \frac{c}{x+d}$ où a, b, c, d sont quatre réels (avec $a \neq 0$ et $c \neq 0$).

1. a. À l'aide des indications fournies par le tableau, déterminer la fonction f .

b. Démontrer qu'il existe un réel e tel que : pour tout $x \in \mathbb{R} - \{-3\}$, $f'(x) = \frac{(x+1)^2(x+e)}{(x+3)^2}$

c. Justifier toutes les informations du tableau de variation de f .

2. Soit C la courbe représentative de f dans un repère du plan et P la parabole d'équation $y = \frac{x^2}{2} - 2$ dans le même repère.

a. Prouver que P coupe l'axe des abscisses en deux points que l'on déterminera.

b. Prouver que C coupe l'axe des abscisses en seul point A . On déterminera une valeur approchée de l'abscisse de A à 10^{-2} près.

c. Étudier la position relative des courbes C et P .

d. Prouver que P est une courbe asymptote de C en $-\infty$ et en $+\infty$.

e. Construire P et C .

f. Résoudre algébriquement l'inéquation : $-0,1 < f(x) - (\frac{1}{2}x^2 - 2) < 0,1$. Interpréter graphiquement.

CORRECTION

1. a. D'après le tableau de variation, on a entre autre que $x \neq -3$ donc $d = 3$, de plus :

$$f(-4) = 10 \text{ et } f'(-4) = 0 ; f(-1) = -\frac{7}{2} \text{ et } f'(-1) = 0$$

$$f'(x) = 2ax - \frac{c}{(x+3)^2} \text{ donc } \begin{cases} f(-4) = 16a + b - c = 10 \\ f'(-4) = -8a - c = 0 \\ f(-1) = a + b + \frac{c}{2} = -\frac{7}{2} \\ f'(-1) = -2a - \frac{c}{4} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16a + b - c = 10 \\ c = -8a \\ a + b - 4a = -\frac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 24a + b = 10 \\ c = -8a \\ -3a + b = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 24a + b + 3a - b = 10 + \frac{7}{2} \\ b = 10 - 24a \\ c = -8a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = -4 \end{cases} \text{ donc } f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 - \frac{4}{x+3}$$

1. b. $f'(x) = x + \frac{4}{(x+3)^2} = \frac{x^3 + 6x^2 + 9x + 4}{(x+3)^2}$

$$x^3 + 6x^2 + 9x + 4 = (x^2 + 2x + 1)(x + e)$$

$$x^3 + 6x^2 + 9x + 4 = x^3 + (e+2)x^2 + (2e+1)x + e$$

donc $e+2 = 6$, $2e+1 = 9$ et $e = 4$

donc $x^3 + 6x^2 + 9x + 4 = (x^2 + 2x + 1)(x + 4)$

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2(x+4)}{(x+3)^2}$$

1. c. Un carré est toujours positif ou nul donc $f'(x)$ a le même signe que $x+4$, et s'annule pour $x = -4$

x	$-\infty$	-4	-3	-1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$+$

d'où le sens de variation de f

Il suffit ensuite de déterminer les limites de f aux bornes du domaine de définition

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 - \frac{4}{x+3} \text{ or } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2}x^2 - 2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x+3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{2}x^2 - 2 = \frac{5}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{4}{x+3} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{2}x^2 - 2 = \frac{5}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{4}{x+3} = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$$

2. a P coupe l'axe des abscisses quand $\frac{1}{2}x^2 - 2 = 0$ soit si $x^2 = 4$ donc si $x = 2$ ou $x = -2$ donc P coupe l'axe des abscisses en deux points $A_1(-2; 0)$ et $A_2(2; 0)$.

2. b f est décroissante sur $] -\infty; -4]$ et croissante sur $[4; -3[$ donc f admet un minimum en -4 ; $f(-4) = 10$ donc pour tout x de $] -\infty; -3[$, $f(x) \geq 10$ donc C ne coupe pas l'axe des abscisses sur $] -\infty; -3[$.

f est définie continue, strictement croissante sur $] -3; +\infty[$, $f(]-3; +\infty[) =] -\infty; +\infty[$, donc $0 \in f(]-3; +\infty[)$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α sur $] -3; +\infty[$.

La courbe C coupe donc l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse α sur $] -3; +\infty[$.

$f(2,34) < 0$ et $f(2,35) > 0$ et l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α sur $] -3; +\infty[$ donc f s'annule sur $] 2,34; 2,35[$ donc $2,34 < \alpha < 2,35$

$$2. c. f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3} \text{ donc si } x > -3, f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) < 0 \text{ donc C est en dessous de P sur }] -3; +\infty[$$

si $x < -3$, $f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) > 0$ donc C est au dessus de P sur $] -\infty; -3[$.

$$f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3} \text{ et } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x+3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = 0 \text{ donc P est asymptote à C en } +\infty \text{ et } -\infty.$$

$$2. f. f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3}, \text{ on doit donc résoudre } -0,1 < -\frac{4}{x+3} < 0,1 \text{ soit en multipliant par } -1, \text{ il suffit donc de résoudre}$$

$$-0,1 < \frac{4}{x+3} < 0,1. \text{ On ne peut travailler qu'avec des nombres de même signe donc deux cas :}$$

$$\text{Cas 1 : } 0 < \frac{4}{x+3} < 0,1 \text{ donc en passant aux inverses : } \frac{x+3}{4} > 10 \text{ soit } x+3 > 40 \text{ donc } x > 37$$

$$\text{Cas 2 : } -0,1 < \frac{4}{x+3} < 0 \text{ donc en passant aux inverses : } \frac{x+3}{4} < -10 \text{ soit } x+3 < -40 \text{ donc } x < -43$$

Si $x \in] -\infty; -43[\cup] 37; +\infty[$, l'écart entre la courbe et la parabole est inférieur à 0,1.

EXERCICE 1

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R} - \{-3\}$, dont le tableau de variation est le suivant :

x	$-\infty$	-4	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	10	$\nearrow$	$+\infty$
				$-\infty$	$\nearrow$
				$-\frac{7}{2}$	$+\infty$

On sait, de plus, que pour tout réel $x \neq -3$, $f(x)$ peut s'écrire sous la forme : $ax^2 + b + \frac{c}{x+d}$ où a, b, c, d sont quatre réels (avec

$a \neq 0$ et $c \neq 0$) et que $f'(x) = 2ax - \frac{c}{(x+d)^2}$.

1. a. À l'aide des indications fournies par le tableau, déterminer d .

Préciser $f(-4)$; $f(-1)$; $f'(-4)$ et $f'(-1)$. En déduire que a, b et c vérifient le système :

$$\begin{cases} 16a + b - c = 10 \\ -8a - c = 0 \\ 2a + 2b + c = -7 \end{cases}$$

Résoudre ce système et déterminer la fonction f .

1. b. Démontrer qu'il existe un réel e tel que : pour tout $x \in \mathbb{R} - \{-3\}$, $f'(x) = \frac{(x+1)^2(x+e)}{(x+3)^2}$

1. c. Justifier toutes les informations du tableau de variation de f .

2. Soit C la courbe représentative de f dans un repère du plan et P la parabole d'équation $y = \frac{x^2}{2} - 2$ dans le même repère.

2. a. Prouver que P coupe l'axe des abscisses en deux points que l'on déterminera.

2. b. Étudier la position relative des courbes C et P .

2. c. Prouver que P est une courbe asymptote de C en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. d. Construire P et C .

2. e. Résoudre algébriquement l'inéquation : $-0,1 < f(x) - (\frac{1}{2}x^2 - 2) < 0,1$.

On désigne par M et N les points de même abscisse x appartenant respectivement à (C) et (D) .

On juge que M et N sont indiscernables sur le graphique lorsque la distance MN est inférieure à $0,1$ unité de longueur.

Déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles M et N sont indiscernables.

EXERCICE 2

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x - x$

Déterminer le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. Préciser $f(0)$, en déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos x + \frac{x^2}{2} - 1$

Déterminer le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$. Préciser $g(0)$, en déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$

3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$

Déterminer le sens de variation de h sur $\mathbb{R}$. Préciser $h(0)$, en déduire le signe de $h(x)$

4. a. A l'aide des questions précédentes, montrer que sur $]0; +\infty[$: $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$

4. b. En déduire un encadrement sur $]0; +\infty[$ de $\frac{\sin x}{x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$.

5. A l'aide des questions précédentes, déterminer un encadrement de $\sin x$ sur $] -\infty; 0]$.

4. b. En déduire un encadrement sur $] -\infty; 0]$ de $\frac{\sin x}{x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x}$.

EXERCICE 1

1. a. f est définie lorsque $x + d \neq 0$ soit $x \neq -d$ donc d'après le tableau de variation $-d = -3$ donc $d = 3$

$$f(x) = ax^2 + b + \frac{c}{x+3} \text{ et } f'(x) = 2ax - \frac{c}{(x+3)^2}.$$

$$f(-4) = 10 \text{ donc } 16a + b + \frac{c}{-4+3} = 10 \text{ soit } 16a + b - c = 10$$

$$f(-1) = -\frac{7}{2} \text{ donc } a + b + \frac{c}{-1+3} = -\frac{7}{2} \text{ donc } a + b + \frac{c}{2} = -\frac{7}{2} \text{ donc } 2a + 2b + c = -7$$

$$f'(-4) = 0 \text{ donc } -8a - \frac{c}{(-4+3)^2} = 0 \text{ soit } -8a - c = 0$$

$$f'(-1) = 0 \text{ donc } -2a - \frac{c}{(-1+3)^2} = 0 \text{ soit } -2a - \frac{c}{4} = 0 \text{ donc } -8a - c = 0 \text{ donc } a, b \text{ et } c \text{ vérifient le système : } \begin{cases} 16a + b - c = 10 \\ -8a - c = 0 \\ 2a + 2b + c = -7 \end{cases}$$

$$c = -8a \text{ donc le système devient : } \begin{cases} c = -8a \\ 16a + b + 8a = 10 \\ 2a + 2b - 8a = -7 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} c = -8a \\ 24a + b = 10 \\ -6a + 2b = -7 \end{cases} \text{ donc en multipliant la dernière ligne par 4 :}$$

$$\begin{cases} c = -8a \\ 24a + b = 10 \\ -24a + 8b = -28 \end{cases} \text{ en ajoutant les deux dernières lignes : } \begin{cases} c = -8a \\ 24a + b = 10 \\ 9b = -18 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} c = -8a \\ 24a + b = 10 \\ b = -2 \end{cases} \text{ donc en remplaçant :}$$

$$\begin{cases} c = -8a \\ 24a - 2 = 10 \\ b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -8a \\ 24a = 12 \\ b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -8a \\ a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -2 \\ c = -4 \end{cases} \text{ donc } f(x) = \frac{x^2}{2} - 2 - \frac{4}{x+3}$$

$$f'(x) = x + \frac{4}{(x+3)^2}$$

$$1. b. f'(x) = x + \frac{4}{(x+3)^2} = \frac{x^3 + 6x^2 + 9x + 4}{(x+3)^2}$$

$$x^3 + 6x^2 + 9x + 4 = (x^2 + 2x + 1)(x + e) \text{ donc } x^3 + 6x^2 + 9x + 4 = x^3 + (e+2)x^2 + (2e+1)x + e$$

$$\text{donc } e+2 = 6, 2e+1 = 9 \text{ et } e = 4 \text{ donc } x^3 + 6x^2 + 9x + 4 = (x^2 + 2x + 1)(x + 4)$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2(x+4)}{(x+3)^2}$$

1. c. Un carré est toujours positif ou nul donc $f'(x)$ a le même signe que $x + 4$, et s'annule pour $x = -1$ d'où le sens de variation de f

x	$-\infty$	-4	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$+$

Il suffit ensuite de déterminer les limites de f aux bornes du domaine de définition

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 - \frac{4}{x+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}x^2 - 2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x+3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}x^2 - 2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x+3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{2}x^2 - 2 = \frac{5}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{4}{x+3} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{2}x^2 - 2 = \frac{5}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{4}{x+3} = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$$

2. a. P coupe l'axe des abscisses quand $\frac{1}{2}x^2 - 2 = 0$ soit si $x^2 = 4$ donc si $x = 2$ ou $x = -2$ donc P coupe l'axe des abscisses en deux points $A_1(-2; 0)$ et $A_2(2; 0)$.

2. b. f est décroissante sur $]-\infty; -4]$ et croissante sur $[4; -3[$ donc f admet un minimum en -4 ; $f(-4) = 10$ donc pour tout x de $]-\infty; -3[$, $f(x) \geq 10$ donc C ne coupe pas l'axe des abscisses sur $]-\infty; -3[$.

f est définie dérivable, strictement croissante sur $]-3; +\infty[$, $f(]-3; +\infty[) =]-\infty; +\infty[$, donc $0 \in f(]-3; +\infty[)$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α sur $]-3; +\infty[$.

La courbe C coupe donc l'axe des abscisses en un seul point sur $]-3; +\infty[$.

$f(2,34) < 0$ et $f(2,35) > 0$ et l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α sur $]-3; +\infty[$ donc f s'annule sur $]2,34; 2,35[$ donc $2,34 < \alpha < 2,35$

$$2. c. f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3}$$

donc si $x > -3$, $f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) < 0$ donc C est en dessous de P sur $]-3; +\infty[$

si $x < -3$, $f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) > 0$ donc C est au dessus de P sur $]-\infty; -3[$.

$f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x+3} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = 0$ donc P est asymptote à C en $+\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x+3} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = 0$ donc P est asymptote à C en $-\infty$.

2. d. Pour tracer les courbes C et P, il faut placer les éléments remarquables :

Pour la parabole P

sommet de coordonnées $(0; -2)$ et la tangente horizontales au point d'abscisse 0

Ces éléments étant placés, il faut placer des points de P :

x	-6	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	16	6	2,5	0	-1,5	-2	-1,5	0	2,5	6

On peut alors tracer P

Pour la courbe C

Points à tangentes horizontales pour C aux points d'abscisse -4 et -1

l'asymptote $x = -3$.

Ces éléments étant placés, il faut placer des points de C :

x	-7	-5	-4	-3,5	-2,5	-2	-1	1	2	5
y	23,5	12,5	10	12,125	-6,875	-4	-3,5	-2,5	-0,8	10

On peut alors tracer C.

$$2. e. f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3}$$

Il suffit donc de résoudre $-0,1 < \frac{4}{x+3} < 0,1$. On ne peut travailler qu'avec des nombres de même signe donc deux cas :

Cas 1 : $0 \leq \frac{4}{x+3} < 0,1$ donc en passant aux inverses : $\frac{x+3}{4} > 10$ soit $x+3 > 40$ donc $x > 37$

Cas 2 : $-0,1 < \frac{4}{x+3} < 0$ donc en passant aux inverses : $-10 > \frac{x+3}{4}$ soit $x+3 < -40$ donc $x < -43$

Si $x \in]-\infty; -43[\cup]37; +\infty[$, l'écart entre la courbe et la parabole est inférieur à 0,1.

Si $x < -3$, C est au dessus de P sur $]-\infty; -3[$ donc $MN = f(x) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) = -\frac{4}{x+3}$.

$MN < 0,1 \Leftrightarrow 0 < -\frac{4}{x+3} < 0,1 \Leftrightarrow -0,1 < \frac{4}{x+3} < 0$ donc $x > -43$ d'après le calcul précédent

Si $x > -3$, C est en dessous de P sur $]-3; +\infty[$ donc $MN = \left(\frac{1}{2}x^2 - 2\right) - f(x) = \frac{4}{x+3}$.

$MN < 0,1 \Leftrightarrow 0 < \frac{4}{x+3} < 0,1$ donc $x > 37$ d'après le calcul précédent

L'ensemble des valeurs de x pour lesquelles M et N sont indiscernables est donc $]-\infty; -43[\cup]37; +\infty[$,

EXERCICE 2

1. $f'(x) = \cos x - 1$ or $-1 \leq \cos x \leq 1$ donc $f'(x) \leq 0$ donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f			
$f(x)$	+	0	-

$f(0) = 0$ donc si $x < 0$ alors $f(x) \geq 0$ et si $x > 0$ alors $f(x) \leq 0$

2. $g'(x) = -\sin x + x = -f(x)$ donc :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
g			
$g(x)$	+	0	+

3. $h'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = g(x)$ donc :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	+
h			
$h(x)$	-	0	+

4. a. sur $]0; +\infty[: f(x) \leq 0$ donc $\sin x \leq x$ et $h(x) \geq 0$ donc $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x$ donc sur $]0; +\infty[: x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$

4. b. sur $]0; +\infty[: x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ soit $x \left(1 - \frac{x^2}{6}\right) \leq \sin x \leq x$

$x > 0$ donc $1 - \frac{x^2}{6} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \frac{x^2}{6} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$ et pour tout $x > 0 : 1 - \frac{x^2}{6} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ donc d'après le théorème des gendarmes $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$

5. sur $]-\infty; 0] : f(x) \geq 0$ donc $\sin x \geq x$ et $h(x) \leq 0$ donc $\sin x \leq x - \frac{x^3}{6}$ donc sur $]-\infty; 0] : x \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{6}$

4. b. sur $]-\infty; 0] : x \leq \sin x \leq x \left(1 - \frac{x^2}{6}\right)$ donc si $x < 0 : 1 \geq \frac{\sin x}{x} \geq 1 - \frac{x^2}{6}$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 - \frac{x^2}{6} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$ et pour tout $x < 0 : 1 - \frac{x^2}{6} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ donc d'après le théorème des gendarmes $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$

Dans tous les cas $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Exercice 1

On désigne par n et a deux entiers naturels.

1. Démontrer que si a divise $5n + 31$ et a divise $3n + 12$, alors a divise 33.
2. Déterminer toutes les valeurs possibles pour les entiers a et n .

Exercice 2

Déterminer les entiers naturels n tels que le quotient $\frac{5n+3}{n+2}$ soit un entier.

Exercice 3

On désigne par a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

1. Développer le carré $(a^2 + 2b^2)^2$.
2. En déduire que l'entier naturel $a^4 + 4b^4$ n'est jamais un nombre premier.

Exercice 4

Le reste de la division euclidienne de l'entier naturel a par 45 est 9.

Quel est le reste de la division euclidienne de a : par 15 par 9 ? par 5 ? par 3 ?

Exercice 5

Les divisions euclidiennes de l'entier naturel a par 155 et par 161 donnent le même quotient et des restes égaux respectivement à 65 et 23.

1. Déterminer l'entier a .
2. Quels sont les restes possibles dans la division euclidienne d'un entier naturel impair par 4 ?

Exercice 6

1. Montrer que $1000 \equiv -1 \pmod{13}$, déterminer le reste de la division de 10^6 par 13

2. Soit n un entier naturel quelconque, montrer que n est de la forme $6k$; $6k + 1$... $6k + 5$ où k est un entier naturel.
En déduire les valeurs possibles du reste de la division de 10^n par 13.

3. Démontrer que pour tout entier naturel n , $10^{3n+3} + 10^{3n}$ est divisible par 13.

CORRECTION

Exercice 1

1. Soit $u = 5n + 31$ et $v = 3n + 12$, en éliminant n entre u et v alors $3u - 5v = 3(5n + 31) - 5(3n + 12)$
 donc $3u - 5v = 93 - 60 = 33$
 a divise u et v donc a divise $3u - 5v$ donc a divise 33.

2. La décomposition en produit de facteurs premiers de 33 est $33 = 3 \times 11$ donc les diviseurs positifs de 33 sont 1 ; 3 ; 11 ; 33.
 $a \in \{ 1 ; 3 ; 11 ; 33 \}$

Si $a = 33$: en divisant n par 33, il existe k et r tels que $n = 33k + r$ avec $0 \leq r < 33$

alors $u = 165k + 5r + 31 = 33(5k + 1) + 5r - 2$

a divise u donc $5r - 2$ est divisible par 33

$5r - 2 \equiv 0 \pmod{33}$ donc $5r \equiv 2 \pmod{33}$ $5 \times 13r \equiv 2 \times 13 \pmod{33}$ $-r \equiv 26 \pmod{33}$ or $26 = 33 - 7$ donc $-r \equiv -7 \pmod{33}$

$r \equiv 7 \pmod{33}$ or $0 \leq r < 33$ donc $r = 7$ et $n = 33k + 7$

$v = 3n + 12 = 3 \times (33k + 7) + 12 = 33 \times 3k + 33 = 33(3k + 1)$

Donc si $n = 33$ alors $n = 33k + 7$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Si $a = 11$: en divisant n par 11, il existe k et r tels que $n = 11k + r$ avec $0 \leq r < 11$

alors $u = 55k + 5r + 31 = 11(5k + 3) + 5r - 2$ or $0 \leq r < 11$

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$5r - 2$	-2	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48

$5r - 2$ est divisible par 7 uniquement si $r = 7$ donc $n = 11k + 7$

alors $v = 3n + 12 = 33k + 21 + 12 = 33(k + 1)$ donc pour tout k , 11 divise v

Si $a = 3$: en divisant n par 3, il existe k et r tels que $n = 3k + r$ avec $0 \leq r < 3$

alors $u = 15k + 5r + 31 = 15(k + 2) + 5r + 1$; 3 divise 15 et 3 divise u donc 3 divise $5r + 1$ ce qui n'est possible que pour $r = 1$ donc $n = 3k + 1$ avec $k \in \mathbb{N}$.

$v = 3n + 12 = 3(n + 4)$ donc 3 divise v pour toute valeur de n .

Si $a = 1$: dans tous les autres cas donc pour $n = 33k ; 33k + 2 ; 33k + 3 ; 33k + 5 ; 33k + 6 ; ; 33k + 8 ; 33k + 9 ; 33k + 11 ; 33k + 12 ; 33k + 14 ; 33k + 15 ; 33k + 17 ; 33k + 20 ; 33k + 21 ; 33k + 23 ; 33k + 24 ; 33k + 26 ; 33k + 27 ; 33k + 30 ; 33k + 32$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 2

Si le quotient $\frac{5n+3}{n+2}$ est un entier alors $n+2$ divise $5n+3$ or $5n+3 = 5 \times (n+2) - 7$ donc $n+2$ divise 7

Les diviseurs de 7 sont $-7 ; -1 ; 1 ; 7$ donc

$n+2$	-7	-1	1	7
n	-9	-3	-1	5

n est un entier naturel donc $n = 5$

Exercice 3

1. $(a^2 + 2b^2)^2 = (a^2)^2 + 2 \times a^2 \times (2b^2) + (2b^2)^2 = a^4 + 4b^4 + 4a^2b^2$

2. $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2)^2 - 4a^2b^2 = [a^2 + 2b^2 - 2ab][a^2 + 2b^2 + 2ab]$

$a^4 + 4b^4 = [(a-b)^2 + b^2][(a+b)^2 + b^2]$

$(a-b)^2 + b^2$ est un entier naturel donc $(a+b)^2 + b^2$ est un diviseur de $a^4 + 4b^4$.

$a \geq 2$ et $b \geq 2$ donc $(a-b)^2 + b^2 \geq b^2 \geq 4$ donc $(a-b)^2 + b^2 \neq 1$ donc $(a+b)^2 + b^2 \neq a^4 + 4b^4$.

$(a+b)^2 + b^2 \geq b^2 \geq 4$ donc $(a+b)^2 + b^2 \neq 1$

$(a+b)^2 + b^2$ est un diviseur de $a^4 + 4b^4$ distinct de 1 et de $a^4 + 4b^4$ donc $a^4 + 4b^4$ n'est jamais un nombre premier.

Exercice 4

Le reste de la division euclidienne de l'entier naturel a par 45 est 9, donc il existe un entier q tel que $a = 45q + 9$

$a = 15 \times (3q) + 9$; $3q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq 9 < 15$ donc le reste de la division euclidienne de a par 15 est 9

$a = 9 \times (5q + 1)$; $5q + 1 \in \mathbb{Z}$ donc le reste de la division euclidienne de a par 9 est 0

$a = 5 \times (9q) + 5 + 4 = 5(9q + 1) + 4$; $9q + 1 \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq 4 < 5$ donc le reste de la division euclidienne de a par 5 est 4

$a = 3 \times (15q) + 9 = 3(15q + 3)$; $15q + 3 \in \mathbb{Z}$ donc le reste de la division euclidienne de a par 3 est 4

Exercice 5

1. Les divisions euclidiennes de l'entier naturel a par 155 et par 161 donnent le même quotient q et des restes égaux respectivement à 65 et 23 donc $a = 155q + 65$ et $a = 161q + 23$ donc $155q + 65 = 161q + 23$ donc $65 - 23 = 161q - 155q$ donc $6q = 42$ donc $q = 7$
 $a = 155 \times 7 + 65 = 1150$
2. Dans la division euclidienne d'un entier n par 4, il existe un entier q et un entier r tels que $a = 4q + r$ et $0 \leq r < 4$ donc $a = 4k$ ou $4k + 1$ ou $4k + 2$ ou $4k + 3$ or $4k$ et $4k + 2$ sont pairs (somme de deux entiers pairs) et $4k + 1$ et $4k + 3$ sont impairs.
 a est impair donc $a = 4k + 1$ ou $4k + 3$ donc les restes possibles dans la division euclidienne d'un entier naturel impair par 4 sont 1 et 3

Exercice 6

1. $1000 = 13 \times 77 - 1$ donc $1000 \equiv -1 [13]$.
 $10^3 \equiv -1 [13]$ donc $10^6 \equiv (-1)^2 [13]$ soit $10^6 \equiv 1 [13]$;
Il existe un entier q tel que $10^6 = 13q + 1$ et $0 \leq 1 < 13$ donc le reste de la division de 10^6 par 13 est 1
2. Soit n un entier naturel quelconque, dans la division euclidienne de n par 6, il existe un entier k et un entier r tels que $n = 6k + r$ avec $0 \leq r < 6$ donc n est de la forme $6k$; $6k + 1$... $6k + 5$ où k est un entier naturel.
 $10^6 \equiv 1 [13]$ donc $10^{6k} \equiv 1^k [13]$ soit $10^{6k} \equiv 1 [13]$
 $10 \times 10^{6k} = 10^{6k+1}$ donc $10^{6k+1} \equiv 10 [13]$
 $10 \times 10^{6k+1} = 10^{6k+2}$ donc $10^{6k+2} \equiv 10 \times 10 [13]$ or $100 = 7 \times 13 + 9$ donc $10^{6k+2} \equiv 9 [13]$
 $10 \times 10^{6k+2} = 10^{6k+3}$ donc $10^{6k+3} \equiv 10 \times 9 [13]$ or $90 = 6 \times 13 + 12$ donc $10^{6k+3} \equiv 12 [13]$
 $10 \times 10^{6k+3} = 10^{6k+4}$ donc $10^{6k+4} \equiv 10 \times 12 [13]$ or $120 = 9 \times 13 + 3$ donc $10^{6k+4} \equiv 3 [13]$
 $10 \times 10^{6k+4} = 10^{6k+5}$ donc $10^{6k+5} \equiv 10 \times 3 [13]$ or $30 = 2 \times 13 + 4$ donc $10^{6k+5} \equiv 4 [13]$
donc les valeurs possibles du reste r de la division de 10^n par 13 sont :
si $n = 6k$ $r = 1$
si $n = 6k + 1$ $r = 10$
si $n = 6k + 2$ $r = 9$
si $n = 6k + 3$ $r = 12$
si $n = 6k + 4$ $r = 3$
si $n = 6k + 5$ $r = 4$
3. Pour tout entier naturel n , $10^{3n+3} + 10^{3n} = 10^{3n} \times 10^3 + 10^{3n} = 10^{3n} \times 1001$
or $1001 = 13 \times 77$ donc 1001 est divisible par 13 donc pour tout entier naturel n , $10^{3n+3} + 10^{3n}$ est divisible par 13
On pouvait aussi dire que $10^3 \equiv -1 [13]$ donc $10^{3n} \times 10^3 \equiv -10^{3n} [13]$ donc $10^{3n+3} + 10^{3n} \equiv 0 [13]$

Exercice 1

Partie A

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 + 3x^2 + 1$

1. Étudier la fonction g sur $\mathbb{R}$, préciser les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$. Dresser le tableau de variation de g .
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$. Donner un encadrement de α à 10^{-2} près.
3. Préciser le signe de $g(x)$.

Partie B

Soit f la fonction définie, pour tout réel x différent de 1, par : $f(x) = \frac{x+1}{x^3-1}$

On désigne par C sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Montrer que $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ en déduire les limites de f en 1.

On admet que, pour tout réel x différent de 1, $f'(x) = \frac{-2x^3 - 3x^2 - 1}{(x^3 - 1)^2}$

3. En utilisant les questions précédentes, déterminer les variations de la fonction f sur les intervalles où elle est définie.
4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe C au point $A(0; -1)$.
5. Montrer que $f(x) - (-x - 1)$ a le même signe que $\frac{x(x+1)}{x-1}$. En déduire la position de C par rapport à la droite T .

Exercice 2

Partie A

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$. Déterminer un encadrement de $f(x)$, en déduire la limite en $+\infty$ et $-\infty$ de f .

Partie B

On souhaite démontrer l'inégalité suivante: pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$

On considère alors la fonction f définie par : $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

1. Déterminer f' et f'' , les dérivée et dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
2. Montrer que la fonction f' est strictement décroissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Dresser son tableau de variations.
3. Montrer qu'il existe un unique réel a de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $f'(a) = 0$.

Vérifier que $0,880 < a < 0,881$. En déduire le signe de la fonction f' sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

4. Déduire de ce qui précède les variations de la fonction f que l'on résumera dans un tableau.
5. Démontrer alors que pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, on a la minoration suivante: $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$
6. Sur le graphique suivant est représenté sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ la sinusoïde associée à la fonction sinus.

Représenter la droite d'équation $y = \frac{2}{\pi}x$. Faire une interprétation graphique de ce résultat.

CORRECTION

Exercice 1

Partie A

1. g est un polynôme donc sa limite à l'infini est la même que celle de son terme de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty \text{ et}$$

$g'(x) = 6x^2 + 6x = 6x(x+1)$; $g'(x)$ est un polynôme du second degré qui s'annule en 0 et -1 donc :

x	$-\infty$	α	-1	0	$+\infty$
$g'(x)$		+	0	-	+
g	$-\infty$	0	2	1	$+\infty$

2. g est définie continue strictement croissante sur $] -\infty ; -1]$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $g(-1) = 2$ donc 0 est compris entre $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $g(-1)$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α sur $] -\infty ; -1]$.

g est décroissante sur $[-1 ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$ donc admet un minimum en 0 et pour tout x de $[-1 ; +\infty[$, $g(x) \geq 1$ donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution sur $[-1 ; +\infty[$.

L'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$.

$$g(-1,67) \approx 0,051774 \text{ et } g(-1,68) \approx -0,016064 \text{ donc } -1,68 \leq \alpha \leq -1,67$$

3. g est strictement croissante sur $] -\infty ; -1]$ et $g(\alpha) = 0$ donc si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$; si $\alpha < x < -1$ alors $g(x) > 0$ pour tout x de $[-1 ; +\infty[$, $g(x) \geq 1$ donc $g(x) > 0$ d'où le tableau de signes.

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$		-	+

Partie B

1. f est une fraction rationnelle donc sa limite à l'infini est la même que celle du quotient de ses termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2. (x-1)(x^2+x+1) = x^3 + x^2 + x - x^2 - x - 1 = x^3 - 1$$

$$f(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x+1}{x^2+x+1} \times \frac{1}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{2}{3} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

$$3. f'(x) = \frac{-2x^3 - 3x^2 - 1}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-g(x)}{(x^3 - 1)^2} \text{ donc } f'(x) \text{ a le même signe que } -g(x)$$

x	$-\infty$	α	1	$+\infty$
$g(x)$		-	+	+
$f'(x)$		+	-	-
f	0	$f(\alpha)$	$-\infty$	0

4. La tangente T à la courbe C au point A(0 ; -1) est la droite de coefficient directeur $f'(0) = -1$ qui passe par A on a pour équation $y = -x + b$ et $y_A = x_A + b$ donc $-1 = 0 + b$ donc l'équation de T est $y = -x - 1$.

$$f(x) - (-x - 1) = \frac{x+1}{x^3-1} - (-x-1) = \frac{x+1}{x^3-1} + (x+1) = (x+1) \left(\frac{1}{x^3-1} + 1 \right) = (x+1) \frac{x^3-1+1}{x^3-1} = (x+1) \frac{x^3}{x^3-1}$$

$x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$ or $x^2+x+1 = 0$ n'a pas de solution sur $\mathbb{R}$ ($\Delta = -3$) donc $x^2+x+1 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

donc $x^3 - 1$ a le même signe sur $\mathbb{R}$ que $x - 1$

$$f(x) - (x-1) \text{ a le même signe que } \frac{x(x+1)}{x-1}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
x		-	0	+	+
$x+1$		0	+	+	+
$x-1$		-	-	-	+
$\frac{x(x+1)}{x-1}$		0	+	-	+

La tangente T est en dessous de la courbe C sur $] -\infty ; -1]$ et sur $] 0 ; 1]$; au dessus de la courbe C sur $]-1 ; 0[$ et sur $] 1 ; +\infty[$; coupe la courbe aux points d'abscisse -1 et 0.

Exercice 1 (graphique non demandé)

Exercice 2

Exercice 2

Partie A

Pour tout x réel, $-1 \leq \sin x \leq 1$ donc $-1 - \frac{2}{\pi} x \leq f(x) \leq 1 - \frac{2}{\pi} x$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} -1 - \frac{2}{\pi} x = +\infty$ donc d'après le théorème de comparaison $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{2}{\pi} x = -\infty$ donc d'après le théorème de comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

Partie B

1. $f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$ et $f''(x) = -\sin x$

2. Pour tout x de $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin x > 0$ donc $f''(x) < 0$ et $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ donc la fonction f' est strictement décroissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

x	0	α	$\frac{\pi}{2}$
$f''(x)$		-	0
f'	$1 - \frac{2}{\pi}$	0	$-\frac{2}{\pi}$

3. f' est définie continue strictement décroissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$; $f'(0) = 1 - \frac{2}{\pi}$ donc $f'(0) > 0$ et $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}$ donc $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ donc 0 est compris entre $f'(0)$ et $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ donc l'équation $f'(x) = 0$ admet une seule solution a sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

$f'(0,880) \approx 0,0005$ et $f'(0,881) \approx -0,0002$ donc $0,880 < a < 0,881$.

x	0	α	$\frac{\pi}{2}$
f'	$1 - \frac{2}{\pi}$	0	$-\frac{2}{\pi}$
$f''(x)$	+	0	-

4.

x	0	α	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$f(\alpha)$	0

5. Pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $f(x) \geq 0$ donc $\sin x - \frac{2}{\pi} x \geq 0$ donc $\sin x \geq \frac{2}{\pi} x$

6. La droite d'équation $y = \frac{2}{\pi} x$ passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées $\left(\frac{\pi}{2}; 1\right)$ d'où le tracé. Le calcul précédent permet d'affirmer que la sinusoïde est au dessus de la droite sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

EXERCICE 1

Démontrer que si n est un entier naturel impair, alors $n^2 - 1$ est divisible par 8.

EXERCICE 2

Trouvez tous les entiers naturels n tels que $n + 8$ est un multiple de n .

EXERCICE 3

Expliquez pourquoi il est impossible de trouver u et v dans $\mathbb{Z}$ tels que $6u - 9v = 2$.

EXERCICE 4

p est un nombre premier différent de 2.

Montrer que $x^2 - y^2 = p$ admet un seul couple de solution dans $\mathbb{N}$.

EXERCICE 5

Déterminer tous les entiers naturels qui divisés par 11 donnent un quotient égal au double du reste.

EXERCICE 6

Soit n un entier naturel. Soit $a = 18n + 60$ et $b = 15n + 26$

Soit d un diviseur commun à a et b .

- Démontrer que d divise 144.
- Démontrer que si d est pair alors n est pair.

CORRECTION**EXERCICE 1****Méthode 1**

si n est un entier naturel impair, il existe un entier naturel p tel que $n = 2p + 1$
 donc $n^2 - 1 = (2p + 1)^2 - 1 = 4p^2 + 4p = 4p(p + 1)$
 p et $p + 1$ sont deux nombres entiers consécutifs donc l'un d'eux est pair donc $p(p + 1)$ est pair donc $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Méthode 2

n est un entier impair donc n est congru modulo 8 à

n	1	3	5	7
n^2	1	9	25	49
$n^2 - 1$	0	8	24	48

comme 8 divise 8 ; 24 ; 48 dans tous les cas $n^2 - 1 \equiv 0 [8]$
 $n^2 - 1$ est divisible par 8

EXERCICE 2

Si $n + 8$ est un multiple de n , n divise $n + 8$ donc n divise $(n + 8) - n$ donc n divise 8 donc $n \in \{1 ; 2 ; 4 ; 8\}$

EXERCICE 3

$6u - 9v = 3(2u - 3v)$ donc 3 divise $6u - 9v$ or 2 est un nombre premier donc n'est divisible que par 1 ou 2 donc 3 ne divise pas 2 donc il est impossible de trouver u et v dans $\mathbb{Z}$ tels que $6u - 9v = 2$.

EXERCICE 4

p est un nombre premier différent de 2.

$x^2 - y^2 = p \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = p$ donc $x + y$ divise p donc soit $x + y = p$ soit $x + y = 1$

x et y sont des entiers naturels donc $x + y \geq x - y$ donc $x + y = p$ et $x - y = 1$ donc $2x = p + 1$

p est un nombre premier différent de 2 donc p est impair donc $p + 1$ est pair donc $x = \frac{p+1}{2}$ et $y = \frac{p-1}{2}$

$x^2 - y^2 = p$ admet un seul couple de solution dans $\mathbb{N}$.

EXERCICE 5

$N = 11q + r$ avec $0 \leq r < 11$ or $q = 2r$ donc $N = 22r + r = 23r$ avec $0 \leq r < 11$

$N \in \{0 ; 23 ; 46 ; 69 ; 92 ; 115 ; 138 ; 161 ; 184 ; 207 ; 230 ; 253\}$

EXERCICE 6

1. d divise $5a - 6b = 5(18n + 60) - 6(15n + 26) = 144$

d est un diviseur commun à a et b donc d divise $5a - 6b$ donc d divise 144.

2. Si d est pair alors $\begin{cases} 2 \text{ divise } d \\ d \text{ divise } a \text{ et } b \end{cases}$ donc 2 divise a et b

or $b = 2(7n + 13) + n$

2 divise b donc 2 divise $b - 2(7n + 13)$ donc 2 divise n donc n est pair

Exercice 1

1. Soit les polynômes $P(x) = x^3 - x^2 - 12x$ et $Q(x) = 2x^2 - 7x - 4$.
Factoriser P et Q.

On définit pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5 les entiers : $A = n^3 - n^2 - 12n$ et $B = 2n^2 - 7n - 4$

2. Démontrer que A et B sont divisibles par $n - 4$
3. On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$.
- Soit d un diviseur commun à α et β , montrer que d divise 5
 - Montrer que si $n - 2$ est multiple de 5 alors α et β sont multiples de 5.
 - Montrer que si 5 divise α et β alors 5 divise $n - 2$.
 - Etablir que le seul diviseur positif commun à n et $2n + 1$ est 1.

Exercice 2

Pour tout entier naturel n , on pose : $a = 9n + 4$ $b = 2n - 1$

- Soit d un diviseur commun à a et b , montrer d divise 17
- Démontrer que si 17 est un diviseur commun à a et à b alors le reste de la division euclidienne de n par 17 est 9.
(On pourra remarquer que $a - 4b - 17 = n - 9$)
- Démontrer que si le reste de la division euclidienne de n par 17 est 9 alors 17 est un diviseur commun à a et b .

Exercice 3

Soit p un nombre premier différent de 2 et de 3,

- montrer que $p^2 - 1$ est divisible par 8.
- Montrer que p est de la forme $3k + 1$ ou $3k + 2$ en déduire que 3 divise $p^2 - 1$.

Exercice 4

- Montrer que si n est un nombre impair alors n^2 est impair et si n est pair alors n^2 est pair.

Il s'en suit donc que pour tout n de $\mathbb{N}$, n et n^2 ont la même parité.

Soit E l'ensemble des couples $(p ; q)$ où p et q désignent deux entiers naturels tels que : $p^2 - 2q^2 = 1$.

- Vérifier que $(3 ; 2)$ appartient à E.
- Soit un couple $(p ; q)$ de E,
 - Démontrer que p est impair.
 - Démontrer que q est pair.

CORRECTION

Exercice 1

1. $P(x) = x^3 - x^2 - 12x = x(x^2 - x - 12)$

Réolvons $x^2 - x - 12 = 0$,

$\Delta = 49$ donc $x_1 = 4$ et $x_2 = -3$ donc $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$ donc $P(x) = x(x - 4)(x + 3)$

$Q(x) = 2x^2 - 7x - 4$.

Réolvons $2x^2 - 7x - 4 = 0$;

$\Delta = 81$ donc $x_1 = 4$ et $x_2 = -\frac{1}{2}$ donc $Q(x) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 4) = (2x + 1)(x - 4)$

2. $A = n(n - 4)(n + 3)$; $n \geq 5$ donc $n - 4 \geq 1$ de plus $n(n + 3)$ est un entier naturel donc $n - 4$ divise A .

$B = (2n + 1)(n - 4)$ or $n - 4 \geq 1$ de plus $(2n + 1)$ est un entier naturel donc $n - 4$ divise B .

3. a. $-\alpha + 2\beta = -2n - 1 + 2(n + 3) = 5$. Si d est un diviseur commun à α et β , d divise $-\alpha + 2\beta$ donc d divise 5.

b. si $n - 2$ est multiple de 5 alors il existe un entier k tel que $n - 2 = 5k$

donc $2n + 1 = 2(5k + 2) + 1 = 10k + 5$ soit $2n + 1 = 5(2k + 1)$ or $2k + 1$ est un entier naturel donc 5 divise $2n + 1$

et $n + 3 = 5k + 2 + 3$ soit $n + 3 = 5(k + 1)$ donc 5 divise β donc 5 divise α et β .

c. si 5 divise α et β alors 5 divise $\alpha - \beta$ or $\alpha - \beta = n - 2$ donc 5 divise $n - 2$.

d. Si d divise n et $2n + 1$ alors d divise $(2n + 1) - 2 \times n$ donc d divise 1 ; $d > 0$ donc $d = 1$.

Exercice 2

a. Soit d un diviseur commun à a et b , d divise $2a - 9b$ or $2a - 9b = 17$ donc d divise 17.

b. si 17 est un diviseur commun à a et b alors 17 divise $a - 4b - 17$ donc 17 divise $n - 9$ donc il existe un entier naturel q tel que $n - 9 = 17q$ donc $n = 17q + 9$, $0 \leq q < 17$ donc le reste de la division euclidienne de n par 17 est 9.

c. Si le reste de la division euclidienne de n par 17 est 9 alors il existe un entier naturel q tel que $n = 17q + 9$

donc $a = 9 \times (17q + 9) + 4$ donc $a = 17 \times 9q + 85$ soit $a = 17(9q + 5)$ donc 17 divise a

$b = 2(17q + 9) - 1 = 17(2q + 1)$ donc 17 divise b

17 est un diviseur commun à a et b .

Exercice 3

Soit p un nombre premier différent de 2 et de 3,

1. p est un nombre premier différent de 2 donc p est impair, il existe un entier k tel que $p = 2k + 1$

$p^2 - 1 = 4k(k + 1)$ or k et $k + 1$ sont deux entiers consécutifs donc l'un d'eux est pair donc il existe un entier q tel que $k(k + 1) = 2q$

$p^2 - 1 = 8q$ donc $p^2 - 1$ est divisible par 8.

2. Dans la division euclidienne de p par 3, il existe deux entiers k et r tels que $p = 3k + r$ avec $0 \leq r < 3$

si $r = 0$ alors 3 divise p ce qui est exclu car p est un nombre premier différent de 3 donc $p = 3k + 1$ ou $p = 3k + 2$

$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$

si $p = 3k + 1$ alors $p - 1 = 3k$ donc 3 divise $p - 1$ donc 3 divise $p^2 - 1$

si $p = 3k + 2$ alors $p + 1 = 3k + 3$ donc 3 divise $p + 1$ donc 3 divise $p^2 - 1$ dans tous les cas 3 divise $p^2 - 1$.

Exercice 4

1. si n est impair alors $n = 2k + 1$ donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ donc n^2 est impair

si n est pair alors $n = 2k$ donc $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ donc n^2 est pair

2. $p = 3$ et $q = 2$ donc $p^2 - 2q^2 = 3^2 - 2 \times 2^2 = 9 - 8 = 1$ donc $(3 ; 2)$ appartient à E .

3. $(p ; q)$ est un couple de E , donc $p^2 - 2q^2 = 1$

a. $p^2 = 2q^2 + 1$ donc p^2 est impair donc p est impair

b. p est impair donc $p = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{N}$) donc $p^2 = 4k^2 + 4k + 1$ donc $4k^2 + 4k + 1 - 2q^2 = 1$

$2q^2 = 4k^2 + 4k$ donc $q^2 = 2(k^2 + k)$ donc q^2 est pair donc q est pair.

Exercice 1

1. Soit les polynômes $P(x) = x^3 - 2x^2 - 8x$ et $Q(x) = 3x^2 - 11x - 4$.
Factoriser P et Q.

On définit pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5 les entiers : $A = n^3 - 2n^2 - 8n$ et $B = 2n^2 - 7n - 4$

2. Démontrer que A et B sont divisibles par $n - 4$.
3. On pose $\alpha = 3n + 1$ et $\beta = n + 2$.
a. Soit d un diviseur commun à α et β , montrer que d divise 5
b. Montrer que si $n - 3$ est multiple de 5 alors α et β sont multiples de 5.
c. Montrer que si 5 divise α et β alors 5 divise $n - 3$.
d. Etablir que le seul diviseur positif commun à n et $3n + 1$ est 1.

Exercice 2

Pour tout entier naturel n , on pose : $a = 2n + 3$ $b = 7n - 1$

- a. Soit d un diviseur commun à a et b , montrer d divise 23
b. Démontrer que si 23 est un diviseur commun à a et à b alors le reste de la division euclidienne de n par 23 est 10. (On pourra remarquer que $4a - b - 23 = n - 10$)
c. Démontrer que si le reste de la division euclidienne de n par 23 est 10 alors 23 est un diviseur commun à a et b .

Exercice 3

Soit p un nombre premier différent de 2 et de 3,

1. montrer que $p^2 - 1$ est divisible par 8.
2. Montrer que p est de la forme $3k + 1$ ou $3k + 2$ en déduire que 3 divise $p^2 - 1$.

Exercice 4

1. a. Montrer que, si l'entier n est pair, alors le reste de la division euclidienne de n^2 par 8 est soit 0 soit 4.
b. Montrer que, si l'entier n est impair, alors le reste de la division euclidienne de n^2 par 8 est 1.
2. Soit l'équation (E) : $8x + 1 = y^2$
a. Montrer que si $(x ; y)$ est solution de cette équation, y est impair.
b. En déduire que pour tout y impair, il existe un entier x solution de (E). (On pourra utiliser les résultats de la question 1.)

CORRECTION

Exercice 1

1. $P(x) = x^3 - 2x^2 - 8x = x(x^2 - 2x - 8)$

Réolvons $x^2 - 2x - 8 = 0$,

$\Delta = 36$ donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 4$ donc $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$ donc $P(x) = x(x - 4)(x + 2)$

$Q(x) = 3x^2 - 11x - 4$.

Réolvons $3x^2 - 11x - 4 = 0$;

$\Delta = 169$ donc $x_1 = 4$ et $x_2 = -\frac{1}{3}$ donc $Q(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 4) = (3x + 1)(x - 4)$

2. $A = n(n - 4)(n + 2)$; $n \geq 5$ donc $n - 4 \geq 1$ donc $n - 4$ est non nul, de plus $n(n + 2)$ est un entier naturel donc $n - 4$ divise A .
 $B = (3n + 1)(n - 4)$ or $n - 4 \geq 1$ de plus $(2n + 1)$ est un entier naturel donc $n - 4$ divise B .

3. a. $-\alpha + 3\beta = -3n - 1 + 3(n + 2) = 5$. Si d est un diviseur commun à α et β , d divise $-\alpha + 3\beta$ donc d divise 5.

b. si $n - 3$ est multiple de 5 alors il existe un entier k tel que $n - 3 = 5k$

donc $3n + 1 = 3(5k + 3) + 1 = 15k + 10$ soit $3n + 1 = 5(3k + 2)$ or $3k + 2$ est un entier naturel donc 5 divise $3n + 1$ et $n + 2 = 5k + 3 + 2$ soit $n + 2 = 5(k + 1)$ donc 5 divise β donc 5 divise α et β .

c. si 5 divise α et β alors 5 divise $\alpha - 2\beta$ or $\alpha - 2\beta = n - 3$ donc 5 divise $n - 3$.

d. Si d divise n et $3n + 1$ alors d divise $(3n + 1) - 3 \times n$ donc d divise 1 ; $d > 0$ donc $d = 1$.

Exercice 2

a. Soit d un diviseur commun à a et b , d divise $7a - 2b$ or $7a - 2b = 23$ donc d divise 23.

b. si 23 est un diviseur commun à a et à b alors 23 divise $4a - b - 23$ donc 23 divise $n - 10$ donc il existe un entier naturel q tel que $n - 10 = 23q$ donc $n = 23q + 10$, $0 \leq 10 < 23$ donc le reste de la division euclidienne de n par 23 est 10.

c. Si le reste de la division euclidienne de n par 23 est 10 alors il existe un entier naturel q tel que $n = 23q + 10$

donc $a = 2 \times (23q + 10) + 3$ donc $a = 23 \times 2q + 23$ soit $a = 23(2q + 1)$ donc 23 divise a

$b = 7(23q + 10) - 1 = 23(7q + 3)$ donc 23 divise b

23 est un diviseur commun à a et b .

Exercice 3

Soit p un nombre premier différent de 2 et de 3,

1. p est un nombre premier différent de 2 donc p est impair, il existe un entier k tel que $p = 2k + 1$

$p^2 - 1 = 4k(k + 1)$ or k et $k + 1$ sont deux entiers consécutifs donc l'un d'eux est pair donc il existe un entier q tel que $k(k + 1) = 2q$

$p^2 - 1 = 8q$ donc $p^2 - 1$ est divisible par 8.

2. Dans la division euclidienne de p par 3, il existe deux entiers k et r tels que $p = 3k + r$ avec $0 \leq r < 3$

si $r = 0$ alors 3 divise p ce qui est exclu car p est un nombre premier différent de 3 donc $p = 3k + 1$ ou $p = 3k + 2$

$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$

si $p = 3k + 1$ alors $p - 1 = 3k$ donc 3 divise $p - 1$ donc 3 divise $p^2 - 1$

si $p = 3k + 2$ alors $p + 1 = 3k + 3$ donc 3 divise $p + 1$ donc 3 divise $p^2 - 1$ dans tous les cas 3 divise $p^2 - 1$.

Exercice 4

1. a. si n est pair alors il existe un entier k tel que $n = 2k$ donc $n^2 = 4k^2$

soit k est pair et $n = 4p$ donc $n^2 = 8 \times 2p^2$ donc le reste de la division euclidienne de n^2 par 8 est 0

soit k est impair et $n = 4p + 2$ donc $n^2 = 8 \times (2p^2 + 2p) + 4$ donc le reste de la division euclidienne de n^2 par 8 est 4

b. si n est impair alors il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$ donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$

k et $k + 1$ sont deux entiers consécutifs donc l'un d'eux est pair donc $k(k + 1)$ est pair, il existe un entier p tel que $k(k + 1) = 2p$

$n^2 = 8p + 1$ donc le reste de la division euclidienne de n^2 par 8 est 1.

2. a. si $(x ; y)$ est solution de cette équation alors $8x + 1 = y^2$, donc y^2 donc y est impair.

b. si y est impair, le reste de la division euclidienne de y^2 par 8 est 1 donc il existe un entier naturel p tel que $y^2 = 8p + 1$

Le nombre $y^2 - 1$ est divisible par 8, donc $x = p = \frac{y^2 - 1}{8}$ et x est entier naturel

Exercice 1

Partie 1

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = e^x - x e^x + 1.$$

- Déterminer la limite de g en $+\infty$.
- Étudier les variations de la fonction g .
- Donner le tableau de variations de g .
- a. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0; +\infty[$ une unique solution. On note α cette solution.
b. À l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .
- c. Démontrer que $e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$.
- Déterminer le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

Partie 2

Soit A la fonction définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ telle

$$\text{que } A(x) = \frac{4x}{e^x + 1}.$$

- Démontrer que pour tout réel x positif ou nul, $A'(x)$ a le même signe que $g(x)$, où g est la fonction définie dans la partie 1.
- En déduire les variations de la fonction A sur $]0; +\infty[$.

Partie 3

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{4}{e^x + 1}.$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La figure est donnée en annexe.

Pour tout réel x positif ou nul, on note :

M le point de (C) de coordonnées $(x; f(x))$,

P le point de coordonnées $(x; 0)$,

Q le point de coordonnées $(0; f(x))$.

- Démontrer que l'aire du rectangle $OPMQ$ est maximale lorsque M a pour abscisse α . On rappelle que le réel α a été défini dans la partie 1.

- Le point M a pour abscisse α . La tangente (T) en M à la courbe (C) est-elle parallèle à la droite (PQ) ?

Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Exercice 2

On considère les deux courbes (C_1) et (C_2) d'équations respectives $y = e^x$ et $y = -x^2 - 1$ dans un repère orthogonal du plan.

Le but de cet exercice est de prouver qu'il existe une unique tangente (T) commune à ces deux courbes.

- Sur le graphique représenté dans l'annexe 1, tracer approximativement une telle tangente à l'aide d'une règle.

Lire graphiquement l'abscisse du point de contact de cette tangente avec la courbe (C_1) et l'abscisse du point de contact de cette tangente avec la courbe (C_2) .

- On désigne par a et b deux réels quelconques, par A le point d'abscisse a de la courbe (C_1) et par B le point d'abscisse b de la courbe (C_2) .

a. Déterminer une équation de la tangente (T_A) à la courbe (C_1) au point A .

b. Déterminer une équation de la tangente (T_B) à la courbe (C_2) au point B .

c. En déduire que les droites (T_A) et (T_B) sont confondues si et seulement si les réels a et b sont solutions

$$\text{du système (S) : } \begin{cases} e^a = -2b \\ e^a - a e^a = b^2 - 1 \end{cases}$$

- Montrer que le système (S) est équivalent au

$$\text{système (S') : } \begin{cases} e^a = -2b \\ e^{2a} + 4a e^a - 4e^a - 4 = 0 \end{cases}$$

- Le but de cette question est de prouver qu'il existe un unique réel solution de l'équation (E)

$$e^{2x} + 4x e^x - 4e^x - 4 = 0$$

Pour cela, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{2x} + 4x e^x - 4e^x - 4$$

- Montrer que pour tout x appartenant à $] -\infty; 0[$, $e^{2x} - 4 < 0$ et $4e^x(x-1) < 0$

- En déduire que l'équation (E) n'a pas de solution dans l'intervalle $] -\infty; 0[$.

c. Démontrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

d. Démontrer que l'équation (E) admet une solution unique, dans l'intervalle $]0; +\infty[$. On note α cette solution. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .

- On prend pour A le point d'abscisse α . Déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-1} du réel b pour lequel les droites (T_A) et (T_B) sont confondues.

CORRECTION

Partie 1

1. $g(x) = e^x(1-x) + 1$ or $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1-x = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

2. $g(x) = e^x(1-x) + 1$, soit $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1-x$ alors $u'(x) = e^x$ et $v'(x) = -1$ donc :
 $g'(x) = e^x(1-x) - 1 \times e^x = e^x[1-x-1]$ soit $g'(x) = -x e^x$.

3. La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$ donc $g'(x)$ a le même signe que $-x$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	0	-
g	2	$-\infty$

4. a. La fonction g est définie continue strictement décroissante sur $[0; +\infty[$, $g([0; +\infty[) =]-\infty; 2]$ et $0 \in]-\infty; 2]$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet sur $[0; +\infty[$ une unique solution.

b. $g(1,27) \approx 0,038$ et $g(1,28) \approx -0,007$ donc $1,27 \leq \alpha \leq 1,28$

c. α est solution de $g(x) = 0$ donc $e^\alpha(1-\alpha) + 1 = 0$ soit $e^\alpha(1-\alpha) = -1$ donc $e^\alpha(\alpha-1) = 1$, $\alpha \neq 1$ donc $e^\alpha = \frac{1}{\alpha-1}$

5. g est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$ et $g(\alpha) = 0$ donc si $0 \leq x < \alpha$ alors $g(x) > 0$, $g(\alpha) = 0$ et si $x > \alpha$ alors $g(x) < 0$.

Partie 2

1. $A'(x) = \frac{4(e^x+1) - 4xe^x}{(e^x+1)^2} = \frac{4[e^x+1-xe^x]}{(e^x+1)^2} = \frac{4g(x)}{(e^x+1)^2}$

$(e^x+1)^2 > 0$ donc pour tout réel x positif ou nul, $A'(x)$ a le même signe que $g(x)$.

2.

x	0	α	$+\infty$
$A'(x)$	0	+	-
g	0	$A(\alpha)$

Partie 3

1. l'aire du rectangle $OPMQ$ est égale à $xf(x) = A(x)$ donc l'aire du rectangle $OPMQ$ est maximale lorsque M a pour abscisse α .

2. Le coefficient directeur de la droite (PQ) est $\frac{y_P - y_Q}{x_P - x_Q} = \frac{-f(\alpha)}{\alpha} = -\frac{1}{\alpha(e^\alpha+1)}$

La tangente en M à la courbe (C) a pour coefficient directeur $f'(\alpha) = -\frac{e^\alpha}{(e^\alpha+1)^2}$ or $e^\alpha = \frac{1}{\alpha-1}$ donc $e^\alpha+1 = \frac{1}{\alpha-1} + 1 = \frac{\alpha}{\alpha-1}$

donc $\frac{e^\alpha}{e^\alpha+1} = \frac{1}{\alpha-1} \times \frac{\alpha-1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}$ donc $f'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha(e^\alpha+1)}$ donc la tangente en M et la droite (PQ) sont parallèles.

Exercice 2

1.

l'abscisse du point de contact A de la tangente avec la courbe (C_1) est approximativement 0,9

l'abscisse du point de contact B de la tangente avec la courbe (C_2) est approximativement -1,2.

2. a) La tangente à la courbe (C_1) au point A est la droite de coefficient directeur $f'(a) = e^a$ passant par A $(a; e^a)$ donc une équation de la tangente (T_A) à la courbe (C_1) au point A est $y = e^a(x - a) + e^a$

b) La tangente à la courbe (C_2) au point B est la droite de coefficient directeur $g'(b) = -2b$ passant par B $(b; -b^2 - 1)$
Une équation de la tangente (T_B) à la courbe (C_2) au point B est $y = -2bx + b^2 - 1$

c) Les droites (T_A) et (T_B) sont confondues si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux ($e^a = -2b$) et leurs ordonnées à l'origine sont égales ($-ae^a + e^a = b^2 - 1$) soit les réels a et b sont solutions du système (S) :
$$\begin{cases} e^a = -2b \\ e^a - ae^a = b^2 - 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} d) \quad & \begin{cases} e^a = -2b \\ e^a - ae^a = b^2 - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2b = -e^a \\ 4e^a - 4ae^a = 4b^2 - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^a = -2b \\ 4e^a - 4ae^a = 4(e^a)^2 - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^a = -2b \\ 4e^a - 4ae^a = 4e^{2a} - 4 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} e^a = -2b \\ e^{2a} + 4ae^a - 4e^a - 4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

3. a) pour tout x appartenant à $] -\infty; 0 [$, $2x \leq 0$ donc $e^{2x} \leq e^0$ soit $e^{2x} \leq 1$ donc $e^{2x} - 4 \leq -3 < 0$

pour tout x appartenant à $] -\infty; 0 [$, $4 > 0$; $e^x > 0$ et $(x - 1) < 0$ donc $4e^x(x - 1) < 0$

b) $e^{2x} + 4xe^x - 4e^x - 4 = e^{2x} - 4 + 4e^x(x - 1)$

La somme de deux nombres strictement négatifs est un nombre strictement négatif donc pour tout x appartenant à $] -\infty; 0 [$, $f(x) < 0$
L'équation (E) n'a pas de solution dans l'intervalle $] -\infty; 0 [$.

c) $f'(x) = 2e^{2x} + 4(e^x + xe^x) - 4e^x$ donc $f'(x) = 2e^{2x} + 4xe^x = 2(x + 2)e^x$

La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, $x \geq 0$ donc $x + 2 > 0$ et $f'(x) > 0$

la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty [$.

$$d) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - 4 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 4e^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$f(0) = -7$$

f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$, (somme de fonctions continues sur $\mathbb{R}$) strictement croissante sur $[0; +\infty [$.

$$f([0; +\infty[) = [-7; +\infty[$$

$0 \in [-7; +\infty[$ donc l'équation (E) $f(x) = 0$ admet une solution unique, dans l'intervalle $[0; +\infty [$.

$f(0,84) \approx -0,117$ et $f(0,85) \approx 0,07$ donc $f(0,84) < 0$ et $f(0,85) > 0$ donc $0,84 \leq \alpha \leq 0,85$.

$$4. \quad b = -\frac{1}{2}e^a \text{ or } 0,84 \leq a \leq 0,85 \text{ donc } e^{0,84} \leq e^a \leq e^{0,85} \text{ donc } -\frac{1}{2}e^{0,85} \leq -\frac{1}{2}e^a \leq -\frac{1}{2}e^{0,84}$$

$$\text{soit } -1,2 \leq -\frac{1}{2}e^{0,85} \leq b \leq -\frac{1}{2}e^{0,84} \leq -1,1$$

EXERCICE 1

On divise 4373 et 826 par un même nombre entier ; les restes respectifs sont 8 et 7. Quel est ce diviseur ?

EXERCICE 2

Reconnaitre si 401 est un nombre premier et résoudre dans l'ensemble des entiers naturels l'équation : $x^2 - y^2 = 401$.

EXERCICE 3

1. Démontrer que pour tout entier n non multiple de 3 on a : $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
2. En déduire que quels que soient les entiers relatifs a et b , le nombre $a^2 - b^2$ est divisible par 3.

EXERCICE 4

En remarquant que : $999 = 27 \times 37$, démontrer que pour tout entier positif n on a : $10^{3n} \equiv 1 \pmod{37}$

En déduire le reste de la division par 37 du nombre $A = 10^{10} + 10^{20} + 10^{30}$.

EXERCICE 5

1. Déterminer, en utilisant les congruences, les restes de la division par 7 des nombres suivants : $3 ; 3^2 ; 3^3 ; 3^4 ; 3^5 ; 3^6 ; 3^7$.
2. Si p est un entier positif, démontrer que 3^p et 3^{p+6} ont le même reste dans la division par 7.
3. Quel que soit l'entier naturel n , démontrer que 2005^n et 3^n ont le même reste dans la division par 7. Déterminer n pour que ce reste soit 5.

EXERCICE 6

Dans la division euclidienne par 7, il y a 7 restes possibles. Un tableau peut aider à voir tous les cas.

1. Déterminer les entiers relatifs n tels que : $n^3 + 1 \equiv 0 \pmod{7}$.
Déterminer les entiers relatifs n tels que $n^3 - 1 \equiv 0 \pmod{7}$.
2. En déduire que pour tout entier relatif n , le nombre : $n(n^3 + 1)(n^3 - 1)$ est divisible par 42.

CORRECTION

EXERCICE 1

Si on divise 4373 par n , le reste est 8 donc il existe un entier naturel q tel que $4373 = nq + 8$ donc $nq = 4373 - 8 = 4865$ donc n divise 4865

Si on divise 826 par n , le reste est 7 donc il existe un entier naturel q' tel que $826 = nq' + 7$ donc $nq' = 826 - 7 = 819$ donc n divise 819

$819 = 9 \times 91 = 3^2 \times 7 \times 13$ donc les diviseurs de 819 sont : 1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 13 ; 21 ; 39 ; 57 ; 63 ; 91 ; 273 ; 819.

		diviseurs de 819			
7^0	13^0	3^0	1	Le reste de la division de 4373 par n , est 8 donc $n > 8$, ces cas sont exclus	
		3^1	3		
		3^2	9		$4865 = 9 \times 573$ donc $n = 9$
	13^1	3^0	13		$4865 = 13 \times 374 + 3$ donc $n \neq 13$
		3^1	39		$4865 = 39 \times 124 + 29$ donc $n \neq 39$
		3^2	57		$4865 = 57 \times 85 + 20$ donc $n \neq 57$
7^1	13^0	3^0	7	$n > 8$, ce cas est exclu	
		3^1	21	$4865 = 21 \times 231 + 14$ donc $n \neq 21$	
		3^2	63	$4865 = 63 \times 77 + 14$ donc $n \neq 63$	
	13^1	3^0	91	$4865 = 91 \times 53 + 42$ donc $n \neq 91$	
		3^1	273	$4865 = 273 \times 17 + 224$ donc $n \neq 273$	
		3^2	819	$4865 = 819 \times 5 + 770$ donc $n \neq 819$	

EXERCICE 2

$20 < \sqrt{401} < 21$, les nombres premiers 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ne divisent pas 401 donc 401 est un nombre premier.

$x^2 - y^2 = 401 \Leftrightarrow (x+y)(x-y) = 401$ donc $x+y$ est un diviseur positif de 401 donc soit $x+y = 401$ soit $x+y = 1$.

si $x+y = 401$ alors $x-y = 1$ donc $2x = 401 + 1$ donc $x = 201$ et $2y = 401 - 1$ donc $y = 200$

si $x+y = 1$ alors $x-y = 401$ donc $2x = 401 + 1$ donc $x = 201$ et $2y = 1 - 401 = -400$ donc y n'est pas un entier naturel.

Dans l'ensemble des entiers naturels l'équation : $x^2 - y^2 = 401 \Leftrightarrow x = 201$ et $y = 200$.

EXERCICE 3

1. Dans la division de n par 3, il existe un entier naturel k tel que $n = 3k + r$ avec $r \in \{0 ; 1 ; 2\}$

si n n'est pas un multiple de 3 alors $r \neq 0$ donc $n = 3k + 1$ ou $n = 3k + 2$ donc soit $n \equiv 1 [3]$ soit $n \equiv -1 [3]$ donc $n^2 \equiv 1 [3]$.

2.

si a est un multiple de 3 alors 3 divise a donc 3 divise $ab(a^2 - b^2)$

si a n'est pas un multiple de 3 et si b est un multiple de 3 alors 3 divise b donc 3 divise $ab(a^2 - b^2)$

si a n'est pas un multiple de 3 et si b n'est pas un multiple de 3 alors $a^2 \equiv 1 [3]$ et $b^2 \equiv 1 [3]$ donc $a^2 - b^2 \equiv 0 [3]$ donc 3 divise $ab(a^2 - b^2)$

Quels que soient les entiers relatifs a et b , le nombre $ab(a^2 - b^2)$ est divisible par 3.

EXERCICE 4

$999 = 27 \times 37$ donc $1000 = 27 \times 37 + 1$ donc $10^3 \equiv 1 \pmod{37}$

donc pour tout entier positif n $[10^3]^n \equiv 1^n \pmod{37}$ donc pour tout entier positif n on a : $10^{3n} \equiv 1 \pmod{37}$

$10^{10} = 10^{3 \times 3 + 1}$ or $10^{3 \times 3} \equiv 1 \pmod{37}$ donc $10^{3 \times 3 + 1} \equiv 10 \pmod{37}$

$10^{20} = 10^{3 \times 6 + 2}$ or $10^{3 \times 6} \equiv 1 \pmod{37}$ donc $10^{3 \times 6 + 2} \equiv 100 \pmod{37}$

$100 = 3 \times 37 - 11$ donc $100 \equiv -11 \pmod{37}$ donc $10^{20} \equiv -11 \pmod{37}$

$10^{30} = 10^{3 \times 10}$ or $10^{3 \times 10} \equiv 1 \pmod{37}$ donc $10^{30} \equiv 1 \pmod{37}$ donc $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 10 - 11 + 1 \pmod{37}$ soit $A \equiv 0 \pmod{37}$

le reste de la division par 37 du nombre $A = 10^{10} + 10^{20} + 10^{30}$ est 0.

EXERCICE 5

1.

$3 \equiv 3 [7]$	reste 3
$3^2 = 9 = 7 + 2$ donc $3^2 \equiv 2 [7]$	reste 2
$3^3 = 3 \times 3^2$ donc $3^3 \equiv 6 [7]$	reste 6
$3^4 = 3^2 \times 3^2$ donc $3^4 \equiv 4 [7]$	reste 4
$3^5 = 3^2 \times 3^3$ donc $3^5 \equiv 12 [7]$ or $12 = 7 + 5$ donc $3^5 \equiv 5 [7]$	reste 5
$3^6 = 3^3 \times 3^3$ donc $3^6 \equiv 36 [7]$ or $36 = 7 \times 5 + 1$ donc $3^6 \equiv 1 [7]$	reste 1
$3^7 = 3^6 \times 3$ donc $3^7 \equiv 3 [7]$	reste 3

2. Si p est un entier positif, $3^{p+6} = 3^p \times 3^6$ or $3^6 \equiv 1 [7]$ donc $3^{p+6} \equiv 3^p [7]$
 3^p et 3^{p+6} ont le même reste dans la division par 7.

3. Quel que soit l'entier naturel n , $2005 = 7 \times 666 + 3$ donc $2005 \equiv 3 [7]$ donc 2005^n et 3^n ont le même reste dans la division par 7.

$3^6 \equiv 1 [7]$ donc pour tout k entier naturel, $3^{6k} \equiv 1^k [7]$ soit $3^{6k} \equiv 1 [7]$

$3^{6k} \equiv 1 [7]$ donc $3^{6k+1} \equiv 3 [7]$ et $3^{6k+2} \equiv 3^2 [7]$ donc $3^{6k+2} \equiv 2 [7]$ (voir question 1)

$3^{6k+3} \equiv 3^3 [7]$ donc $3^{6k+3} \equiv 6 [7]$

$3^{6k+4} \equiv 3^4 [7]$ donc $3^{6k+4} \equiv 4 [7]$

$3^{6k+5} \equiv 3^5 [7]$ donc $3^{6k+5} \equiv 5 [7]$

pour que 3^n ait pour reste 5 dans la division par 7, il suffit que n soit de la forme $6k + 5$ avec k entier naturel.

EXERCICE 6

1. En écrivant les congruences des différentes expressions modulo 7 :

n	0	1	2	3	4	5	6
n^3	0	1	1	6	1	6	6
$n^3 + 1$	1	2	2	0	2	0	0
$n^3 - 1$	6	0	0	5	0	5	5

Les entiers relatifs n tels que : $n^3 + 1 \equiv 0$ (modulo 7) sont de la forme $7k + 3$; $7k + 5$; $7k + 6$ avec k entier naturel.

Les entiers relatifs n tels que $n^3 - 1 \equiv 0$ (modulo 7) sont de la forme $7k + 1$; $7k + 2$; $7k + 4$ avec k entier naturel.

2. En écrivant les congruences des différentes expressions modulo 7 :

n	0	1	2	3	4	5	6
$n^3 + 1$	1	2	2	0	2	0	0
$n^3 - 1$	6	0	0	5	0	5	5
$n(n^3 + 1)(n^3 - 1)$	0	0	0	0	0	0	0

Pour tout entier relatif n , le nombre : $n(n^3 + 1)(n^3 - 1)$ est divisible par 7

LE PAKAO

Le Pakao est une collection du Réseau Scolaire qui rassemble le maximum de documents , de sources et de matières différentes dans le but d'aider les candidats aux examens et concours .

Trouver d'autres documents sur le

www.reseauscolaire.com

+ 221 78 563 10 50