CORRECTION MATHS BAC D 2009

2.a. Calcul de $\bar{X}$ le chiffre d'affaires moyen

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{N} = \frac{350 + 380 + 500 + 450 + 580 + 650 + 700}{7} = \frac{3610}{7} = 515,714$$

b. Calcul de $\bar{Y}$ le coût moyen de production

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{N} = \frac{40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 + 70}{7} = \frac{385}{7} = 55$$

3.a. Vérifions qu'un arrondi à l'entier de $\text{cov}(X, Y)$ est égal à 1193

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= \frac{\sum Y_i \cdot X_i}{N} - \bar{X} \cdot \bar{Y} \\ &= \frac{350 \times 40 + 380 \times 45 + 500 \times 50 + 450 \times 55 + 580 \times 60 + 650 \times 65 + 700 \times 70}{7} - 515,714 \times 55 \end{aligned}$$

$$\text{cov}(X, Y) = 1192,86 \approx 1193$$

b. Justifions l'existence d'un ajustement linéaire entre X et Y.

$$r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}}$$

$$V(X) = \frac{\sum X_i^2}{N} - \bar{X}^2 = \frac{350^2 + 380^2 + 500^2 + 450^2 + 580^2 + 650^2 + 700^2}{7} - 515,714^2$$

$$V(X) = 15224,6$$

$$V(Y) = \frac{\sum Y_i^2}{N} - \bar{Y}^2 = \frac{40^2 + 45^2 + 50^2 + 55^2 + 60^2 + 65^2 + 70^2}{7} - 55^2 ; \quad V(Y) = 100$$

$$r = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}} = \frac{1193}{\sqrt{15224,6 \times 100}} = 0,967$$

$0,87 \leq |r| \leq 1$: il existe alors une forte corrélation linéaire entre les variables X et Y. L'on peut donc faire un ajustement linéaire entre X et Y.

4.a. Equation de la droite (D) d'ajustement de Y en fonction de X

$$(D) : y = ax + b$$

$$a = \frac{\text{cov}(X,Y)}{V(X)} = \frac{1193}{15224,6} = 0,078$$

$$\bar{y} = a\bar{x} + b \Rightarrow b = \bar{y} - a\bar{x} = 55 - 0,078 \times 515,714 = 14,593$$

$$(D) : y = 0,078x + 14,593$$

b. Construction de (D) (voir repère ci avant).

((D) passe par le point moyen G (515,714 ; 55)) ;

Tableau de valeurs

X	515,714	0
Y	55	14,593

5. Coût de production Y de l'entreprise Ivoirbois de l'année 2007 si le chiffre d'affaires de l'année 2007 est de X = 800 millions de francs.

$$y = 0,078 \times 800 + 14,593 = 76,993 \text{ millions.}$$

Exercice 2

1. Représentation sur l'axe des abscisses des termes U_0 ; U_1 ; U_2 et U_3

$$U_{n+1} = \frac{3}{5} U_n + 1 \quad \text{On en déduit : } f(x) = \frac{3}{5}x + 1$$

Tableau de valeurs

x	0	5
f(x)	1	4

2.a. Démontrons par récurrence que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par $\frac{5}{2}$.

$U_0 = 0 < \frac{5}{2}$ donc U_0 est majorée par $\frac{5}{2}$; la propriété est vraie à l'ordre 0.

Supposons que pour tout k élément de $\mathbb{N}$, U_k est majorée par $\frac{5}{2}$.

On a : $U_k < \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{3}{5} U_k < \frac{3}{5} \times \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{3}{5} U_k < \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{3}{5} U_k + 1 < \frac{3}{2} + 1 \Rightarrow \frac{3}{5} U_k + 1 < \frac{5}{2}$

$\Rightarrow U_{k+1} < \frac{5}{2}$ donc U_{k+1} est également majorée par $\frac{5}{2}$

Finalement, pour tout n appartenant à $\mathbb{N}$, (U_n) est majorée par $\frac{5}{2}$.

b. Démontrons que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

(U_n) est majorée par $\frac{5}{2}$ donc (U_n) converge si elle est croissante.

Etudions les variations de la suite (U_n) .

$$U_{n+1} - U_n = \frac{3}{5} U_{n+1} - U_n = \frac{3}{5} U_{n+1} - \frac{5}{5} U_n = \frac{-2}{5} U_{n+1}$$

$$U_n < \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{-2}{5} U_n > \frac{-2}{5} \times \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{-2}{5} U_n > -1 \Rightarrow \frac{-2}{5} U_{n+1} > -1 + 1 \Rightarrow \frac{-2}{5} U_{n+1} > 0$$

Donc $U_{n+1} - U_n > 0$, par suite (U_n) est croissante.

(U_n) est croissante et majorée donc elle est convergente.

3. Soit la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = U_n - \frac{5}{2}$

a. Démontrons que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

$$V_n = U_n - \frac{5}{2} \Rightarrow V_{n+1} = U_{n+1} - \frac{5}{2} \Rightarrow V_{n+1} = \frac{3}{5}U_{n+1} - \frac{5}{2} \quad \text{car} \quad U_{n+1} = \frac{3}{5}U_n + 1$$

$$\Rightarrow V_{n+1} = \frac{3}{5}U_n - \frac{3}{2} = \frac{3}{5}\left(U_n - \frac{5}{2}\right) = \frac{3}{5}V_n \Rightarrow \frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{3}{5} \Rightarrow (V_n) \text{ est une suite géométrique de raison}$$

$$q = \frac{3}{5} \text{ et de premier terme } V_0 = -\frac{5}{2}$$

b. Exprimons V_n puis U_n en fonction de n

$$(V_n) \text{ est une suite géométrique de raison } q = \frac{3}{5} \text{ et de premier terme } V_0 = -\frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow V_n = V_0 q^n \Rightarrow V_n = -\frac{5}{2} \times \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

$$V_n = U_n - \frac{5}{2} \Rightarrow U_n = \frac{5}{2} + V_n \Rightarrow U_n = \frac{5}{2} + \left[-\frac{5}{2} \times \left(\frac{3}{5}\right)^n\right] \Rightarrow U_n = \frac{5}{2} \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n\right]$$

c. Déterminons la limite de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$(V_n) \text{ est une suite géométrique de raison } q = \frac{3}{5}$$

$$-1 < q < 1 \Rightarrow \lim V_n = 0 \quad \text{or} \quad U_n = \frac{5}{2} + V_n \Rightarrow \lim U_n = \frac{5}{2} + \lim V_n \Rightarrow \lim U_n = \frac{5}{2} + 0 = \frac{5}{2}$$

Problème

Partie A

On considère la fonction g dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par : $g(x) = (1-x)e^{1-x} - 1$

1.a. Justifions que la limite de g en $+\infty$ est -1

On pose $X = 1 - x$

Quand x tend vers $+\infty$ X tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{X \rightarrow -\infty} X e^X - 1 = -1 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0)$$

b. Déterminons la limite de g en $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (1-x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$$

2.a. Démontrons que pour tout x élément de $\mathbb{R}$, $g'(x) = (x-2)e^{1-x}$

$$g'(x) = \left[(1-x)e^{1-x} - 1 \right]' = (1-x)'e^{1-x} + (1-x)(e^{1-x})' - 1'$$

$$g'(x) = -e^{1-x} + (1-x)(-e^{1-x}) = (1+1-x)(-e^{1-x}) = (2-x)(-e^{1-x}) = (x-2)e^{1-x}$$

$$g'(x) = (x-2)e^{1-x}$$

b. Etudions les variations de g et donnons son tableau de variation

$$g'(x) = (x-2)e^{1-x}$$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{1-x} > 0$ donc le signe de $g'(x)$ a le même que $(x-2)$

$$g'(x) > 0 \iff x-2 > 0 \iff x > 2$$

$$\begin{cases} \forall x \in]-\infty; 2[, g'(x) < 0 & \text{D'où } g \text{ est strictement décroissante sur }]-\infty; 2[\\ \forall x \in]2; +\infty[, g'(x) > 0 & \text{D'où } g \text{ est strictement croissante sur }]2; +\infty[\end{cases}$$

Tableau de variation de g

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$	0		
$g(x)$			

3.a. Démontrons que l'équation $x \in \mathbb{R} \quad g(x) = 0$ admet une solution unique α .

• g est continue et strictement décroissante sur $]-\infty; 2[$

$g(]-\infty; 2[) =]-\bar{e}^{-1}-1; +\infty[$ or $0 \in]-\bar{e}^{-1}-1; +\infty[$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]-\infty; 2[$

• $\forall x \in]2; +\infty[; g(x) < -1 < 0$ donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution sur $]2; +\infty[$

Finalement l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $\mathbb{R}$

b. Justifions que : $0,4 < \alpha < 0,5$

g est continue et strictement décroissante sur $]-\infty; 2[$ et en particulier sur $]0,4; 0,5[$

$$\left. \begin{array}{l} g(0,4) = 0,4 \\ g(0,5) = -0,1 \end{array} \right\} g(0,4) \times g(0,5) < 0 \text{ donc } 0,4 < \alpha < 0,5$$

5. Signe de $g(x)$

x	$-\infty$	α	2	$+\infty$
$g(x)$				
Signe de $g(x)$	+	0	-	

On en déduit que :

$$\begin{cases} \forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) > 0 \\ \forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0 \end{cases}$$

PARTIE B

1. Déterminons les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$

$$f(x) = x e^{1-x} - x + 2 = x(e^{1-x} - 1 + \frac{2}{x})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{2}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -1 + \frac{2}{x} = -1$$

2.a. Démontrons que f est une primitive de g .

$$f'(x) = (x e^{1-x} - x + 2)' = (x e^{1-x})' + (-x + 2)'$$

$$f'(x) = x' e^{1-x} + x(e^{1-x})' + (-x + 2)' = e^{1-x} + x(-e^{1-x}) - 1$$

$$f'(x) = (1-x) e^{1-x} - 1 = g(x)$$

$f'(x) = g(x)$ donc f est une primitive de g .

b. Etudions les variations de f et dressons son tableau de variation.

$f'(x) = g(x)$ donc le signe de $f'(x)$ est le même que celui de g .

$$\text{or } \begin{cases} \forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) > 0 \\ \forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \forall x \in]-\infty; \alpha[, f'(x) > 0 & \text{donc } f \text{ est strictement croissante sur }]-\infty; \alpha[\\ \forall x \in]\alpha; +\infty[, f'(x) < 0 & \text{donc } f \text{ est strictement décroissante sur }]\alpha; +\infty[\end{cases}$$

Tableau de variation de f

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
Signe de $g(x)$			

1.a. Démontrons que la droite (D) d'équation $y = -x + 2$ est asymptote oblique à (C) en $+\infty$

$$f(x) - (-x + 2) = (x e^{1-x} - x + 2) - (-x + 2) = x e^{1-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (-x + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x}{e^x}} = 0 \quad \text{donc la droite d'équation (D) : } y = -x + 2 \quad \text{est}$$

asymptote à (C) en $+\infty$.

b. Etudions la position relative de (D) et (C).

$$f(x) - (-x + 2) = x e^{1-x}$$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{1-x} > 0$ donc le signe de $f(x) - (-x + 2)$ est le même que celui de x

$$f(x) - (-x + 2) > 0 \iff x > 0 \quad \text{donc (C) est au dessus de (D) sur }]0; +\infty[$$

$$f(x) - (-x + 2) < 0 \iff x < 0 \quad \text{donc (C) est en dessous de (D) sur }]-\infty; 0[$$

4. Démontrons que (C) admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction (OJ).

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x e^{1-x} - x + 2}{x} = \frac{x(e^{1-x} - 1 + \frac{2}{x})}{x} = e^{1-x} - 1 + \frac{2}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \quad \text{Car} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -1 + \frac{2}{x} = -1 \Rightarrow \text{(C) admet une}$$

branche parabolique de direction (OJ) en $-\infty$.

5. Déterminons une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1.

$$(T) : y = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$f'(1) = g(1) = (1-1)e^{1-1} - 1 = -1 \quad \text{et} \quad f(1) = (1)e^{1-1} - 1 + 2 = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$(T) : y = -1x(x-1) + 2 = -x + 3$$

6. Démontrons que $f(\alpha) = 1 - \alpha + \frac{1}{1 - \alpha}$

$$f(\alpha) = \alpha e^{1-\alpha} - \alpha + 2$$

$$g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (1-\alpha)e^{1-\alpha} - 1 = 0 \Leftrightarrow (1-\alpha)e^{1-\alpha} = 1 \Leftrightarrow e^{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$$

$$\text{D'où } f(\alpha) = \alpha \times \frac{1}{1-\alpha} - \alpha + 2 = \frac{\alpha + (1-\alpha)(-\alpha + 2)}{1-\alpha} = \frac{\alpha - \alpha + 2 + \alpha^2 - 2\alpha}{1-\alpha}$$

$$= \frac{2 + \alpha^2 - 2\alpha}{1-\alpha} = \frac{1 + \alpha^2 - 2\alpha + 1}{1-\alpha} = \frac{(1-\alpha)^2 + 1}{1-\alpha}$$

$$\text{Donc } f(\alpha) = \frac{(1-\alpha)^2}{1-\alpha} + \frac{1}{1-\alpha} = 1 - \alpha + \frac{1}{1-\alpha}$$

7. Justifions que pour tout réel x , $f(-x+2) = e^{x-1}f(x)$

$$f(x) = x e^{1-x} - x + 2$$

$$f(-x+2) = (-x+2)e^{1-(-x+2)} - (-x+2) + 2 ; f(-x+2) = (-x+2)e^{-1+x} + x = e^{-1+x} \left[(-x+2) + \frac{x}{e^{-1+x}} \right]$$

$$f(-x+2) = e^{x-1} \left[-x+2 + x e^{1-x} \right] = e^{x-1} \left[x e^{1-x} - x + 2 \right] = e^{x-1} f(x)$$

$$f(-x+2) = e^{x-1} f(x)$$

8. Démontrons que si β est l'une des solutions de l'équation $f(x) = 0$ alors $-\beta + 2$ est l'autre solution.

$$\text{On sait que : } f(-x+2) = e^{x-1} f(x)$$

$$\beta \text{ est solution de } f(x) = 0 \Leftrightarrow f(\beta) = 0 \Leftrightarrow e^{\beta-1} f(\beta) = 0 \Leftrightarrow f(-\beta+2) = 0 \Leftrightarrow -\beta+2 \text{ est solution de } f(x) = 0$$

8. Construction de (D), (T), et (C). (On prendra $\alpha = 0,4$ et $\beta = 2,5$)

PARTIE C

1. Calcul de $A(\lambda)$ à l'aide d'une intégration par parties.

$$f(x) - (-x + 2) = x e^{1-x}$$

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} (f(x) - (-x + 2)) \, dx \cdot UA$$

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} (x e^{1-x}) \, dx \cdot UA$$

On pose $u(x) = x$ $u'(x) = 1$

$$v'(x) = e^{1-x} \quad v(x) = -e^{1-x}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\lambda} (x e^{1-x}) \, dx &= \left[-x e^{1-x} \right]_0^{\lambda} - \int_0^{\lambda} (-e^{1-x}) \, dx \\ &= \left[-x e^{1-x} \right]_0^{\lambda} - \left[e^{1-x} \right]_0^{\lambda} = \left[-x e^{1-x} - e^{1-x} \right]_0^{\lambda} \\ &= \left[(-x-1) e^{1-x} \right]_0^{\lambda} = \left[(-\lambda-1) e^{1-\lambda} \right] - \left[(-0-1) e^{1-0} \right] = (-\lambda-1) e^{1-\lambda} + e \end{aligned}$$

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} (x e^{1-x}) \, dx \cdot UA$$

$$A(\lambda) = \left[(-\lambda-1) e^{1-\lambda} + e \right] \times UA \quad \text{avec} \quad UA = 2 \, \text{cm} \times 2 \, \text{cm} = 4 \, \text{cm}^2$$

$$A(\lambda) = \left[(-\lambda-1) e^{1-\lambda} + e \right] \times 4 \, \text{cm}^2$$

Déterminons la limite de $A(\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$

$$A(\lambda) = \left[(-\lambda-1) e^{1-\lambda} + e \right] \times UA = \left[(-\lambda-1) e^{-\lambda} \times e + e \right] \times UA$$

$$A(\lambda) = e \left[(-\lambda-1) e^{-\lambda} + 1 \right] \times UA = e \left[(-\lambda e^{-\lambda} - e^{-\lambda} + 1) \right] \times UA$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = e \times UA = e \times 4 \, \text{cm}^2 = 4e \, \text{cm}^2 = 10,872 \, \text{cm}^2$$

$$\text{Car} \begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} -\lambda e^{-\lambda} = \lim_{X \rightarrow -\infty} X e^X = 0 & (\text{en posant } X = -\lambda) \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0 \end{cases}$$