Exercice 9 points

On considère, les nombres complexes $z_A = 4e^{i\pi/6}$; $z_B = 4e^{-2i\pi/3}$ et , $z_C = -2 + 2i$.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal. *Les parties I , II et III sont indépendantes*

Partie I : Q. C.M.

Pour chacune des questions, une seule des réponses A, B, C ou Dest exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

On ne demande aucune justification

NOTATION : chaque réponse juste rapporte 0,5 point ; une réponse fausse enlève 0,25 point.

Une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point. Si le total des points est négatif, il est ramené à 0.

1. Le nombre complexe $Z_1 = z_A \times z_B$ est :

Réponse A : un nombre réel positif

Réponse C : un nombre imaginaire pur

Réponse B : un nombre réel négatif

Réponse D : l'affixe d'un point du plan complexe pris hors des axes

2. Le nombre complexe $Z_2 = z_A^6$ est :

Réponse A : un nombre réel positif

Réponse C : un nombre imaginaire pur

Réponse B : un nombre réel négatif

Réponse D : l'affixe d'un point du plan complexe pris hors des axes

3. Le nombre complexe conjugué de z_A est :

Réponse A : $-4e^{i\pi/6}$

Réponse C : $4e^{-i\pi/6}$

Réponse B : $4e^{i7\pi/6}$

Réponse D : $\frac{1}{4}e^{-i\pi/6}$

4. Le nombre complexe z_C peut se mettre sous la forme :

Réponse A : $2\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$

Réponse C : $2\sqrt{2}e^{5i\pi/4}$

Réponse B : $2\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$

Réponse D : $4e^{3i\pi/4}$

Partie II

On considère les points A, B et C d'affixes respectives z_A , z_B et z_C .

1. Soit M un point du plan d'affixe z.

a. Interpréter géométriquement $|z - z_A|$.

b. Quel est l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie l'égalité : $|z - z_A| = |z - z_B|$.

c. Vérifier que le point C appartient à l'ensemble D

2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.

3. Dédire des questions 1. et 2. la nature du triangle ABC.

ga soutra !
Docs à portée de main

Partie III

Soit les nombres complexes : $z_1 = \sqrt{2} + \sqrt{6}i$; $z_2 = 2 + 2i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$

1. Écrire Z sous forme algébrique .

2. Donner les modules et arguments de z_1 , z_2 et Z . Donner la forme exponentielle de z_1 , z_2 et Z .

3. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

4. Le plan est muni d'un repère orthonormal ; on prendra 2 cm comme unité graphique.

On désigne par M_1 , M_2 et M_3 les points d'affixes respectives z_1 , z_2 et Z .

Placer le point M_2 , puis placer les points M_1 et M_3 en utilisant la règle et le compas

(on laissera les traits de construction apparents).

Problème 11 points

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 6}{x - 1}$ et soit C_f la courbe représentative de f dans le repère

orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unités : 1cm sur l'axe des abscisses ; 2 mm sur l'axe des ordonnées.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .

2. a. Calculer les limites de f aux bornes de cet ensemble.

b. Dédire de la question précédente une asymptote D à C_f .

3. a. Déterminer la fonction dérivée de la fonction f

b. Etudier en détail le signe de la fonction dérivée.

c. Etablir le tableau de variations de la fonction f

4. a. Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$

b. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x + 2$ est asymptote à C_f quand x vers $+\infty$ et vers $-\infty$.

c. Etudier la position relative de C_f et de (Δ) .

5. a. Déterminer une équation de la tangente T_1 à C_f au point A d'abscisse 0.

b. Déterminer une équation de la tangente T_2 à C_f au point B d'abscisse 2.

6. Montrer que le point $(1; 1)$ est centre de symétrie de C_f .

7. Tracer D, (Δ) , T_1 , T_2 et C_f .

Annexe - problème

EXERCICE

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par : $f(x) = \frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1}$

On note C_f sa représentation graphique dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(Unités graphiques : 1 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées)

1. Calculer $f(0)$. En déduire les coordonnées du point d'intersection de la courbe C_f avec l'axe des ordonnées.
2. Déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection de la courbe C_f avec l'axe des abscisses.
- 3 Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
4. Étudier les limites de f en -1^+ et en -1^- . En déduire que la courbe C_f admet une asymptote verticale D dont on précisera l'équation.
5. Étudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. La courbe C_f admet-elle une asymptote horizontale ?
6. Démontrer que la droite Δ d'équation $y = x + 6$ est asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$ et en $-\infty$..
Préciser la position relative de C_f et de D .
7. Calculer la dérivée f' de f puis étudier son signe. En déduire le tableau de variation de f .
8. Déterminer une équation des tangentes T_{-2} et T_{-3} aux points de la courbe C_f d'abscisses respectives -2 et -3 .
9. Tracer, dans le repère, $D, \Delta, T_{-2}, T_{-3}$ et C_f . (On se limitera à $[-10; -1[\cup]-1; 6]$)

EXERCICE

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par : $f(x) = \frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1}$

On note C_f sa représentation graphique dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(Unités graphiques : 1 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées)

1. Calculer $f(0)$. En déduire les coordonnées du point d'intersection de la courbe C_f avec l'axe des ordonnées.
2. Déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection de la courbe C_f avec l'axe des abscisses.
- 3 Déterminer les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
4. Étudier les limites de f en -1^+ et en -1^- . En déduire que la courbe C_f admet une asymptote verticale D dont on précisera l'équation.
5. Étudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. La courbe C_f admet-elle une asymptote horizontale ?
6. Démontrer que la droite Δ d'équation $y = x + 6$ est asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$ et en $-\infty$..
Préciser la position relative de C_f et de D .
7. Calculer la dérivée f' de f puis étudier son signe. En déduire le tableau de variation de f .
8. Déterminer une équation des tangentes T_{-2} et T_{-3} aux points de la courbe C_f d'abscisses respectives -2 et -3 .
9. Tracer, dans le repère, $D, \Delta, T_{-2}, T_{-3}$ et C_f . (On se limitera à $[-10; -1[\cup]-1; 6]$)

Correction

Exercice 1

Partie I

On considère, les nombres complexes $z_A = 4e^{i\pi/6}$; $z_B = 4e^{-2i\pi/3}$ et , $z_C = -2 + 2i$.

1. Le nombre complexe $Z_1 = z_A \times z_B$ est :

$$z_A = 4e^{i\pi/6} \times 4e^{-2i\pi/3} = 16e^{i\pi/6 - 2i\pi/3} = 16e^{-3i\pi/6} = 16e^{-i\pi/2} = -16i$$

Réponse A : un nombre réel positif

Réponse C : un nombre imaginaire pur

Réponse B : un nombre réel négatif

Réponse D : l'affixe d'un point du plan complexe pris hors des axes

2. Le nombre complexe $Z_2 = z_A^6$ est : $Z_2 = (z_A)^6 = (4e^{i\pi/6})^6 = (4)^6 e^{i\pi} = -4^6$

Réponse A : un nombre réel positif

Réponse C : un nombre imaginaire pur

Réponse B : un nombre réel négatif

Réponse D : l'affixe d'un point du plan complexe pris hors des axes

3. Le nombre complexe conjugué de z_A est : $\overline{z_A} = \overline{4e^{i\pi/6}} = 4e^{-i\pi/6}$

Réponse A : $-4e^{i\pi/6}$

Réponse C : $4e^{-i\pi/6}$

Réponse B : $4e^{i7\pi/6}$

Réponse D : $\frac{1}{4}e^{-i\pi/6}$

4. Le nombre complexe z_C peut se mettre sous la forme :

$$z_C = -2 + 2i = 2\sqrt{2} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = 2\sqrt{2} \left(\cos(3\pi/4) + i \sin(3\pi/4) \right) = 2\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$$

Réponse A : $2\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$

Réponse C : $2\sqrt{2}e^{5i\pi/4}$

Réponse B : $2\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$

Réponse D : $4e^{3i\pi/4}$

Partie II

1. soit M un point d'affixe z . $z_{\overline{AM}} = z_M - z_A$ est l'affixe du vecteur $\overline{AM}$; $|z_{\overline{AM}}| = |z_M - z_A| = AM$

Donc $|z_M - z_A|$ est égale à la distance AM .

b. $|z_M - z_A| = |z_M - z_B| \Leftrightarrow AM = BM \Leftrightarrow M$ appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.

l'ensemble D des points M du plan dont l'affixe z vérifie l'égalité : $|z_M - z_A| = |z_M - z_B|$ est la médiatrice du segment $[AB]$.

c. $z_A = 4e^{i\pi/6} = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2\sqrt{3} + 2i$

$$z_B = 4e^{-2i\pi/3} = 4 \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \right) = 4 \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right) = 4 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-2 + 2i - 2\sqrt{3} - 2i| = |-2 - 2\sqrt{3}| = 2 + 2\sqrt{3}.$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-2 + 2i + 2 + 2\sqrt{3}i| = |2i + 2\sqrt{3}i| = 2 + 2\sqrt{3}, \text{ donc } AC = BC. \text{ et par conséquent, le point C appartient à l'ensemble D.}$$

3. $AB = |z_B - z_C| = |-2 - 2\sqrt{3}i - 2\sqrt{3} - 2i| = |-(2 + 2\sqrt{3}) - (2 + 2\sqrt{3})i|$

$$AB = \sqrt{(2 + 2\sqrt{3})^2 + (2 + 2\sqrt{3})^2} = \sqrt{2(2 + 2\sqrt{3})^2} = (2 + 2\sqrt{3})\sqrt{2}$$

$$\text{Donc } AC^2 + BC^2 = (2 + 2\sqrt{3})^2 + (2 + 2\sqrt{3})^2 = 2(2 + 2\sqrt{3})^2 = AB^2, \text{ donc } AC^2 + BC^2 = AB^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C.

3. on a : le triangle ABC est rectangle en C. et $AC=BC$, donc le triangle ABC est rectangle isocèle en C.

$$1. Z = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}i}{2 + 2i} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6}i)(2 - 2i)}{(2 + 2i)(2 - 2i)} = \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{6} + i(-2\sqrt{2} + 2\sqrt{6})}{8} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$2. |z_1|^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2 = 2 + 6 = 8, |z_1| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ et on a}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}; \text{ d'où } \theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Donc } z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6} = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2\sqrt{2} (\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)) = 2\sqrt{2} e^{i\pi/3}$$

$$|z_2|^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8; |z_2| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ et on a}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}; \theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$z_2 = 2 + 2i = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2} (\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4)) = 2\sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

$$\text{On a donc } |Z| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1 \text{ et on a : } \arg Z = \arg z_1 - \arg z_2 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Donc } Z = \cos(\pi/12) + i \sin(\pi/12), \text{ donc } \cos(\pi/12) = \operatorname{Re}(Z) \text{ et } \sin(\pi/12) = \operatorname{Im}(Z)$$

$$\text{et on a : } \cos(\pi/12) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \text{ et } \sin(\pi/12) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Problème

1. $f(x)$ est définie si et seulement si son dénominateur $x-1 \neq 0$, ce qui équivaut à $x \neq 1$.

$$\text{Ainsi } D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[.$$

2. Partons du membre de droite de l'égalité proposée : pour tout $x \neq 1$, on a :

$$ax + b + \frac{c}{x-1} = \frac{(ax+b)(x-1) + c}{x-1} = \frac{ax^2 + (b-a)x + (-b+c)}{x-1} = \frac{-x^2 + 3x - 6}{x-1}, \text{ donc}$$

$$\begin{cases} a = -1 \\ b - a = 3 \\ c - b = -6 \end{cases} \Leftrightarrow a = -1; b = 3 + a = 3 + 1 = 2; c = -6 + 2 = -4. f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 6}{x-1} = -x + 2 - \frac{4}{x-1},$$

3.a. En $-\infty$. On sait que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) = -\infty$ puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x-1} = 0$ par somme puis quotient de limites. De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$, puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x + 2 = +\infty$, il s'ensuit alors par somme de limites que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

b. En $+\infty$ (démarche identique)

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x-1} = 0$ par somme puis quotient de limites.

De même, $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 2 = -\infty$, il s'ensuit alors par somme de limites que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

c. En 1 : on a $f(x) = -x + 2 - \frac{4}{x-1} = -x + 2 - 4 \times \frac{1}{x-1}$ pour tout $x \neq 1$. $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}}(-x + 2) = 1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}}(x - 1) = 0$.

Or, $x - 1 < 0$ pour tout $x < 1$, on en déduit alors par inverse de limites que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{(x-1)} = -\infty$. et

$-4 \times \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{(x-1)} = +\infty$ On conclut par quotient et somme de limites que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = +\infty$

De même, $x - 1 > 0$ pour tout $x > 1$, on en déduit alors par inverse de limites que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{(x-1)} = +\infty$. et

$-4 \times \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{(x-1)} = -\infty$ On conclut par quotient et somme de limites que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = -\infty$

b. Comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = +\infty$, on peut affirmer que la droite D d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à la courbe C_f .

4. a. pour tout $x \neq 1$, on a $f(x) - (-x + 2) = -\frac{4}{x-1}$, or on vient de voir que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x-1} = 0$. Par conséquent

La courbe C_f admet la droite Δ d'équation $y = -x + 2$ pour asymptote en $-\infty$ et en $+\infty$.

b. pour tout $x \neq 1$, on a $f(x) - (-x + 2) = \frac{4}{1-x}$ est de même signe que $1-x$, si bien que $f(x) > (-x + 2)$ pour $x \in]-\infty; 1[$ et que $f(x) < (-x + 2)$ pour $x \in]1; +\infty[$.

On conclut que la courbe C_f est au dessus de D sur $] -\infty; 1[$ et en dessous de D sur $] 1; +\infty[$

5. Soit $I(x; y) = D \cap \Delta$; alors $x = 1$ et $y = -x + 2 = -1 + 2 = 1$. Par conséquent l'intersection des asymptotes Est le point $I(1; 1)$.

Vérifions maintenant que ce point est un centre de symétrie de la courbe C_f . Comme $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ est symétrique par rapport à 1 il faut et il suffit que : $f(a+h) + f(a-h) = 2b$, c'est-à-dire $f(1+h) + f(1-h) = 2 \times 1 = 2$. En effet : pour tout $h \neq 0$

$$f(1+h) + f(1-h) = -(1+h) + 2 - \frac{4}{1+h-1} - (1-h) + 2 - \frac{4}{1-h-1} = 1-h - \frac{4}{h} + 1+h + \frac{4}{h} = 2. \text{ Cqfd}$$

Le point d'intersection I est donc centre de symétrie de la courbe C_f .

6. a. La fonction f étant un polynômes, elle est dérivable sur son domaine de définition.

En utilisant la formule $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{1}{v^2}$ pour v une fonction dérivable ne s'annulant pas,

$$\text{on obtient pour tout } x \neq 1 : f'(x) = -1 + \frac{4}{(x-1)^2} = \frac{2^2 - (x-1)^2}{(x-1)^2} = \frac{[2+(x-1)][2-(x-1)]}{(x-1)^2}$$

$$\text{Soit pour tout } x \neq 1 : f'(x) = \frac{(x+1)(3-x)}{(x-1)^2}$$

b) Dressons le tableau de signe de f' sur D_f

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$3-x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$(x-1)^2$	$+$	$+$	0	$+$	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$

c) On en déduit le tableau de variation de f sur D_f

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	5		$-\infty$	-3	$-\infty$

Ne pas oublier de placer les limites « aux bouts des flèches »

$$f(-1) = -1 + 2 - \frac{4}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad f(3) = -3 + 2 - \frac{4}{2} = -3$$

De plus, f' s'annule en -1 et en 3 , si bien que la courbe C_f admet des tangentes horizontales

Aux points $A(-1;5)$ et $B(3;-3)$. Elles doivent impérativement apparaître sur le tracé.

7. $f(0) = 6$ et que $f'(0) = 3$, alors la tangente T à la courbe C_f au point $C(0;6)$ a pour équation réduite

$$y = f'(0)(x-0) + f(0) = 3x + 6. \text{ De même on a : } f(2) = -2 + 2 - \frac{4}{1} = -4 \text{ et que } f'(2) = \frac{(2+1)(3-2)}{(2-1)^2} = 3,$$

alors la tangente T à la courbe C_f au point $C(2;-4)$ a pour équation réduite

$$y = f'(2)(x-2) + f(2) = 3(x-2) - 4. \text{ Soit } y = 3x - 10$$

8. En plaçant les deux asymptotes et les trois tangentes rencontrées en cours d'étude, On peut alors tracer sans aucune difficulté la courbe C_f .

1. $f(0) = 10$. La courbe C_f coupe donc l'axe des ordonnées en $A(0 ; 10)$.
2. Pour déterminer les abscisses des éventuels points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses, on résout l'équation :

$$f(x) = 0$$

C'est-à-dire :
$$\frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1} = 0$$

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. Notre équation est donc équivalente à :

$$x^2 + 7x + 10 = 0$$

Ceci est une équation du second degré. Calculons son discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = 9$.

On a : $\Delta > 0$. Par conséquent, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = -2$$

$$S = \{-5 ; -2\}$$

La courbe C_f coupe donc l'axe des abscisses en deux points : $B(-5 ; 0)$ et $C(-2 ; 0)$

3. Nous cherchons des réels a , b et c tels que :

$$\frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1} = ax + b + \frac{c}{x + 1}$$

En réduisant au même dénominateur dans le membre de droite, on obtient :

$$\frac{x^2 + 7x + 10}{x + 1} = \frac{(ax + b)(x + 1) + c}{x + 1}$$

Nous pouvons simplifier par $x + 1$ (qui est non nul, puisque $x \neq -1$) :

$$x^2 + 7x + 10 = (ax + b)(x + 1) + c$$

Puis, en développant le membre de droite, on obtient :

$$x^2 + 7x + 10 = ax^2 + ax + bx + b + c$$

Regroupons les termes en x dans le membre de droite :

$$x^2 + 7x + 10 = ax^2 + (a + b)x + b + c$$

Or, deux fonctions polynômes sont égales si et seulement si les coefficients de leurs monômes respectifs sont égaux, d'où :

$$a = 1 ; a + b = 7 ; b + c = 10$$

On en déduit : $a = 1 ; b = 6 ; c = 4$

Nous avons donc une nouvelle écriture de $f(x)$, à savoir :

$$f(x) = x + 6 + \frac{4}{x + 1}$$

Fomesoutra.com
ça soutra !
Docs à portée de main

4. Utilisons l'écriture obtenue dans la question 3.

Limite de f en -1^+ . On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1} (x + 6) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{4}{x + 1} = +\infty \quad \text{puisque} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} (x + 1) = 0^+ \end{array} \right.$$

Donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$.

Limite de f en -1^- . On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1} (x + 6) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{4}{x+1} = -\infty \text{ puisque } \lim_{x \rightarrow -1^-} (x+1) = 0^- \end{array} \right.$$

Donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$.

Comme les limites de f en -1^+ et -1^- sont **infinies**, on en déduit que la courbe C_f admet une asymptote verticale D d'équation $x = -1$.

i. Utilisons encore l'écriture obtenue dans la question 3.

Limite de f en $+\infty$. On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 6) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x+1} = 0 \text{ puisque } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \end{array} \right.$$

Donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On peut aussi utiliser la règle suivante : "la limite d'une fonction rationnelle en $+\infty$ (ou $-\infty$) est égale à la limite du quotient des termes de plus haut degré". Ce qui permet d'aboutir plus rapidement au résultat.

Limite de f en $-\infty$. On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 6) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x+1} = 0 \text{ puisque } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty \end{array} \right.$$

Donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Comme les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$ **ne sont pas finies**, la courbe C_f n'admet donc pas d'asymptote horizontale en $+\infty$, ni en $-\infty$.

ii. Étudions la différence $f(x) - (x + 6)$. (C'est "l'écart vertical" entre la courbe C_f et la droite Δ en l'abscisse x).

$$f(x) - (x + 6) = x + 6 + \frac{4}{x+1} - (x + 6) = \frac{4}{x+1}$$

Cet "écart vertical" tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 6)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x+1} = 0$$

La courbe C_f admet donc une asymptote oblique Δ d'équation $y = x + 6$ en $+\infty$.

On a le même résultat en $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 6)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x+1} = 0$$

La courbe C_f admet donc également une asymptote oblique Δ d'équation $y = x + 6$ en $-\infty$.

La position relative de C_f et de Δ est donnée par le **signe** de la différence $f(x) - (x + 6) = \frac{4}{x+1}$.

Or, $\frac{4}{x+1} > 0 \Leftrightarrow x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$

La courbe C_f est donc au dessus de Δ sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$ et en dessous de Δ sur l'intervalle $] -\infty ; -1[$.

On peut résumer ces informations dans un tableau :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
signe de $f(x) - (x+6)$	-		+
position relative de C_f par rapport à Δ .	C_f est en dessous de Δ .		C_f est au dessus de Δ .

7. La fonction f est du type $\frac{u}{v}$ où u et v sont les fonctions définies par $\begin{cases} u(x) = x^2 + 7x + 10 \\ v(x) = x + 1 \end{cases}$

La dérivée f' de f est donc égale à : $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Ce qui donne :

$$f'(x) = \frac{(2x+7)(x+1) - (x^2+7x+10)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+2x+7x+7-x^2-7x-10}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$$

Factorisons la dérivée afin de pouvoir étudier son signe. Pour cela, on étudie le trinôme $x^2 + 2x - 3$.

On a $\Delta = 16 > 0$. Le trinôme admet deux racines : $x_1 = -3$ et $x_2 = 1$. Le trinôme se factorise donc ainsi :

$$x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$$

La dérivée f' peut donc encore s'écrire :

$$f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$$

Rappel : lorsqu'un trinôme admet deux racines, on a :

$$ax^2 + bx + c = a(x-x_1)(x-x_2)$$

On en déduit le tableau de variation de la fonction f :

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
signe de $(x+3)$	-	0	+	+	+	
signe de $(x-1)$	-	-	-	0	+	
signe de $(x+1)^2$	+	+	0	+	+	
signe de la dérivée f'	+	0	-	-	0	+
variations de f	↗		↘		↗	
	$-\infty$	1	$-\infty$	$+\infty$	9	$+\infty$

Justification des signes :

$$x+3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -3$$

$$x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

Un carré est positif ou nul

Ne pas oublier de compléter le tableau de variation avec les valeurs des limites et des éventuel extremums.

La fonction $x \mapsto x^2 + 2x - 3$ est représentée par une parabole tournée vers le haut. (Car le coefficient de x^2 , à savoir 1, est positif). Une simple esquisse de cette parabole permet alors de justifier directement le signe de la dérivée f' .

La fonction f admet un maximum relatif en -3 : $f(-3) = 1$.

La fonction f admet un minimum relatif en 1 : $f(1) = 9$.

8. L'équation de la tangente T_{-2} au point d'abscisse -2 est donnée par la formule :

$$T_{-2} : y = f(-2) + f'(-2)(x+2)$$

Or, $f(-2) = 0$ et $f'(-2) = -3$.

D'où :

$$T_{-2} : y = -3x - 6$$

De même, la tangente T_{-3} a pour équation :

$$T_{-3} : y = f(-3) + f'(-3)(x+3)$$

Or, $f(-3) = 1$ et $f'(-3) = 0$.

D'où :

$$T_{-3} : y = 1 \text{ (tangente horizontale)}$$

La formule générale est :
 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Fomesoutra.com
ça soutra !
Docs à portée de main