CORRIGE SUJET 10

Partie A :

(E) : $2^3 + 2 \times 2^2 - 16 = 8 + 8 - 16 = 0$. Donc 2 est une solution de (E).

(E) : $z^3 + 2z^2 - 16 = (z-2)(az^2 + bz + c)$

$= az^3 + bz^2 + cz - 2az^2 - 2bz - 2c = az^3 + (b-2a)z^2 + (c-2b)z - 2c$

$$\begin{cases} a=1 \\ b-2a=2 \\ c-2b=0 \\ -2c=-16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=2+2a=4 \\ c=2b=8 \\ c=8 \end{cases}$$

(E) : $z^3 + 2z^2 - 16 = (z-2)(z^2 + 4z + 8)$

(E) : $z^3 + 2z^2 - 16 = 0$

$(z-2)(z^2 + 4z + 8) = 0$

$z-2=0$ ou $z^2 + 4z + 8 = 0$

$z=2$ ou $z^2 + 4z + 8 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 4 \times 1 \times 8 = 16 - 32 = -16$

$\Delta = 16i^2$; $\sqrt{\Delta} = 4i$

$z_2 = \frac{-4+4i}{2} = -2+2i$;

$z_2 = \frac{-4-4i}{2} = -2-2i$.

$S = \{ 2; -2+2i; -2-2i \}$.

$z_1 = 2e^{i2k\pi} = 2(\cos 2k\pi + i \sin 2k\pi)$; comme $z_3 = \overline{z_1}$, on a :

$|z_2| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} = |z_3|$

$\cos \theta_2 = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta_2 = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ } , donc $\theta_2 = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

$\cos \theta_3 = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta_3 = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ } , donc $\theta_3 = \frac{-3\pi}{4} + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.
 $\theta_3 = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

B) $z_{\overline{AB}} = z_B - z_A = 2 - (-2+2i) = 4-2i$

$z_{\overline{CD}} = z_D - z_C = z_D - (-2-2i) = z_D + 2+2i$

Donc $z_{\overline{AB}} = z_{\overline{CD}}$ équivaut $4-2i = z_D + 2+2i$, donc $4-2i-2-2i = z_D$, donc

$z_D = 2-4i$

3°) $z_E = i \times z_D + z_B \times (1-i) = i(2-4i) + 2(1-i) = 2i - 4i^2 + 2 - 2i = 4 + 2 = 6$

$z_F = -i \times z_D + z_C \times (1+i) = -i(2-4i) + (-2-2i)(1+i) = -2i + 4i^2 - 2 - 2i - 2i - 2i^2$

$z_F = -2i + 4i^2 - 2 - 2i - 2i - 2i^2 = -6i - 4 - 2 + 2 = -4 - 6i$. $z_F = -4 - 6i$

$$\overline{z_{AF}} = z_F - z_A = -4 - 6i - (-2 + 2i) = -4 - 6i + 2 - 2i = -2 - 8i$$

$$AF = |z_{AF}| = |z_F - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + (-8)^2} = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

$$\overline{z_{AE}} = z_E - z_A = 6 - (-2 + 2i) = 6 + 2 - 2i = 8 - 2i$$

$$AE = |z_{AE}| = |z_E - z_A| = \sqrt{8^2 + (-2)^2} = \sqrt{64 + 4} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

$$\overline{z_{EF}} = z_F - z_E = -4 - 6i - 6 = -10 - 6i \quad EE = |z_{EF}| = |z_F - z_E| = \sqrt{(-10)^2 + (-6)^2} = \sqrt{100 + 36} = \sqrt{136}$$

$$\left. \begin{array}{l} AE^2 + AF^2 = 68 + 68 = 136 \\ EF^2 = 136 \end{array} \right\} \text{ donc } EF^2 = AE^2 + AF^2$$

d'après la réciproque du théorème de Pythagore AEF est rectangle en A.
Comme AE = AF, le triangle AEF est aussi isocèle.

CORRIGE SUJET 11

1. $z^2 - 2z + 4 = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12 = 12i^2$

$$z_1 = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{2} = 1 - i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 + 2i\sqrt{3}}{2} = 1 + i\sqrt{3}$$

2. a) $z_A = 1 + i\sqrt{3} \quad |z_A| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \cos \theta_A = \frac{1}{2} \\ \sin \theta_A = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right.$

$$\theta_A = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$z_B = 1 - i\sqrt{3} \quad |z_B| = |z_A| = |z_A| = 2 \quad \text{et} \quad \arg z_B = \arg \overline{z_A} = -\arg z_A = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

b) z_A a pour module 2 et un argument est $\pi/3$ donc : $z_A = 2e^{i\pi/3}$

c) Voir figure

3. On désigne par R la transformation du plan complexe qui à tout point M d'affixe z fait correspondre

le point M' d'affixe z' tel que : $z' = e^{2i\pi/3} z$

a) R est une rotation de centre O et d'angle de mesure $2\pi/3$.

b) $z_C = e^{2i\pi/3} z_A = 2e^{2i\pi/3} e^{i\pi/3} = 2e^{i\pi} = -2$

c. Voir figure

d) $e^{2i\pi/3} z_C = 2e^{2i\pi/3} e^{i\pi} = 2e^{5i\pi/3} = 2e^{-i\pi/3} = z_B$ donc B est l'image de C par la rotation R .

Montrons que ABC est un triangle équilatéral :

$$\overline{z_{AB}} = z_B - z_A = 1 - i\sqrt{3} - (1 + i\sqrt{3}) = -2i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad AB = 2\sqrt{3}$$

$$\overline{z_{BC}} = z_C - z_B = -2 - (1 - i\sqrt{3}) = -3 + i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad BC = \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\overline{z_{AC}} = z_C - z_A = -2 - (1 + i\sqrt{3}) = -3 - i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad BC = \sqrt{(-3)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$AB = AC = BC$ donc le triangle ABC est un triangle équilatéral

CORRIGE SUJET 12

1. a. $z_1^3 = (1+i)^3 = (1+i)^2(1+i) = (1+2i+i^2)(1+i) = 2i(1+i) = 2i+2i^2 = -2+2i$

b. $z_3 = z_1^3 z_2 = (-2+2i)(\sqrt{3}+i) = -2\sqrt{3}-2i+2i\sqrt{3}+2i^2 = (-2\sqrt{3}-2)+i(2\sqrt{3}-2)$

2. a. $|z_1| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. $\left. \begin{array}{l} \cos \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right\} \theta_1 = \frac{\pi}{4}, \quad z_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ donc } z_1^3 = \sqrt{2}^3 e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} e^{i\theta}$

b. $|z_1^3| = 2\sqrt{2} \quad \arg(z_1^3) = \frac{3\pi}{4} \quad |z_2| = \sqrt{\sqrt{3}^2+1} = \sqrt{4} = 2 \quad \left. \begin{array}{l} \cos \theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_2 = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \theta_2 = \frac{\pi}{6} \quad z_2 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$

c.

$z_3 = z_1^3 z_2 = 2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} \times 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 4\sqrt{2}e^{i(\frac{3\pi}{4}+\frac{\pi}{6})} = 4\sqrt{2}e^{i(\frac{9\pi+2\pi}{12})} = 4\sqrt{2}e^{i\frac{11\pi}{12}} = 4\sqrt{2} \left[\cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right]$

3. $z_3 = 4\sqrt{2} \left[\cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right] = (-2\sqrt{3}-2) + i(2\sqrt{3}-2)$

$\cos \frac{11\pi}{12} = \frac{-2\sqrt{3}-2}{4\sqrt{2}} = \frac{-2\sqrt{6}-2\sqrt{2}}{8} = \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \quad \text{et} \quad \sin \frac{11\pi}{12} = \frac{2\sqrt{3}-2}{4\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}-2\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

CORRIGE SUJET 13

1° $z^2 - 4z + 6 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (4)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 16 - 24 = -8$

$\sqrt{\Delta} = \sqrt{-8} = \sqrt{8i^2} = 2\sqrt{2}i$

$z_1 = \frac{4 - 2\sqrt{2}i}{2} = 2 - \sqrt{2}i$

$z_2 = \frac{4 + 2\sqrt{2}i}{2} = 2 + \sqrt{2}i$

$S = \{2 - \sqrt{2}i; 2 + \sqrt{2}i\}$.

3° $z_A = 2 - \sqrt{2}i$

$|z_A| = \sqrt{2^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$.

$z_B = -\sqrt{2} - 2i = \overline{z_A}$, z_B et $\overline{z_A}$ sont

conjugués donc $|z_B| = |\overline{z_A}| = |z_A| = \sqrt{6}$ par conséquent les points A et B appartiennent au cercle C de centre O et de rayon $R = \sqrt{6}cm$.

4°. a. $z_J = 2e^{i3\pi/4} = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$

b. $z_K = -z_J = -(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$, donc z_K et z_J sont symétriques par rapport à l'origine du repère

5°. 4/ On commence par calculer les affixes des vecteurs

$$\begin{array}{lll} \overline{IJ}(z_J - z_I) & \overline{JK}(z_K - z_J) & \overline{IK}(z_K - z_I) \\ (z_J - z_I) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2} - 2i & (z_K - z_J) = \sqrt{2} - i\sqrt{2} - (-\sqrt{2} + i\sqrt{2}) & \\ (z_J - z_I) = -\sqrt{2} + i(\sqrt{2} - 2) & (z_K - z_J) = 2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2} & \\ (z_K - z_I) = \sqrt{2} - i\sqrt{2} - 2i & & \\ (z_J - z_I) = \sqrt{2} - i(\sqrt{2} + 2) & & \\ \overline{IJ}(-\sqrt{2}; \sqrt{2} - 2) & \overline{JK}(2\sqrt{2}; -2\sqrt{2}) & \\ \overline{IK}(\sqrt{2}; -\sqrt{2} - 2) & & \end{array}$$

On pourra utiliser 3 méthodes : 1^{ère} méthode : produit scalaire

Les vecteurs $\overline{IJ}$ et $\overline{IK}$ sont orthogonaux, en effet : (rappel : deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si, $x_{\overline{IJ}} \times x_{\overline{IK}} + y_{\overline{IJ}} y_{\overline{IK}} = 0$) C'est-à-dire

$\sqrt{2} \times (-\sqrt{2}) + (-\sqrt{2} + 2)(-\sqrt{2} - 2) = -(\sqrt{2})^2 - (-\sqrt{2} + 2)(\sqrt{2} + 2) = -2 - [4 - (\sqrt{2})^2] = -2 + 2 = 0$, cela signifie que les vecteurs $\overline{IJ}$ et $\overline{IK}$ sont orthogonaux et par conséquent les droites (IJ) et (IK) sont perpendiculaires et le triangle IJK rectangle en I .

2^{ème} méthode : calcul des modules

$$\begin{aligned} \|\overline{IJ}\| = IJ &= \sqrt{\sqrt{2}^2 + (\sqrt{2} - 2)^2} & ; & \quad \|\overline{JK}\| = JK = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (-2\sqrt{2})^2} & ; \\ &= \sqrt{2 + 2 - 4\sqrt{2} + 4} = \sqrt{8 - 4\sqrt{2}} & & \quad = \sqrt{8 + 8} = \sqrt{16} = 4 \\ \|\overline{IK}\| = IK &= \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-2 - \sqrt{2})^2} & & \\ &= \sqrt{2 + 4 + 4\sqrt{2} + 2} = \sqrt{8 + 4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

On constate que $IJ^2 = 8 - 4\sqrt{2}$ et $IK^2 = 16$ et $IK^2 = 8 + 4\sqrt{2}$, et que $JK^2 = IJ^2 + IK^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle IJK rectangle en I .

CORRIGE SUJET 14

1. $z^2 - z + 1 = 0$ $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 = 3i^2$ $\sqrt{\Delta} = \sqrt{3i^2} = i\sqrt{3}$, donc

$$z_1 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \text{ et } z_2 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

2. forme exponentielle de z_A et z_E . $|z_A| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$, soit

$$\theta_A = \arg z_A \text{ un argument de } z_A, \text{ donc } \left\{ \cos \theta_A = \frac{1}{2}, \sin \theta_A = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \theta_A = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \right.$$

on en déduit la forme exponentielle de z_A est $z_A = e^{i\pi/3}$.

z_E est le nombre complexe conjugué de z_A . donc on a : $|z_A| = |z_E| = 1$ et

$$\arg z_E = -\arg z_A = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

D'où la forme exponentielle de z_E : $z_E = e^{-i\pi/3}$.

b. comme $|z_A| = |z_E| = 1$, on en déduit que $OA = OE = 1$, donc les point A et E

appartiennent au cercle (C) de centre O et de rayon 1. puisque $z_A = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$, A est le point d'abscisse 1/2 et d'ordonnée positive de ce cercle.

z_E est le nombre complexe conjugué de z_A , donc E est le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses.

$$3. z_B = (z_A)^2 = (e^{i\pi/3})^2 = e^{2i\pi/3} \quad ; \quad z_C = (z_A)^3 = (e^{i\pi/3})^3 = e^{i\pi} = -1 \quad ; \quad z_D = (z_A)^4 = (e^{i\pi/3})^4 = e^{4i\pi/3}$$

$$z_F = (z_A)^6 = (e^{i\pi/3})^6 = e^{6i\pi/3} = e^{2i\pi} = 1. \text{ on a utilisé dans chaque calcul la formule}$$

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}, \text{ pour n entier.}$$

b. d'après leur forme exponentielle, on constate que les nombres complexes z_A, z_B, z_C, z_D, z_E et z_F ont

le même module : 1. On en déduit : $OA = OB = OC = OD = OE = OF = 1$, ainsi, les points

A, B, C, D, E et F sont situés sur le cercle de centre O et de rayon 1.

$$c. z_B = e^{2i\pi/3} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} ;$$

$$z_D = e^{4i\pi/3} = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ainsi, le point D est le symétrique du point B par rapport à l'axe des abscisses.

CORRIGE SUJET 16

1. Résolution de l'équation $z^2 + 6\sqrt{3}z + 36 = 0$:

Calcul du discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (6\sqrt{3})^2 - 4 \times 36 = 108 - 144 = -36 < 0$, $\Delta = 36i^2$ et

on a $\sqrt{\Delta} = \sqrt{36i^2} = 6i$ donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées.

$$z_1 = \frac{-6\sqrt{3} - i\sqrt{36}}{2} = \frac{-6\sqrt{3} - 6i}{2} = -3\sqrt{3} - 3i, \text{ De même : } z_2 = -3\sqrt{3} + 3i$$

L'ensemble des solutions est donc : $S = \{-3\sqrt{3} - 3i; -3\sqrt{3} + 3i\}$

2. a) Calcul du module et d'un argument de $z_A = -3\sqrt{3} + 3i$:

$$|z_A| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6$$

Soit θ_A un argument de z_A ; θ_A est tel que :
$$\begin{cases} \cos \theta_A = \frac{a}{|z_A|} = \frac{-3\sqrt{3}}{6} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_A = \frac{b}{|z_A|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ donc :}$$

$$\theta_A = \arg z_A = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi ,$$

où k est un entier relatif.

Calcul du module et d'un argument de $z_B = -3\sqrt{3} - 3i$: $z_B = \overline{z_A}$, donc $|z_B| = |\overline{z_A}| = 6$

et $\theta_B = \arg \overline{z_A} = -\arg z_A = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

2. b) On en déduit la forme exponentielle de $z_A = -3\sqrt{3} + 3i$:

$$z_A = 6 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right) = 6e^{5\pi i/6}$$

2. c) Pour placer les points A et B avec précision, étant donné que $OA = OB = 6$, on peut les placer sur

le cercle de centre O et de rayon 6, en utilisant leurs ordonnées qui sont entières.

3. a) Calcul des longueurs AC et BC :

on calcule d'abord l'affixe du chacun des vecteurs $\overline{AB}$ et $\overline{AC}$,

en effet : $z_{\overline{AC}} = z_C - z_A = -6\sqrt{3} - (-3\sqrt{3} + 3i) = -3\sqrt{3} - 3i$ et

$$AC = \sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = \sqrt{27+9} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

de même $z_{\overline{AB}} = z_B - z_A = -3\sqrt{3} - 3i - (-3\sqrt{3} + 3i) = 6i$ et $AB = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$.

$z_{\overline{BC}} = z_C - z_B = -6\sqrt{3} - (-3\sqrt{3} - 3i) = -3\sqrt{3} + 3i$ et

$$BC = \sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{27+9} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

On a $AC = BC$ donc le triangle ABC est isocèle en A.

De plus : $AB = AC = BC$ donc le triangle ABC est équilatéral.

3. b) On a $AC = BC = OA = OB (= 6)$ donc OACD est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même

longueur, c'est donc un losange.

4. a) Voir figure : Comme $z_K = iz_A$, $z_K = i(-3\sqrt{3} + 3i) = -3 - 3\sqrt{3}i$

$$OK = \sqrt{(-3)^2 + (-3\sqrt{3})^2} = \sqrt{9+27} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm} ; \begin{cases} \cos \theta_K = \frac{a}{|z_A|} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2} \\ \sin \theta_K = \frac{b}{|z_A|} = \frac{-3\sqrt{3}}{6} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\theta_K = \arg z_K = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$$

et $z_K = 6e^{4\pi i/3}$ on a donc $|z_K| = |iz_A| = |i||z_A| = 1 \times 6 = 6 = OK$, donc $OA = OK = 6 \text{ cm}$. OAK est

donc un triangle isocèle en O, de plus K appartient au cercle de centre O et de rayon OA.

$$\text{Calculons } \overline{AK} : z_{\overline{AK}} = z_K - z_A = -3 - 3\sqrt{3}i - (-3\sqrt{3} + 3i) = (3\sqrt{3} - 3) - (3\sqrt{3} + 3)i$$

$$AK = \sqrt{(3\sqrt{3} - 3)^2 + (3\sqrt{3} + 3)^2} = \sqrt{27 + 9 - 18\sqrt{3} + 27 + 9 + 18\sqrt{3}} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ cm.}$$

On constate que $OA^2 + OK^2 = 6^2 + 6^2 = 36 + 36 = 72$ et $AK^2 = (6\sqrt{2})^2 = 72$, donc on a :

$$OA^2 + OK^2 = AK^2,$$

d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle OAK est aussi rectangle

en O

CORRIGE SUJET 17

Partie A

$$1. (z + 2\sqrt{3})(z^2 + 2z\sqrt{3} + 12) = z^3 + 2\sqrt{3}z^2 + 12z + 2\sqrt{3}z^2 + 12z + 24\sqrt{3} =$$

$$z^3 + (2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})z^2 + 24z + 24\sqrt{3}$$

$$= z^3 + 4z^2\sqrt{3} + 24z + 24\sqrt{3} = P(z)$$

2. Résolution de l'équation $z^2 + 2z\sqrt{3} + 12 = 0$:

$$\text{Calcul du discriminant : } \Delta = b^2 - 4ac = (2\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 12 = 12 - 48 = -36$$

$\Delta < 0$, l'équation admet donc deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-2\sqrt{3} - i\sqrt{36}}{2} = -\sqrt{3} - 3i . \text{ De même : } z_2 = \bar{z}_1 = -\sqrt{3} + 3i . \quad S = \{-\sqrt{3} - 3i; -\sqrt{3} + 3i\}$$

3. Résolution de l'équation $P(z) = 0$:

$$(z + 2\sqrt{3})(z^2 + 2z\sqrt{3} + 12) = 0 \Leftrightarrow z + 2\sqrt{3} = 0 \text{ ou } z^2 + 2z\sqrt{3} + 12 = 0 .$$

$$\text{Donc : } S = \{-2\sqrt{3}; -\sqrt{3} + 3i; -\sqrt{3} - 3i\}$$

Partie B

1°.

2. a) Calcul des modules $|z_A| = |-2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$;

$$|z_B| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ et}$$

$$|z_C| = |\bar{z}_B| = |z_B| = 2\sqrt{3}$$

Calcul des arguments : On note respectivement θ_A , θ_B et θ_C un des arguments de z_A , z_B et z_C .

$$z_A = -2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}e^{i\pi} \text{ donc } \theta_A = \arg z_A = \pi + 2k\pi ;$$

$$z_B = -\sqrt{3} + 3i = 2\sqrt{3} \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2\sqrt{3} \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right) = 2\sqrt{3}e^{2i\pi/3}, \text{ donc}$$

$$\arg z_B = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi .$$

$$\text{comme } z_C = \bar{z}_B, \text{ on a donc } \theta_C = \arg z_C = -\arg z_B = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi .$$

b) La forme exponentielle d'un nombre complexe z de module ρ et d'argument θ est : $z = \rho e^{i\theta}$, donc : $z_A = 2\sqrt{3} e^{i\pi}$; $z_B = 2\sqrt{3} e^{\frac{2\pi}{3}i}$ et $z_C = \bar{z}_B = 2\sqrt{3} e^{-\frac{2\pi}{3}i} = 2\sqrt{3} e^{\frac{4\pi}{3}i}$.

3. a) Soit M un point du plan et M' son image par la rotation R de centre O et d'angle $-\pi/3$.

On note z et z' les affixes respectives des points M et M' . On a : $z' = z e^{-i\pi/3}$

b) Soit A' l'image de A par la rotation R :

$$z_{A'} = z_A e^{-i\frac{\pi}{3}} = -2\sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{3}} = -2\sqrt{3} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = -2\sqrt{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -\sqrt{3} + 3i = z_B$$

Donc B est l'image de A par la rotation R .

c) Soit D l'image de B par R :

$$z_D = z_B e^{-i\frac{\pi}{3}} = (-\sqrt{3} + 3i) \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = (-\sqrt{3} + 3i) \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$z_D = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}^2}{2}i + \frac{3}{2}i - \frac{3\sqrt{3}}{2}i^2 = \frac{2\sqrt{3}}{2} + \frac{6}{2}i = \sqrt{3} + 3i$$

4. a) Soit I le milieu de $[CD]$: $z_I = \frac{z_C + z_D}{2} = \frac{-\sqrt{3} - 3i - \sqrt{3} - 3i}{2} = 0$

Donc O est le milieu du segment $[CD]$ et donc le centre du cercle de rayon $OC = |z_C| = 2\sqrt{3}$.

b) En utilisant les résultats de la question 2.a), on a :

$$OA = |z_A| = 2\sqrt{3} ; OB = |z_B| = 2\sqrt{3} ;$$

Donc A et B appartiennent au cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$.

c) On a montré que les points A et B appartiennent au cercle de diamètre $[CD]$, donc d'après la propriété du triangle rectangle et du cercle circonscrit, les triangles CAD et CBD sont rectangles en A et B .

CORRIGE SUJET 18

1. a) Déterminons les nombres complexes a , b et c tels que $P(z) = (z+2)(az^2 + bz + c)$:

Pour tout nombre complexe z , on a :

$$P(z) = (z+2)(az^2 + bz + c) = az^3 + bz^2 + cz + 2az^2 + 2bz + 2c = az^3 + (b+2a)z^2 + (2b+c)z + 2c$$

Or, $P(z) = z^3 - 2z^2 + 16$. Ainsi, par identification, on obtient :

$$\begin{cases} a=1 \\ b+2a=-2 \\ 2b+c=0 \\ 2c=16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-2-2a=-2-2=-4 \\ c=8 \end{cases}$$

D'où : $P(z) = (z+2)(z^2 - 4z + 8)$

1. b) Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$: Un produit de facteurs est nul si au moins un des facteurs est nul

$P(z) = 0$ équivaut à $z - 2 = 0$ ou $z^2 - 4z + 8 = 0$. La solution de la première équation est 2.

Pour la deuxième équation, calculons le discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 16 - 32 = -16 = 16i^2 = (4i)^2$$

L'équation admet donc deux racines complexes conjuguées : $z_1 = \frac{4 - 4i}{2} = 2 - 2i$

$$z_2 = \frac{4 + 4i}{2} = 2 + 2i$$

Les solutions de l'équation sont : $S = \{2; 2 - 2i; 2 + 2i\}$

2. a) Ecrivons sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle les nombres z_A et z_B :

$$z_A = 2 - 2i \quad |z_A| = |2 - 2i| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Un argument de } z_A \text{ est donné par : } \begin{cases} \cos \theta_A = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta_A = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \text{ Donc un argument de } z_A$$

est $\theta_A = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ D'où : $z_A = 2\sqrt{2}(\cos(\pi/4) - i \sin(\pi/4)) = 2\sqrt{2}e^{-i\pi/4} = [2\sqrt{2}; -\pi/4]$.

On sait que $z_B = \overline{z_A}$, donc $|z_B| = |\overline{z_A}| = |z_A| = 2\sqrt{2}$

Un argument de z_B est donné par : $\arg z_B = \arg \overline{z_A} = -\arg z_A = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$

2. b) Plaçons dans le plan P les points A et B :

c) Nature du triangle OAB :

On a : $OA = |z_A| = OB = |z_B| = 2\sqrt{2}$, donc $OA = OB$. Le triangle OAB est isocèle en O.

De plus,

$$(\overline{OA}; \overline{OB}) = (\overline{OA}; \overline{u}) + (\overline{u}; \overline{OB}) = -(\overline{u}; \overline{OA}) + (\overline{u}; \overline{OB}) = \arg z_B - \arg z_A = \frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

On en déduit alors que le triangle OAB est rectangle en O. D'où : OAB est un triangle rectangle et isocèle en O.

3. a) Caractérisons géométriquement la transformation T :

La transformation T est la rotation de centre O et d'angle $\pi/3$

3. b) Déterminons sous forme trigonométrique l'affixe du point A' :

$$z_{A'} = e^{i\pi/3} \times z_A = 2\sqrt{2}e^{i\pi/3}e^{-i\pi/4} = 2\sqrt{2}e^{i(\pi/3 - \pi/4)} = 2\sqrt{2}e^{i\pi/12}$$

Déterminons sous forme algébrique l'affixe du point A' :

$$z_{A'} = e^{i\pi/3} \times z_A = (\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))(2 - 2i) = \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}\right)(2 - 2i)$$

$$z_{A'} = 1 - i + i\sqrt{3} - i^2\sqrt{3} = \sqrt{3} + i\sqrt{3} - i + 1 = (1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1)i$$

3. c) Déduisons en les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$

et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$: De la question précédente, on en déduit que :

$$z_{A'} = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) = (1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1)i$$

$$\text{Donc : } \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

$$\text{et } \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$