Travaux dirigés n° 1 d'Analyse 2

Thème : Propriétés générales

Durée : Deux séances maximales

EXERCICE 1

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Pour les questions qui suivent, lorsque la réponse est négative, on donnera une condition nécessaire et suffisante qu'elle soit exacte.

1. Si f est impaire, ses primitives sont-elles paires?
2. Si f est paire, ses primitives sont-elles impaires?
3. S'il existe un réel T tel que f soit T -périodique, ses primitives sont-elle T -périodique?

EXERCICE 2

Calculer les intégrales suivantes

$$I = \int_0^{50} E(x)dx, \quad J = \int_0^{50} E(\sqrt{x})dx \quad K = \int_0^{2\pi} E(2 \sin x)dx \quad \text{et} \quad L_n = \int_0^1 E(x)dx, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

EXERCICE 3

On considère deux fonctions f et g continues sur un segment $[a, b]$ à valeurs réelles. On suppose de plus que la fonction g est positive sur $[a, b]$. Démontrer qu'il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que :

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx.$$

EXERCICE 4

Soit f une fonction à valeur réelle et continue sur $[-a, a]$ où $a > 0$.

1. Montrer que si f est paire alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.
2. Montrer que si f est impaire alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

EXERCICE 5

Soit f une fonction à valeur réelle et continue sur $\mathbb{R}$ et T -périodique. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $n, m \in \mathbb{Z}$. Montrer que

$$1. \int_{nT}^{a+nT} f(x)dx = \int_0^a f(x)dx.$$

$$2. \int_0^{nT} f(x)dx = n \int_0^T f(x)dx.$$

$$3. \int_a^{a+nT} f(x)dx = n \int_0^T f(x)dx.$$

$$4. \int_{mT}^{nT} f(x)dx = (m-n) \int_0^T f(x)dx.$$

$$5. \int_{a+nT}^{b+nT} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

EXERCICE 6

Sur la figure ci-dessous est représentée graphiquement une fonction f sur l'intervalle $[-4, 4]$. Calculer les intégrales $\int_{-4}^4 f(x)dx$ et $\int_{-4}^4 |f(x)|dx$:

1. à l'aide des aires de figures géométriques.
2. en déterminant explicitement $f(x)$ pour tout $x \in [-4, 4]$.