Fiche de séquence N°1

I. Classe : TSExp

Durée : 15 h

II. Domaine : Sciences Mathématiques et Technologies (SMT)

Discipline : Mathématiques

III. Compétences :

Résoudre une situation-problème

Composantes

Diagnostiquer la situation – problème

Manifestations

- Sélectionner les données mathématiques, scientifiques et technologiques qui sont en rapport avec la situation.
- Etablir des relations entre les données retenues.
- Comparer cette situation – problème avec des situations semblables déjà résolues
- Formuler le problème

IV. **Contenu :** ENSEMBLE $\mathbb{C}$ DES NOMBRES COMPLEXES

V. Ressources éducatives

- **Ressources humaines :** Néant
- **Ressources matérielles :** craie, tableau, la règle
- **Ressources financières :** Néant

VI. Stratégies d'animation :

- Travail individuel
- Travail en petit groupe
- Brainstorming

VII. Déroulement des activités (situation d'apprentissage)

Pré – évaluation :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$2x^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0 \quad ; \quad (\sqrt{2} - 1)x^2 + 2x + \sqrt{2} + 1 = 0 \quad ; \quad x^2 + (\sqrt{3} - 2)x^2 - 2\sqrt{3} = 0$$

Situation problème :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $3x^2 - x - 1 = 0$; b) $x^2 + 4 = 0$; c) $x^2 + 4x + 8 = 0$

2. Les équations $x^2 + 4 = 0$ et $x^2 + 4x + 8 = 0$ n'admettent pas de solution réelle.

Puis que ces équations existent, elles doivent forcément avoir de solution même si ces solutions ne sont pas réelles.

En imaginant un nombre noté i tel que $i^2 = -1$, résouds à nouveau les équations

$x^2 + 4 = 0$ et $x^2 + 4x + 8 = 0$

Activité 1 : Bijection de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{C}$: $(a, b) \mapsto a+bi$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$x^2 + 2x = 0$; $x^2 + 2x + 3 = 0$; $x^2 - 9 = 0$; $x^2 + 1 = 0$

L'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$, on va donc construire un ensemble que l'on appelle $\mathbb{C}$ (Complexe) dont l'élément principal ajouté est le nombre i tel que : $i^2 = -1$.

On aura : $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x^2 = i^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{i^2} \Rightarrow x = i$ ou $x = -i$

D'où $S = \{-i ; i\}$

Donner la solution de l'équation $x^2 + 2x + 3 = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Synthèse partielle :

$-1 - 2i$ et $-1 + 2i$ sont appelés nombres complexes.

Définition :

On appelle l'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres z de la forme :

$$z = a + bi \quad \text{avec } (a, b) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } i^2 = -1$$

Autrement dit la bijection de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{C}$ qui à tout couple $(a ; b) \mapsto a + bi$.

Le nombre réel a s'appelle la partie réelle de z notée : $Re(z)$.

Le nombre réel b s'appelle la partie imaginaire de z noté : $Im(z)$.

La forme $z = a + bi$ est appelée forme algébrique.

Activité 2 : Affixe d'un point, d'un vecteur

On se place dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u} ; \vec{v})$. Au point M de coordonnées $(a ; b)$, on peut associer le nombre complexe $z = a + bi$.

a) Placer dans le plan complexe, les points d'affixes :

$$z_1 = 2 + 3i \quad ; \quad z_2 = 3 + i \quad ; \quad z_3 = -1 + 2i \quad ; \quad z_4 = 2 - i$$

$$z_5 = i \quad ; \quad z_6 = -i \quad ; \quad z_7 = 1 \quad ; \quad z_8 = -i - 3$$

$$z_9 = 2z_1 - 3z_2 \quad ; \quad z_{10} = z_3(z_4 - z_2).$$

b) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{OM_1}$; $\overrightarrow{M_2M_3}$; $\overrightarrow{OM_4}$.

Synthèse partielle :

a) Théorème :

- A tout nombre complexe $z = a + bi$, on peut faire correspondre un point $M(a ; b)$ dans un plan ortho normal $(O ; \vec{u} ; \vec{v})$. On dit que z est l'affixe de M , on écrit alors $M(z)$.
- Au point M de coordonnées $(a ; b)$, on peut associer le nombre complexe $z = a + bi$. On dit que $z = a + bi$ est l'affixe de M .
- Au vecteur $\vec{V}$ de coordonnées $(a ; b)$, on peut associer le nombre complexe $z = a + bi$. On dit que $z = a + bi$ est l'affixe de $\vec{V}$.

b) Propriétés :

- Si M a pour affixe $z = a + bi$ et M' a pour affixe $z' = a' + b'i$ avec a, a', b, b' réels, alors : Le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a pour affixe $z - z' = (a' - a) + i(b' - b)$.
- Si $\vec{V}$ a pour affixe z et $\vec{V}'$ a pour affixe z' , alors $\vec{V} + \vec{V}'$ a pour affixe $z + z'$.
- Si k est un réel, alors $k\vec{V}$ a pour affixe kz .

Activité 3 : Somme, produit, quotient de deux complexes

a) Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants.

$$z_1 = (2 + 5i) + (3 - 7i) \quad ; \quad z_2 = (2 + 5i) - (3 - 7i) \quad ; \quad z_3 = (2 + 5i)(3 - 7i)$$

$$z_4 = (2 + 5i)(2 - 5i) \quad ; \quad z_7 = i^4 \quad ; \quad z_8 = (1 + i)^2$$

b) Calculer $(3 + 2i)(3 - 2i)$. En déduire la forme algébrique de :

$$\frac{1}{3+2i} \quad \text{et} \quad \frac{3+i}{3+2i}$$

Synthèse partielle :

L'addition, la soustraction et la multiplication dans $\mathbb{C}$ sont définies de la façon suivante :

Soit a, a', b, b' des nombres réels.

- $(a + bi) + (a' + b'i) = (a + a') + i(b + b')$
- $(a + bi) - (a' + b'i) = (a - a') + i(b - b')$
- $(a + bi)(a' + b'i) = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$
- L'inverse de $a + bi$ s'obtient par la formule $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$

$$\text{Ainsi le quotient : } \frac{a+bi}{a'+b'i} = (a' + b'i) \frac{1}{a+bi} = \frac{(a'+b'i)(a-bi)}{a^2+b^2}$$

Activité 4 : Conjugué d'un complexe

Soit z un nombre complexe dont la forme algébrique est $z = a + bi$.

On appelle le nombre conjugué de z , le nombre noté $\bar{z}$ tel que : $\bar{z} = a - bi$

a) Trouver la forme algébrique du complexe $z = \frac{2+i}{3+2i}$ en multipliant la numérateur et le dénominateur par le complexe conjugué du dénominateur.

b) Faire de même pour :

$$z_1 = \frac{1}{2+7i} \quad ; \quad z_2 = \frac{4}{\sqrt{3}+i} \quad ; \quad z_3 = \frac{2-i}{5+3i} \quad ; \quad z_4 = \frac{i}{1-3i} \quad ; \quad z_5 = \frac{2+i}{i}$$

Synthèse partielle :**Propriétés :**

Soit z un nombre complexe et $\bar{z}$ son conjugué. On a :

- $z \times \bar{z} = a^2 + b^2$
- $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ et z est un imaginaire pur équivaut à : $z + \bar{z} = 0$ ou $z = -\bar{z}$
- $z - \bar{z} = 2\text{Im}(z)$ et z est réel équivaut à : $z - \bar{z} = 0$ ou $z = \bar{z}$

Pour tous complexes z et z' , on a :

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$; $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$; $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$ $n \in \mathbb{N}^*$
- avec $z' \neq 0$, on a : $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$

Evaluation formative :

1) Donner la forme algébrique du conjugué $\bar{z}$ du complexe suivant : $z = \frac{3-i}{1+i}$.

2) Dans le plan complexe, M est le point d'affixe $z = x + yi$, x et y réels,

A tout complexe z , $z \neq 1$, on associe : $Z = \frac{5z-2}{z-1}$.

a) Exprimer $Z + \bar{Z}$ en fonction de z et $\bar{z}$.

b) Démontrer que « Z est un imaginaire pur » équivaut à « M est un point d'un cercle privé d'un point ».

Activité 5 : Module et argument d'un nombre complexe**Activité 5-1 : Module d'un nombre complexe**

Soient $z = 2 + 2i$ et $z' = 3 - 4i$

Placer les points M et M' d'affixe respectives z et z' .

Calculer la distance $\|\overrightarrow{OM}\|$ et $\|\overrightarrow{OM'}\|$

$2\sqrt{2}$ est la distance de O à M

Synthèse partielle :

On appelle module de z , la distance OM , noté $|z|$ tel que : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Activité 5-2 : propriétés de module

Calculer le module de chacun des nombres complexes :

$$z_1 = 3 + 4i \quad ; \quad z_2 = 1 - i \quad ; \quad z_3 = 5 - \frac{i}{2} \quad ; \quad z_4 = 3 \quad ; \quad z_5 = i - 4 \quad ; \quad z_6 = i$$

$$z_7 = 2 \quad ; \quad z_8 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \quad ; \quad z_9 = z_1 \times z_2 \quad ; \quad z_{10} = z_2 + z_5 \quad ; \quad z_{11} = \frac{z_1}{z_5}$$

Quelle égalité obtenez-vous ?

Synthèse partielle :

Pour tous nombres complexes non nuls, on a :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \quad ; \quad |z \times z'| = |z| \times |z'| \quad ; \quad \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$$

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad ; \quad |z^n| = |z|^n$$

Activité 5-3 : Argument d'un nombre complexe

a) Placer le point M d'affixe $z = 2 + 2i$ dans un repère orthonormé direct (O ; $\vec{u}$; $\vec{v}$).

b) Calculer la distance OM (c'est-à-dire $|z|$)

- c) Soit θ la mesure de l'angle $(\vec{u} ; \overrightarrow{OM})$. Calculer $\cos \theta$ et $\sin \theta$.
 d) En déduire la mesure en radian de θ .
 Le nombre $\theta = \frac{\pi}{4}$ est appelé argument de z .

Synthèse partielle :

Soit z un complexe non nul de forme algébrique $a + bi$ et soit M , le point d'affixe z .

On appelle argument de z , noté $\arg(\theta)$, toute mesure θ de l'angle $(\vec{u} ; \overrightarrow{OM})$ telle que :

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{a}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{b}{|z|} \end{cases} \quad \text{avec } \theta = \arg(z) [2\pi]$$

Remarque :

θ n'est pas unique, il est défini à $2k\pi$ près ($k \in \mathbb{Z}$) c'est-à-dire modulo 2π .

Propriétés :

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls, on a :

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') \quad \text{modulo } 2\pi \quad ; \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) \quad \text{modulo } 2\pi$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') \quad \text{modulo } 2\pi \quad ; \quad \arg(z^n) = n \arg(z) \quad \text{modulo } 2\pi$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \quad \text{modulo } 2\pi \quad ; \quad \arg(-z) = \arg(z) + \pi \quad \text{modulo } 2\pi$$

Evaluation formative :

- a) Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 1 + i \quad ; \quad z_2 = 1 - \sqrt{3}i \quad ; \quad z_3 = -4 + 3i$$

- b) en déduire le module et l'argument de $z_1 \times z_2$; $\frac{z_2}{z_1}$; $(z_3)^4$

Activité 6 : Forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul

Soit $z = a + bi$ et θ la mesure de l'angle $(\vec{u} ; \overrightarrow{OM})$ telle que :

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{a}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{b}{|z|} \end{cases}$$

Ecrire le complexe z en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

L'écriture $|z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ est la forme trigonométrique de $z = a + bi$.

Synthèse partielle :

On appelle forme trigonométrique d'un nombre complexe $z = a + bi$ ($z \neq 0$), l'écriture :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{avec } r = |z| \quad \text{et } \theta = \arg(z) \quad [2\pi]$$

Evaluation formative :

- 1) a) Donner les formes trigonométriques de :

$$z_1 = 1 + i \quad ; \quad z_2 = \sqrt{3} + i \quad ; \quad z_3 = 1 - i\sqrt{3} \quad ; \quad z_4 = i$$

- b) Placer les points correspondants dans un cercle trigonométrique.

- 2) Soient $z_1 = 2 + 2i$ et $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$.

Ecrire z_1 et z_2 sous la forme trigonométrique. En déduire les formes trigonométriques de :

$$z_1 \times z_2 \quad ; \quad \frac{z_1}{z_2} \quad ; \quad (z_1)^3 \quad ; \quad \bar{z}_1 \quad ; \quad -z_2 \quad ; \quad \frac{z_1^2}{z_2}$$

Activité 7 : Résolution d'équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Activité 7-1 : Equation du second degré à coefficients réels

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$2z^2 + z - 3 = 0 \quad ; \quad z^2 - 2z + 2 = 0 \quad ; \quad 4z^2 + 4z + 1 = 0$$

Synthèse partielle :

Toute équation du second degré dans $\mathbb{C}$ admet toujours deux solutions distinctes ou confondues. Si cette équation est à coefficients réels, c'est-à-dire :

$$az^2 + bz + c = 0 \quad \text{avec } a \in \mathbb{R}^*, \quad b \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad c \in \mathbb{R}$$

Elle admet comme solutions dans $\mathbb{C}$.

1) Si $\Delta > 0$, deux solutions réelles : $z_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

2) Si $\Delta = 0$, une solution réelle double : $z_0 = \frac{-b}{2a}$

3) Si $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjugués avec $\Delta = i^2|\Delta|$.

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

Activité 7-2 : Exemple de factorisation de polynômes dans $\mathbb{C}$

a) Soit $\delta = a + bi$, déterminer le complexe δ tel que : $\delta^2 = 2i$

b) Factoriser le trinôme $P(z) = (1 - i)z^2 - \sqrt{2}z + \frac{1}{2} = 0$

Les complexes $1 + i$ et $-1 - i$ sont les racines carrées complexes de $2i$.

Synthèse partielle :

Les racines du polynôme d'indéterminée $P(z) = az^2 + bz + c$; où a, b et c sont des nombres complexes avec $a \neq 0$, sont :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \quad ; \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

où δ est l'une des deux racines carrées complexes du discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

On a alors la forme factoriser : $P(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$

Remarque :

Les racines carrées de Δ sont δ et $-\delta$, donc remplacer δ par $-\delta$ ne fait qu'échanger z_1 et z_2

Plus généralement, soient $u = x + yi$ et $z = a + bi$. On appelle racine carrée complexe de z , le complexe u tel que : $u^2 = z$

$$\text{Résoudre } u^2 = z \text{ revient à résoudre le système : } \begin{cases} x^2 + y^2 = |z| \\ x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

Activité 8 : Application à la résolution dans $\mathbb{C}$ d'équations de degré 3 ou 4

Soit l'équation dans $\mathbb{C}$ suivante : $z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = 0$.

1) Montrer que i est solution de cette équation.

2) Déterminer les réels a, b et c tel que :

$$z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

3) Résoudre alors cette équation.

Interprétation géométrique de ces notions :

1. Configurations du plan et nombres complexe :

Configuration	Caractérisation géométrique	Caractérisation complexe
Triangle ABC isocèle en A	$AB = AC$ $\text{mes } \hat{A} = \alpha$ $(0 < \alpha < \pi)$	$\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = e^{i\alpha}$ ou $\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = e^{-i\alpha}$ $a \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$
Triangle ABC équilatéral	$AB = AC = BC$ $\text{mes } \hat{A} = \text{mes } \hat{B} = \text{mes } \hat{C} = \frac{\pi}{3}$	$\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ou $\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$
Triangle ABC rectangle et isocèle en A	$AB = AC$ $\text{mes } \hat{A} = \frac{\pi}{2}$	$\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = i$ ou $\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = -i$
Triangle ABC rectangle en A	$\text{mes } \hat{A} = \frac{\pi}{2}$	$\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = ib (b \in \mathbb{R}^*)$
Points A, B, C alignés	$\text{mes}(\widehat{AB}, \widehat{AC}) = 0[\pi]$	$\frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}^*$
Points A, B, C, D Cocyclique	$\text{mes}(\widehat{CA}, \widehat{CB}) = 0[\pi]$	$\frac{z_C - z_B}{z_C - z_A} \cdot \frac{z_D - z_B}{z_D - z_A} \in \mathbb{R}^*$

2) Transformations et nombres complexes :

Les transformations et nombres complexes sont résumés dans un tableau comme suite :

Nous indiquons dans le tableau2 ci-dessous l'écriture complexe de certaines transformations du plan. Dans ce tableau, $M(z)$ et $M'(z')$ désignent un point et son image, ainsi que leurs affixes, par chacun de ces transformations.

Transformation	Image M' d'un point M	Définition géométrique	Ecriture complexe
Translation de vecteur $\vec{u}(a)$		$\overline{MM'} = \vec{u}$	$z' = z + a$
Symétrie de centre $\Omega(w)$		$\overline{\Omega M'} = -\overline{\Omega M}$	$z' - w = -(z - w)$
Symétrie par rapport à l'axe réel		$\begin{cases} OM' = OM \\ (\vec{e}_1, \overline{OM'}) = -(\vec{e}_1, \overline{OM}) \end{cases}$	$z' = \bar{z}$
Symétrie par rapport à l'axe imaginaire		$\begin{cases} OM' = OM \\ (\vec{e}_1, \overline{OM'}) = \pi - (\vec{e}_1, \overline{OM}) \end{cases}$	$z' = -\bar{z}$
Homothétie de centre $\Omega(w)$ et de rapport k		$\overline{\Omega M'} = k\overline{\Omega M}$	$z' - w = k(z - w)$
Rotation de centre $\Omega(w)$ et d'angle α		$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ \text{Mes}(\overline{\Omega M}, \overline{\Omega M'}) \equiv \alpha [2\pi] \end{cases}$	$z' - w = e^{i\alpha}(z - w)$

Evaluation formative :

I. Soit les complexes $-1 - i$; $1 + i$; $-1 + i$ d'image respective les points A, B, C

a) Déterminer le module et l'argument de $z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$

b) Quelle est la nature du triangle ABC ?

II. Soit la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $2 + i$

a. Déterminer l'écriture complexe de la translation t .

b. soit $z = x + yi$ et $z' = x' + y'i$. Détermination de l'expression analytique de la translation t

III. Soit h l'homothétie de centre Ω d'affixe $3 - i$ et de rapport -2 .

a. Déterminer l'écriture complexe de h

$$z' = -2z + 9 - 3i$$

b. Déterminer l'expression analytique de h

IV. Soit la rotation r de centre A d'affixe $z_A = 3i$ et d'angle $\theta = \frac{\pi}{3}$.

a) Déterminer l'écriture complexe de rotation.

b) Déterminer l'expression analytique de r .

3) Application à l'étude des similitudes directes et indirectes

a) Similitude directe :

Soit M et M' deux points d'affixe respective z et z' . Soit Ω un point du plan d'affixe z_Ω .

Déterminons l'écriture complexe de la similitude directe s de centre Ω et de rapport k ($k \in \mathbb{R}$) et d'angle θ .

$$s(M) = M' \Rightarrow \begin{cases} \Omega M' = k \Omega M \\ \arg\left(\frac{z_{\Omega M'}}{z_{\Omega M}}\right) = \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |z' - z_\Omega| = k|z - z_\Omega| \\ \arg\left(\frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}\right) = \theta \end{cases} \Rightarrow \frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega} = k e^{i\theta}$$

$$\Rightarrow (z' - z_\Omega) = k e^{i\theta} (z - z_\Omega) \Rightarrow z' = k e^{i\theta} (z - z_\Omega) + z_\Omega$$

$$\Rightarrow z' = k e^{i\theta} z + (1 - k e^{i\theta}) z_\Omega \text{ est l'écriture complexe de la similitude directe de centre } \Omega \text{ de}$$

rapport k et d'angle θ .

- L'écriture complexe d'une similitude est de la forme $z' = az + b$ où a et b sont des nombres complexes tel que ($a \neq 1$) avec $a = k e^{i\theta} \Rightarrow |a| = k$ et $\arg a = \theta$

$$b = (1 - k e^{i\theta}) z_\Omega \Rightarrow z_\Omega = \frac{b}{1 - k e^{i\theta}} = \frac{b}{1 - a}$$

Exemple :

Déterminons la nature et les éléments caractéristiques des transformations suivantes :

a) $z' = (1 + \sqrt{3}i)z + 1 + i$; b) $z' = -iz + 1 - 2i$

b) Similitude indirecte :

L'écriture complexe d'une similitude indirecte de rapport k et d'angle Ω d'affixe z_Ω et d'angle θ .

$$z' = k e^{i\theta} \bar{z} + (1 - k e^{i\theta}) z_\Omega \text{ on a } z' = a \bar{z} + b$$

Exercices :

Exo1 : Soit $z = \frac{2iz-1}{z+1}$; $z \neq 1$

1) Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z .

2) Trouver l'ensemble ($\mathcal{J}$) des point M d'affixe z du plan pour que :

a) z soit imaginaire pure ;

b) z soit réel.

3) Trouver l'ensemble des points M du plan tel que : $|z| = 2$

Exo2 : Soit l'équation (E), $z \in \mathbb{C}$: $iz^3 + (4 - 3i)z^2 - (8 + 3i)z + 8i = 0$

1) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pur z_0 à déterminer.

2) Déterminer les nombres complexes a, b, c tels que :

$$iz^3 + (4 - 3i)z^2 - (8 + 3i)z + 8i = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

3) Résoudre l'équation (E).

4) Le plan complexe est muni d'un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$, soit les points A, B, C d'affixe respective $i, 1 + 2i$ et $2 + i$.

a) Place les points A, B, C .

b) Calculer $AB, AC, BC, (\widehat{AC}, \widehat{AB})$. En déduire la nature du triangle ABC .

c) Déterminer z l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme puis place le point D .

Activité 8 : Formule de Moivre - Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe

Activité 8-1 : Formule de Moivre

a) Ecrire les complexes suivants sous forme trigonométrique :

$$z = 1 + i \quad ; \quad z' = 1 - \sqrt{3}i$$

b) En déduire la forme trigonométrique de $z_1 = z^{18}$; $z_2 = z^{2021}$

c) Si $z = \cos x + i \sin x$. Déduire de a) et b) que l'expression de z^n .

Synthèse partielle :

$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ est appelée formule de Moivre

Activité 8-2 : Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe

a. Soit $z = 1 + \sqrt{3}i$. Ecrire z sous la forme trigonométrique ou exponentielle.

b. Soit $w = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. Trouver les nombres complexes w tels que : $w^3 = z$

Synthèse partielle :

$w^3 = z$. On dit que w est une racine cubique de z .

Soit n un entier naturel strictement inférieur à 1 et z étant un nombre complexe non nul. On appelle racine $n^{\text{ième}}$ de z tout nombre complexe w tel que :

$$w^n = z.$$

Posons $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $w = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$

$$w^n = z \Leftrightarrow \rho^n(\cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha)) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Par identification :

$$\begin{cases} \rho^n = r \\ n\alpha = \theta + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \alpha = \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{cases} \text{ avec } k \in \{0, 1, 2, 3, 4, \dots, n-1\}$$

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right) \quad \text{ou} \quad z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)}$$