

Jeudi 26 Novembre 2020

LCA

2020-2021

DEVOIR N°1 MATHÉMATIQUES 1<sup>ère</sup> D : 2H

**EXERCICE 1 : 4pts** Une réponse juste rapporte 0,5 pt et une réponse fautive enlève 0,25pt.

Abtiens-toi de tricher sur ton voisin ou de noter n'importe quoi et n'importe comment.

Dans chaque cas, dis si le discriminant (s'il existe) du polynôme P donné est :

soit nul, soit négatif, soit positif ou bien n'existe pas en relevant sur ta copie 1. POSITIF comme indiqué en ligne 1. (N.B : aucune erreur dans l'écriture des polynômes même pas à la ligne 5.

Si tu connais ton cours, nul besoin de calculer  $\Delta$  pour en deviner son signe.)

N°	Le discriminant (s'il existe) du polynôme P donné est:	NUL	NEGATIF	POSITIF	N'EXISTE PAS
1	$P(x) = -5x^2 + 2x + 4$			<del></del>	
2	$P(x) = 2\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 16$				
3	$P(x) = 2x^3 - 3x + 1$				
4	$P(x) = 1 - 2x^2 + 3x$				
5	$P(x) = -3x^2 + \sqrt{5} - 1$				
6	$P(x) = -4x^2 + 4x\sqrt{3} - 3$				
7	$P(x) = 3(-2x + \sqrt{5})^2$				
8	$P(x) = -3x^2 - (\sqrt{3} - 1)x$				
9	$P(x) = \left(-x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{5}}x - 2\right)$				

**EXERCICE 2 : 3,5pts** Une réponse juste rapporte 0,5 pt et une réponse fautive enlève 0,25pt.

Abtiens-toi de tricher sur ton voisin ou de noter n'importe quoi et n'importe comment.

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Ecris-la sur ta copie selon le format

1.A ou 1.B ou 1.C s'agissant par exemple de la réponse 1. de la question 1.

Soit un trinôme :  $P(x) = ax^2 + bx + c$  ; avec  $a \neq 0$  et  $b, c$  des réels.  
 de discriminant  $\Delta$  et de courbe représentative  $(C_f)$  dans un repère orthogonal  $(O, I, J)$

1. La courbe représentative  $(C_f)$  est appelée :

A. hyperbole      B. parabole      C. semi-parabole

2. La courbe représentative  $(C_f)$  coupe l'axe des abscisses en un seul point signifie que :

A.  $\Delta < 0$       B.  $\Delta > 0$       C.  $\Delta = 0$

3. La courbe représentative  $(C_f)$  coupe l'axe des abscisses en aucun point signifie que :

A.  $\Delta < 0$       B.  $\Delta > 0$       C.  $\Delta = 0$

4. La courbe représentative  $(C_f)$  coupe l'axe des abscisses en exactement deux points signifie que :

A.  $\Delta < 0$       B.  $\Delta > 0$       C.  $\Delta = 0$

5. Si le discriminant  $\Delta$  du trinôme  $ax^2 + bx + c$  est strictement positif alors il admet :

A. 02 solutions      B. 02 zéros      C. 01 unique zéro

6. Si le discriminant  $\Delta$  du trinôme  $ax^2 + bx + c$  est strictement positif alors, la somme S de ses deux zéros distincts est :

A.  $S = -\frac{b}{a}$       B.  $S = \frac{b}{a}$       C.  $S = \frac{c}{a}$

7. Si le discriminant  $\Delta$  du trinôme  $ax^2 + bx + c$  est strictement positif alors, le produit P de ses deux zéros distincts est :

A.  $P = -\frac{c}{a}$       B.  $P = \frac{c}{a}$       C.  $P = -\frac{b}{a}$

**EXERCICE 3 : 5pts**

- 1) Sans utiliser le discriminant, résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $1 - 2x^2 = 0$
- 2) Sans utiliser le discriminant, résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $-2x^2 + 3x + 6 = 6$
- 3) Dresse le tableau de signes de :  $-3x^2 - 3$  suivant les valeurs de  $x$ . *(Que le tableau sans plus)*
- 4) Dresse le tableau de signes de :  $-3x^2 + 3$  suivant les valeurs de  $x$ . *(Que le tableau sans plus)*
- 5) Dresse le tableau de signes de :  $-3(x + 1)^2$  suivant les valeurs de  $x$ . *(Que le tableau sans plus)*
- 6) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation suivante :  $-2x^2 - x - 5 < 0$ .
- 7) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation suivante :  $(1 - 3x)(3x - 1) \geq 0$ .

8) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation suivante :  $\frac{1-x}{(x-1)(2x-1)} \geq 0$

9) On considère l'équation suivante (E) :  $x^2 - (2 - \sqrt{2})x - 2\sqrt{2} = 0$ .

- a) Justifie que :  $\Delta = (2 + \sqrt{2})^2$ .
- b) En déduire les solutions de (E).

**EXERCICE 4 : 5pts**

1. Factorise  $-2x^2 + x + 15$
2. On considère le polynôme P défini par :  $P(x) = -2x^3 - 3x^2 + 17x + 30$
- a) Vérifie que  $-2$  est un zéro de P.
- b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :  $P(x) = 0$
- c) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation :  $P(x) > 0$

**EXERCICE 5 : 2,5pts**

Dans un triangle rectangle, un côté de l'angle droit mesure 52 cm.

Calcule l'autre côté de l'angle droit et l'hypoténuse sachant que le périmètre du triangle vaut 156 cm.

**EXERCICE 5 bis**

Une entreprise produit entre 2 et 50 appareils électroménagers par heure.

Le coût horaire de production de  $x$  appareils en euros est donné par

:  $C(x) = x^2 + 50x + 76$  pour  $2 \leq x \leq 50$ .

Le prix de vente unitaire d'un appareil est de 90 euros.

On suppose que tout appareil produit est vendu.

1. a) Détermine les coûts fixes. b) Exprime en fonction de  $x$  la recette totale  $R(x)$ .
2. En déduire que le bénéfice horaire réalisé par la fabrication et la vente de ces  $x$  appareils est donné par la fonction B définie par :  $B(x) = -x^2 + 40x - 76$ .
3. a) Détermine le bénéfice pour 20 appareils vendus b) Ecris  $B(x)$  sous forme canonique.
- c) Dresse le tableau de variations de B.
4. En déduire le nombre d'appareils à produire pour que le bénéfice horaire soit maximal et la valeur de ce bénéfice.
5. Etudie le signe de  $B(x)$  suivant les valeurs de  $x$ .
6. L'entreprise réalise-t-elle toujours un bénéfice ? Justifie