Niveau : T.L.C

Date : lundi 30 septembre 2019

Durée : 1h30 min

DEVOIR N°1 : DEVOIR DE PHYSIQUE-CHEMIE

EXERCICE 1 (10 points)

Deux solides S_1 et S_2 sont animés chacun d'un mouvement rectiligne uniformément varié. On étudie leurs mouvements dans le repère $(O; \vec{i})$. Le solide S_1 se déplace de O' vers A et S_2 se déplace de A vers O' .

Données : $O'A=160\text{m}$; $O'O=14,4\text{m}$

origines des espaces : le point O

origine des dates : l'instant où S_1 passe par M_0 .

- Le solide S_1 est mis en mouvement au point O' . A l'instant $t=0\text{s}$, il est au point M_0 d'abscisse X_0 avec la vitesse V_0 . Dans le tableau ci-dessous, on donne pour différentes dates t , les abscisses X_i des positions M_i correspondantes.

Instant $t(\text{s})$	0	8	16
Position	M_0	M_1	M_2
$X_i(\text{m})$	$X_0=-8$	$X_1=11,2$	$X_2=43,2$

- Détermine la vitesse V_0 de S_1 lorsqu'il passe par M_0 et son accélération a .
 - En déduis les équations horaires du mouvement de S_1 .
2. ~~10~~ secondes (~~4s~~) après le départ de S_1 , le solide S_2 est lancé au point A avec un vecteur vitesse $\vec{V}_A$ de valeur $V_A = 10 \text{ m.s}^{-1}$. Il passe par le point M_2 avec une vitesse nulle. $V_A = 14,34 \text{ m.s}^{-1}$

 - Détermine l'accélération a' de S_2 .
 - Reproduis la figure 1 et représente au point A le vecteur vitesse $\vec{V}_A$ et le vecteur accélération $\vec{a}'$.
Échelle : 1cm représente 5 m.s^{-1} et 1 cm représente $0,25 \text{ m.s}^{-2}$.
 - Au point A , précise si le mouvement de S_2 est accéléré ou décéléré. Justifie la réponse.
 - Établis les équations horaires du mouvement du solide S_2 .
 - Montre que S_1 et S_2 ne se rencontrent pas lors de la montée de S_2 .
3. Le solide S_2 rebrousse chemin lorsqu'il atteint le point le plus haut de sa trajectoire avec la même accélération. A la date t_c , Les solides S_1 et S_2 se rencontrent au point C .

 - Calcule le temps t_c de la rencontre.
 - En déduis l'abscisse X_c du point C .

EXERCICE (10 points)

1. La combustion complète d'un hydrocarbure A non cyclique de formule brute C_xH_y produit 17,6 g de dioxyde de carbone et 7,2 g d'eau.
 - 1.1. Exprime la masse molaire M_A de ce composé en fonction de x et y .
 - 1.2. Écris l'équation-bilan de cette combustion.
 - 1.3. Établis la relation entre x et y .
 - 1.4. En déduis la formule brute du composé sachant que sa masse molaire est $M_A = 56 \text{ g.mol}^{-1}$.
2. Deux alcools saturés B et C, isomères, ont pour masse molaire $M=74 \text{ g.mol}^{-1}$. Chauffés sur l'alumine vers 450°C , ils conduisent au même hydrocarbure A.
 - 2.1. Détermine la formule brute des alcools B et C.
 - 2.2. Écris les formules semi-développées des alcools, nomme-les et précise leur classe. *Sans les identifier*
 - 2.3. Écris la formule semi-développée et le nom du composé A.
 - 2.4. Écris l'équation bilan de l'obtention de A (avec les formules semi-développées).
3. Pour identifier les produits les alcools B et C, on procède à leur oxydation ménagée.
 - Le composé B ne donne aucune réaction avec les oxydants usuels ;
 - Le composé C réagit avec le dichromate de potassium en milieu acide. Le composé D résultant de cette réaction donne un précipité jaune avec la 2,4 - D. N. P. H et réagit avec la liqueur de Fehling.
 - 3.1. En déduis la formule semi-développée et le nom du composé B.
 - 3.2. Donne la fonction chimique, la formule semi-développée et le nom du composé D.
 - 3.3. En déduis la formule semi-développée et le nom du composé C.
 - 3.4. Écris l'équation-bilan de l'oxydation de C par le dichromate de potassium en milieu acide (avec les formules semi-développées).

On donne les masses molaires (en g.mol^{-1}) : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$