ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE
APPLIQUEE (ENEA)
DEPARTEMENT DE STATISTIQUE
BP 5084
DAKAR - SENEGAL

INSTITUT SOUS REGIONAL DE
STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE
YAOUNDE - CAMEROUN

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE
ET D'ECONOMIE APPLIQUEE
ABIDJAN

AVRIL 2001

CONCOURS D'ELEVE INGENIEUR DES TRAVAUX STATISTIQUES

VOIE A

DEUXIEME EPREUVE DE MATHEMATIQUES

DUREE : 3 HEURES

Exercice n° 1

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n , où $n \geq 3$. On suppose que le tirage de chacune des boules est équiprobable.

On tire une boule, on note son numéro et on le remet dans l'urne. Puis on tire une seconde boule, on en note le numéro.

On appelle X la variable aléatoire définie de la façon suivante :

- 1) si les deux numéros sont égaux, X prend leur valeur commune
- 2) si les deux numéros sont différents, X prend la valeur du plus grand des deux

1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

$$E_2: X = 2$$

$$E_3: X = 3$$

$$E_p: X = p, \text{ où } p \text{ est un entier tel que } 1 \leq p \leq n.$$

2) Calculer l'espérance de X . On utilisera les expressions de :

$$\sum_{p=1}^n p \quad \text{et} \quad \sum_{p=1}^n p^2$$

Exercice n° 2

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose :

$$I_n = \frac{1}{2^{n+1} n!} \int_0^1 (1-t)^n e^{\frac{t}{2}} dt$$

- 1) Calculer I_1 à l'aide d'une intégration par parties.
- 2) Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a :

$$I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2^{n+1} (n+1)!}$$

- 3) En déduire par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a :

$$\sqrt{e} = 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{2^n} \frac{1}{n!} + I_n$$

- 4) Montrer qu'on peut trouver une constante A telle que :

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{2^n n!} A$$

On pourra déterminer A en majorant sur l'intervalle $[0, 1]$ la fonction :

$$t \rightarrow (1-t)^n e^{t/2}$$

En déduire la limite quand n tend vers l'infini de la suite :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{2^n} \frac{1}{n!}$$

PROBLEME

On considère le plan affine euclidien $\mathbf{P}$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; $\mathbf{C}$ est l'ensemble des nombres complexes et i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\pi/2$. On définit pour tout z de $\mathbf{C}$ les deux applications f et g de $\mathbf{C}$ dans $\mathbf{C}$ par :

$$f(z) = z^3 + 4(1 - i)z^2 - 2(2 + 7i)z - 16 + 8i$$

$$g(z) = z^3 + 2 - 2i$$

1)

- 1) Déterminer le module et l'argument de chacun des nombres complexes z qui vérifient $g(z)=0$. Représenter dans le plan les points ayant pour affixes les nombres trouvés. Quelle est la nature du triangle formé par ces points.
- 2) Montrer qu'il existe un réel unique r , que l'on déterminera, qui vérifie $f(r)=0$. Déterminer les deux nombres complexes a et b de façon à avoir :

$$f(z) = (z - r)(z^2 + az + b) \text{ pour tout } z \text{ de } \mathbf{C}$$

- 3) Résoudre dans $\mathbf{C}$ l'équation $f(z) = 0$. Démontrer que les points dont les affixes sont solutions de cette équation forment un triangle rectangle dans le plan $\mathbf{P}$.
- 4) Soient A, B, C les points de $\mathbf{P}$ dont les affixes respectives sont : $-1+3i, 1+i$ et -4 . Déterminer l'affixe du barycentre G des points A, B, C affectés respectivement des coefficients 4, 3 et 5.
- 5) On désigne par h l'application du plan $\mathbf{P}$ vers l'ensemble des réels $\mathbf{R}$ qui à tout point M de $\mathbf{P}$ associe le réel :

$$h(M) = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}.$$

où $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ désigne le produit scalaire de deux vecteurs.

Calculer $h(A)$ et $h(C)$. Exprimer $h(M)$ en fonction de $\|\overrightarrow{MG}\|^2$ et $h(G)$. Déterminer et dessiner l'ensemble des points M de $\mathbf{P}$ qui vérifient $h(M) = 18$. Justifier le choix du nombre 18.

II) A tout point M de $\mathbf{P}$ d'affixe z on associe le point M' d'affixe $f(z) - g(z)$

- 1) Déterminer les coordonnées (x', y') de M' dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ en fonction des coordonnées (x, y) de M dans le même repère.
- 2) A, B, C étant les points définis en I-4), donner une équation de l'ensemble H_1 des points M de $\mathbf{P}$ tels que O, B et M' soient alignés (où O est l'origine du repère).

Montrer que H_1 est une hyperbole dont on précisera le centre et les asymptotes.

- 3) Donner une équation de l'ensemble H_2 des points M de $\mathbf{P}$ tels que O, I, M' soient alignés, I étant le centre de gravité de A, B, C .

Montrer que H_2 est une hyperbole dont on précisera le centre et les asymptotes. Donner une équation de H_2 sous la forme $y = \varphi(x)$.

- 4) Démontrer qu'un point M est commun à H_1 et H_2 si, et seulement si, M' est confondu avec l'origine O du plan.
- 5) Résoudre dans $\mathbf{C}$ l'équation $f(z) = g(z)$. En déduire les points communs à H_1 et H_2 .

Construire les courbes H_1 et H_2 dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.