ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE
ET D'ECONOMIE APPLIQUEE
ABIDJAN

AVRIL 2000

CONCOURS D'ELEVE INGENIEUR DES TRAVAUX STATISTIQUES

VOIE B Option Mathématiques

PREMIERE EPREUVE DE MATHEMATIQUES

DUREE : 4 HEURES

PROBLEME N° 1

Pour tout n entier naturel , on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

- ❶ Montrer que pour tout n entier naturel $I_n = J_n$
- ❷ Montrer que $I_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$
- ❸ Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2}
- ❹ Calculer I_0 et I_1 et en déduire les expressions de I_n pour n pair et n impair

⑤ Montrer sans utiliser les expressions trouvées de I_n que pour tout n entier naturel $I_{n+1} \leq I_n$ et que

$$I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$$

Donner un équivalent de I_n

⑥ Montrer que pour tout t élément de $[0; \sqrt{n}]$, $0 \leq (1 - \frac{t^2}{n})^n \leq e^{-t^2}$ et que pour tout t réel ,

$$e^{-t^2} \leq \frac{1}{(1 + \frac{t^2}{n})^n}.$$

Déduire à l'aide de ce qui précède $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$

PROBLEME N° 2

Soit f une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \geq |x - y|$

① Montrer que f est strictement monotone

② En supposant que f est strictement croissante , montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

③ On suppose ici qu'il existe (a, b) appartenant à $\mathbb{R}^2, a < b$ tel que $f([a, b]) \subset [a, b]$

a - Montrer qu'il existe c élément de $[a, b]$ tel que $f(c) = c$

b - On suppose f croissante , montrer que $f(a) = a$ et que $f(b) = b$ et en déduire la forme de $f|_{[a, b]}$

c - On suppose f décroissante , déterminer $f|_{[a, b]}$

④ On suppose dorénavant que f est croissante

a - On suppose que pour tout x réel, $f(x) < x$

b - Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

Montrer que $f(x) - x$ a une limite quand x tend vers $+\infty$

Que peut-on dire si pour tout x réel, $f(x) > x$?

c - Soit $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = x\}$ montrer que si $A = \emptyset$ alors on est dans un des cas a) ou b)

PROBLEME N° 3

On considère une fonction impaire f , de période 2π , définie par : $f(x) = \frac{x}{\sin x}$ si

$x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right]$ et $f(x) = 0$ si $x \in \{0\} \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

① Calculer les coefficients de Fourier b_1 et b_2

② On rappelle que $\frac{1}{2} + \sum_{p=1}^n \cos px = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}$

a - Calculer $\frac{1}{2} + \sum_{p=1}^n (-1)^p \cos px$

b - En déduire que $\frac{\sin nx}{\sin x} = \frac{1}{2}(1 + (-1)^{n+1}) + \sum_{p=1}^n (1 + (-1)^{n+1+p}) \cos px$

c - On pose $I_p = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \cos px dx$; calculer cette intégrale selon la parité de p

d - Démontrer que $b_{2k+1} = \frac{\pi}{4} + \frac{4}{\pi} \sum_{q=1}^k I_{2q}$ pour $k \geq 1$; Calculer b_{2k}

③-

a - Etudier la convergence de la série de Fourier de f

b - En déduire que $\frac{\pi}{4} = b_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k b_{2k+1}$

c - On admet que $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$; on pose $R_k = \frac{\pi^2}{8} - \sum_{p=0}^k \frac{1}{(2p+1)^2}$

Démontrer que la série $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k R_k$ converge et calculer sa somme en utilisant la question 3.