

BACCALAURÉAT  
SESSION 2022



Durée : 4 H  
Coefficient : 5

# MATHÉMATIQUES

## SÉRIE C

Cette épreuve comporte 3 pages numérotées 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3.  
Seules les calculatrices scientifiques non graphiques sont autorisées.

### EXERCICE 1 (2 points)

Écris, sur ta feuille de copie, le numéro de chaque proposition du tableau ci-dessous suivi de **Vrai** si la proposition est vraie ou de **Faux** si la proposition est fausse.

N°	Propositions
1.	Toute isométrie du plan qui laisse invariant deux points distincts A et B est la symétrie orthogonale d'axe (AB).
2.	Soient $f$ une fonction dérivable sur un intervalle $K$ , $a$ et $b$ deux éléments de $K$ tels que : $a < b$ . S'il existe un nombre réel $M$ tel que, $\forall x \in [a; b],  f'(x)  \leq M$ , alors $-M(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$ .
3.	Une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E) : $y'' = 3y$ est la fonction : $x \mapsto 2e^{3x} + 4e^{-3x}$ .
4.	La dépendance linéaire entre deux caractères X et Y d'une série statistique à deux variables est forte si et seulement si le coefficient de corrélation linéaire $r$ est tel que : $ r  \leq 0,4$ .

### EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés du tableau ci-dessous, les informations des lignes A, B, C et D permettent d'obtenir quatre affirmations dont une seule est vraie.

Écris, sur ta feuille de copie, le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la ligne qui donne l'affirmation vraie.

N°	Enoncés	Informations
1.	Si E, F et G sont trois points distincts du plan, alors pour tout point M du plan, le vecteur $2\overrightarrow{ME} - 3\overrightarrow{MF} + \overrightarrow{MG}$ est égal à ...	A $4\overrightarrow{MF}$ .
		B $-\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EG}$ .
		C $5\overrightarrow{ME}$ .
		D $2\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{FG}$ .
2.	Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), la directrice de la parabole d'équation réduite $x^2 = 8y$ est la droite d'équation ...	A $y = -1$ .
		B $y = 2$ .
		C $y = -2$ .
		D $y = 1$ .

3.	Arg $\left[\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^5\right]$ est égal à ...	A	$\frac{7\pi}{12}$
		B	$\frac{-5\pi}{12}$
		C	$\frac{-7\pi}{12}$
		D	$\frac{5\pi}{12}$
4.	Soit OPN un triangle rectangle isocèle en O, de sens direct et I le milieu du segment [NP]. Si une similitude directe S de centre O applique I sur P, alors l'angle et le rapport de S sont respectivement ...	A	$\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
		B	$-\frac{\pi}{4}$ et $\sqrt{2}$ .
		C	$-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
		D	$\frac{\pi}{4}$ et $\sqrt{2}$ .

### EXERCICE 3 (3 points)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on donne les points  $A(0; 4; 1)$ ,  $B(1; 3; 0)$ ,  $C(2; -1; -2)$ ,  $E(7; -1; 4)$  et le vecteur  $\vec{u}(2; -1; 3)$ .

- Démontrez que les points A, B et C déterminent un plan.
- Démontrez que le vecteur  $\vec{u}$  est orthogonal à chacun des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
  - Justifiez qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est :  $2x - y + 3z + 1 = 0$ .
  - Vérifiez que le point E n'appartient pas au plan (ABC).
- Soit  $(\Delta)$  la droite passant par le point E et orthogonale au plan (ABC).

On pose :  $\{K\} = (\Delta) \cap (ABC)$ .

- Déterminez une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$ .
- Justifiez que le point K a pour coordonnées  $(3; 1; -2)$ .
- Calculez la distance EK.

### EXERCICE 4 (4 points)

Un employé se rend à son travail en bus. S'il est à l'heure à l'arrêt, il prend le bus de ramassage gratuit mis à sa disposition par l'entreprise. S'il est en retard, il prend le bus de ville.

On suppose que l'employé n'est pas en retard le premier jour. A partir du deuxième jour :

- si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est de  $\frac{1}{5}$ .
- si l'employé est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est de  $\frac{1}{20}$ .

Pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 2 : on appelle  $R_n$ , l'évènement : « l'employé est en retard le jour  $n$  ».

On note  $p_n$  la probabilité de  $R_n$  et  $q_n$  celle de  $\overline{R_n}$ , l'évènement contraire de  $R_n$ .

On suppose que :  $p_1 = 0$  et  $p_2 = \frac{1}{5}$ . On a :  $p_{R_n}(R_{n+1}) = \frac{1}{20}$  et  $p_{\overline{R_n}}(R_{n+1}) = \frac{1}{5}$ .

Dans tout ce qui suit, on prend  $n \geq 2$ .

- Justifiez que :  $p(R_n \cap R_{n+1}) = \frac{1}{20} p_n$  et  $p(\overline{R_n} \cap R_{n+1}) = \frac{1}{5} q_n$ .
  - Déterminez  $p_{n+1}$  en fonction de  $p_n$  et  $q_n$ .
  - Déduisez-en que :  $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20} p_n$ .
- On pose :  $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ .
  - Démontrez que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $-\frac{3}{20}$ .
  - Déterminez son premier terme  $v_2$ .
- Calculez la limite de la suite  $(v_n)$ .
  - Déduisez-en la limite de la suite  $(p_n)$ .

**EXERCICE 5** (4 points)

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $f_n$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $f_n(x) = \frac{1+n\ln(x)}{x^2}$ .  
 On désigne par  $(C_n)$  la courbe représentative de  $f_n$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, I, J)$ .  
 L'unité graphique est 3 cm.

1. a) Justifie que :  $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = -\infty$  ;  
 b) Justifie que :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$  .  
 c) Donne une interprétation graphique des résultats des questions 1.a) et 1.b).
2. a) On admet que  $f_n$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$ .  
 Justifie que  $\forall x \in ]0; +\infty[$ ,  $f_n'(x) = \frac{n-2-2n\ln(x)}{x^3}$ .  
 b) Détermine les variations de  $f_n$  sur  $]0; +\infty[$ .  
 c) Vérifie que :  $f_n\left(e^{\frac{n-2}{2n}}\right) = \frac{n}{2}e^{\frac{2}{n}-1}$ .  
 d) Dresse le tableau de variation de  $f_n$ .
3. a) Justifie que :  $\forall x \in ]0; +\infty[$ ,  $f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$ .  
 b) Déduis-en la position relative des courbes  $(C_n)$  et  $(C_{n+1})$ .
4. Soit  $I$  l'intégrale telle que :  $I = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x^2} dx$ .  
 a) A l'aide d'une intégration par parties, justifie que :  $I = 1 - \frac{2}{e}$ .  
 b) Déduis-en l'aire en  $\text{cm}^2$  de la partie du plan limitée par les courbes  $(C_n)$ ,  $(C_{n+1})$  et les droites d'équations :  $x = 1$  et  $x = e$ .

**EXERCICE 6** (5 points)

La salle du foyer des jeunes d'une commune est dans un état de dégradation avancée.  
 Le Maire, soucieux du bien-être de sa jeunesse, décide de la réhabiliter en commençant en priorité par le revêtement du sol qui est un rectangle de longueur 14,40 m et de largeur 8,70 m.  
 Pour ce faire, il instruit le chef du service technique de la Mairie qui prend attache avec un fournisseur en vue d'acheter des carreaux.

Ce dernier dispose de trois types de carreaux carrés, de côtés respectifs 18 cm ; 25 cm et 30 cm. Chaque type de carreaux est livré en paquets de 12 et de 20 carreaux.

Pour éviter le gaspillage et la surfacturation, le Maire exige :

- qu'il n'y ait pas de découpe de carreaux lors du carrelage ;
- qu'on lui communique le nombre exact de paquets de 12 et de paquets de 20 qu'il faut acheter.

Le chef du service technique pense que les carreaux de côté 30 cm conviennent si l'on veut éviter des découpes de carreaux. N'étant pas qualifié pour faire ces types de calculs, il te sollicite.

1. Vérifie si le chef du service technique a raison ou pas.
2. En supposant qu'il a raison, détermine le nombre de paquets de 20 et le nombre de paquets de 12 que le chef du service technique doit commander, sachant que le nombre de paquets de 20 est supérieur à 66.

DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS

SOUS-DIRECTION DES EXAMENS  
ET CONCOURS SCOLAIRES

SERVICE BACCALAUREAT

Le Président de la  
Commission

MENA  
INSPECTION GÉNÉRALE  
YOUSSOUF KOUYATE  
Inspecteur Général  
Tél 07 57 42 00 11

BACCALAUREAT - SESSION 2022

ÉPREUVE : ... MATHÉMATIQUES ..... DATE : 05/07/2022 HEURE 12H<sup>00</sup>

CORRIGE ET BAREME

SERIE(S) : C

CORRIGE	BAREME
<p>Ce barème est national. Il ne peut être modifié.</p> <p>Certaines réponses ont été données à titre indicatif. Cependant, toute autre démarche correcte sera acceptée.</p> <p>Le correcteur devra tenir compte de la démarche qui conduit au résultat.</p> <p>A un résultat correct non justifié ou incorrectement justifié, on accordera la moitié des points sauf si la question est notée sur 0,25. Dans ce cas, on attribuera la note 00 (zéro).</p> <p>Pour l'exercice 6, le correcteur doit attribuer les points en fonction des indicateurs et non à chaque résultat.</p> <p>Le critère de perfectionnement (CP) est à prendre en compte une seule fois pour l'exercice 6.</p>	

CORRIGE		BAREME
<b>EXERCICE 1</b> (2pts)		
1. Faux (F)	— — — —	0,5
2. VRAI (V)	— — — —	0,5
3. Faux (F)	— — — —	0,5
4. Faux (F)	— — — —	0,5
<b>EXERCICE 2</b> (2pts)		
1. D	— — — —	0,5
2. C	— — — —	0,5
3. D	— — — —	0,5
4. B	— — — —	0,5
<b>EXERCICE 3</b> (3pts)		
1. <u>Preuve</u>		
les points A, B et C non alignés (les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ non colinéaires)		0,5
2°) a) <u>Démonstration</u>		
$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} \vec{u} \perp \vec{AB} \\ \vec{u} \perp \vec{AC} \end{cases}$		0,25 x 2
b) <u>Justification</u>		0,5

2/8

CORRIGE	BAREME
c) vérification correcte — — — —	0,25
3°) a) <u>Représentation paramétrique de <math>(\Delta)</math></u> $(\Delta): \begin{cases} x = 7 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$	0,5
b) Justification correcte — — — —	0,5
c) <u>Distance EK</u>	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">EK = <math>2\sqrt{14}</math></div>	0,25

**EXERCICE 4** (4 pts)

1°) a) Justification :	
• $p(R_n \cap R_{n+1}) = p(R_n) \times p(R_{n+1}   R_n)$	0,25
• <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;"><math>p(R_n \cap R_{n+1}) = \frac{1}{20} p_m</math></div>	0,25
• On justifie de même <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;"><math>p(R_n \cap R_{n+1}) = \frac{1}{5} q_m</math></div>	0,5

CORRIGE	BAREME
<p>b) <u>Détermination</u></p>	
$p_{n+1} = p(R_{n+1}) = p(R_n \cap R_{n+1}) + p(\bar{R}_n \cap R_{n+1})$	0,25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">p_{n+1} = \frac{1}{20} p_n + \frac{1}{5} q_n</math> </div>	0,25
<p>c) • <math>p_n + q_n = 1</math> donc <math>q_n = 1 - p_n</math></p>	0,25
<p>On déduit :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20} p_n</math> </div>	0,25
<p>2. <math>V_n = p_n - \frac{4}{23}</math></p>	
<p>(a) Démonstration correcte - - - - -</p>	0,75
<p>(b) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">V_2 = \frac{3}{115}</math> </div></p>	0,25
<p>3. a) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">\lim(V_n) = 0</math> </div> avec justification correcte</p>	0,5
<p>b) <u>Déduction</u></p>	
$\begin{cases} p_n = V_n + \frac{4}{23} \\ \lim(V_n) = 0 \end{cases} \text{ donc } \div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> \lim(p_n) = \frac{4}{23}$	0,25 x 2

4/8

CORRIGE	BAREME
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">EXERCICE 5</div> <span style="margin-left: 20px;">(4/5)</span>	
$n \in \mathbb{N}^*$ $f_n(x) = \frac{1 + n \ln(x)}{x^2}, x > 0$	
1°) a) Justification correcte — — —	0,25
b) Justification correcte — — —	0,25
c) <u>Interprétation</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (OJ) ou la droite d'équation <math>x=0</math> est une asymptote à <math>(C_n)</math> — — —</li> </ul>	0,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (OI) ou la droite d'équation <math>y=0</math> est une asymptote à <math>(C_n)</math> ✓</li> </ul>	0,25
2°	
a) Justification correcte — — —	0,25
b) <u>Variations</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour <math>x \in ]0; e^{\frac{n-2}{2n}}[</math>, <math>f'_n(x) &gt; 0</math> — — —</li> </ul>	0,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour <math>x \in [e^{\frac{n-2}{2n}}; +\infty[</math>, <math>f'_n(x) \leq 0</math> — — —</li> </ul>	0,25
donc : $f_n$ est croissante sur $]0; e^{\frac{n-2}{2n}}[$ — — — et $f_n$ est décroissante sur $[e^{\frac{n-2}{2n}}; +\infty[$ — — —	} 0,25

CORRIGE	BAREME
c) Vérification correcte — — — —	0,25
d) Tableau de variations	
	0,25
3.a) Justification correcte — — — —	0,25
b) <u>Pontum relative</u>	
• $(C_{n+1})$ est en-dessous de $(C_n)$ sur $]0, 1[$	} 0,5
• $(C_{n+1})$ est au-dessus de $(C_n)$ sur $[1, +\infty[$	
4. a) Justification correcte — — — —	0,25
b) $A = \int_1^e (f_{n+1}(x) - f_n(x)) dx$ u.a. — —	0,25
$A = (9 - \frac{18}{e}) \text{ cm}^2 \approx 2,378 \text{ cm}^2$ — —	0,25

6/8

Consigne 1

- Pour répondre au chef de service technique, je vais utiliser les données données dans l'annexe.

Pour cela, je vais :

- Convertir en cm les dimensions de la salle.
- Calculer le périmètre longueur et largeur en cm.
- Rechercher la largeur du chef de service.

1<sup>er</sup> ind sur 4 : (0,25)  
 2<sup>nd</sup> ind sur 4 : (0,5)  
 à partir de 3 ind (0,75)

CM1 Pertinence

CM2 Attitude / correction des outils mathématiques.

CM3 Cohérence de la réponse

CF (entière de parfait)

\* Conversion en cm.  
 $l = 870 \text{ cm}$   
 $L = 1440 \text{ cm}$   
 \* Calcul du périmètre  
 $P(\text{rect}(l; L)) = 30$

1<sup>er</sup> ind sur 3 : (0,25)  
 à partir de 2 ind (0,5)

- Interprétation du périmètre calculé  
 - Conclure (le chef de service technique) que a voisins)

1<sup>er</sup> ind sur 2 (0,25)  
 2<sup>nd</sup> ind sur 2 (0,5)

- Présence des titres, pas de répétitions et de surcharges  
 - Production facile au peu de mots.  
 - Dernier de caractère non caractéristique (originaleté)

Consigne 2

Pour déterminer le nombre de paquets de 30 et de 12, de vrai :

- Déterminer le nombre total de cahiers de 30 cm.
- Traduire par une équation la relation entre les nombres de paquets de 30 et 12.
- Résoudre l'équation obtenue.
- Conclure.

\* Déterminer le nombre total de cahiers de 30 cm

aire de la salle :  $4 \times 6 = 1.252.800 \text{ cm}^2$

aire d'un cahier de 30 cm des caractéristiques :  $(30 \times 30) \text{ cm}^2 = 900 \text{ cm}^2$

nombre total de cahiers de 30 cm :

$1.252.800$	$=$	$1392$
$900$		

\* Équation

choix des inconnues :  $20x + 12y = 1392$

(x nombre de paquets de 20, y nombre de paquets de 12)

\* Résolution de l'équation

1 ind sur 6 :  $(0,5)$

2 ind sur 6 :  $(1,25)$

3 ind sur 6 :  $(1,5)$

Réponse en dérivant avec la dérivée utilisée

utilisée

Conclusion :  $2 > 6$  ;  $4 > 0$

Conclusion : de moins

Commentaire : 69 paquets de 20 et 1 paquet de 12

1 ind sur 3 :  $(0,25)$

à partir de 2 ind :  $(0,5)$

1 ind sur 3 :  $(0,25)$

à partir de 2 ind :  $(0,50)$

CM1 Pertinence

CM2 utilisation correcte des outils mathématiques

CM3 Cohérence de la réponse

CF (critère de perfect)

8/8