« Un champion ne devient pas champion sur le terrain mais à l'entraînement. Le terrain ne fait que révéler celui qui s'est entraîné comme un champion »

Philippe JORET

Classe : T^{le} G₂ & G₃

Fomesoutra.com
sa soutra!

FLASH DE LA SEMAINE

Date : 18 décembre 2023

Epreuve :
Mathématiques Série N. 1

Enseignant : DJABABONI

Contact : 90 68 45 14
99 83 47 17

Exercice 1

Sur la figure ci-contre, on a tracé la courbe (C_f) d'une fonction f .

- Par lecture graphique déterminer :
 - L'ensemble de définition de f .
 - Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$;
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.
 - Déterminer $f(2)$; $f'(2)$; $f(-1)$; $f'(-1)$.
 - Dresser le tableau de variation de f .
- Montrer que f réalise une bijection de $]1; +\infty[$ vers un intervalle J que l'on précisera.
 - Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\infty; 1[$.
- On pose $g(x) = \ln[f(x)]$
 - Déterminer l'ensemble de définition de g .
 - Etudier le sens de variation de g .

Exercice 2

Le tableau suivant donne l'évolution du nombre de départs à la retraite au sein d'une entreprise à effectifs stable.

année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de départ à la retraite y_i	50	53	53	58	57	59	63	64

- Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ associé à la série double dans un repère orthogonal.
- Dans cette question les résultats seront donnés à 10^{-2} près par défaut.
 - Déterminer les coordonnées du point moyen G puis placer ce point sur un graphique
 - Calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série ; arrondi à 10^{-3} près.
 - Peut-on envisager un ajustement affine ? pourquoi ?
 - Donner l'équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés.
- En supposant que l'évolution se poursuit à la même façon pour les années suivantes, déterminer une estimation, arrondi à l'entier le plus proche, du nombre de départs à la retraite dans cette entreprise en 2027.

Exercice 3

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $P(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$

- Vérifier que $P(-1) = 0$
 - Ecrire $P(x)$ sous forme d'un produit de trois facteurs du premier degré

- c. En déduire la résolution de l'inéquation $P(x) \leq 0$.
2. En utilisant les résultats de la question 1) résoudre les inéquations suivantes :
- $2(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - 5\ln x - 2 \leq 0$.
 - $\ln x^2 + \ln(2x - 1) - \ln(5x + 2) \leq 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:
- $$\begin{cases} x - 3y = 2\ln 2 \\ x + y = 4\ln 2 \end{cases}$$

Problème

Partie A

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = -1 + \frac{1}{x} - \ln x$

- Calculer les limites de g en 0 et en $+\infty$.
- On admet que la fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et g' sa dérivée.
 - Déterminer $g'(x)$ pour tout x élément de $]0; +\infty[$
 - Etudier les variations de g sur $]0; +\infty[$
 - Dresser le tableau de variation de g
- Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$.
 - Calculer $g(1)$ puis en déduire la valeur de α
- Justifier que : pour tout $x \in]0; \alpha [$, $g(x) > 0$
 Pour tout $x \in]\alpha; +\infty [$, $g(x) < 0$

Partie B

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (1 - x)\ln x$. Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) (unité graphique : 1 cm)

- Calculer :
 - La limite de f en 0 puis interpréter graphiquement le résultat.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat.
- On admet que la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et f' sa dérivée
 - Démontrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = g(x)$
 - Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.
- Démontrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f \leq 0$
- Construire la courbe $(\mathcal{C}_f)$.