

Obligatoire

1-La branche de la médecine qui étudie les maladies infectieuses est l'infectiologie
(1 point)

vrai

Faux

2-L'entérobacter est un microbe redoutable dans les infections les plus courantes en milieu hospitalier

(1 point)

vrai

faux

3-L'asepsie en chirurgie est l'absence de tout germe microbien ou de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection

(1 point)

vrai

Faux

4-La rougeur est le premier signe qui définit l'inflammation

(1 point)

vrai

Faux

5-Au cours de l'incubation, il y a multiplication du germe et élaboration des toxines

(1 point)

Vrai

Faux

6-Il y a toxi-infection à la période d'état

(1 point)

vrai

faux

7-La phlébite constitue une porte d'entrée de la septicémie à colibacille

(1 point)

Vrai

Faux

8-L'hémoculture pratiquée en cas de septicémie montre un hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles

L'hémoculture Montre une septicémie dû à la présence d'une bactérie

NFS montre un hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles

(1 point)

vrai

faux

9-L'une des causes du panaris est l'infection de la pulpe des doigts due au staphylocoque doré

(1 point)

vrai

Faux

10-La douleur spontanée pulsatile est un signe général du panaris

(1 point)

vrai

Faux

11-La douleur siégeant à la jambe ou à l'avant-bras est un signe fonctionnel et physique de la lymphangite

(1 point)

vrai

faux

12-La lymphangite est toujours accompagnée d'adénite dans son évolution

(1 point)

vrai

faux

13-L'abcès chaud résulte d'une défense locale de l'organisme

(1 point)

vrai

Faux

14-La vasoconstriction est une réaction de défense de l'inflammation en cas d'abcès chaud

(1 point)

vrai

faux

15-Si l'abcès froid est fistulisé, il est nécessaire de procéder à une exérese totale au-delà des tissus sains

(1 point)

vrai

Faux

16-L'altération de l'état général est facteur général qui favorise le furoncle

(1 point)

vrai

faux

17-L'adénite aigue ou adeno-phlegmon est une complication générale des furoncles.

(1 point)

vrai

Faux

18-Le genu varum est la déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambe en x).

(1 point)

vrai

Faux

19-L'anthrax est une agglomération de : (cocher la bonne réponse)

(1 point)

- Panaris superficiels et profonds
- Furoncles reliés entre eux par une suppuration du derme
- Phlegmons des gaines digitales moyennes

20-Deux (02) signes fonctionnels modérés de l'anthrax circonscrit de la nuque au début, parmi ceux indiqués ci-dessous :

(2 points)

- Malaise général
- Sensation de tension douloureuse
- Température variable
- Prurit
- Fébricule

21- Deux (02) signes précocement importants en cas de gangrène gazeuse traduisent la toxémie :

(2 points)

- Sensation de tension
- Accélération du pouls
- Altération du faciès
- Sensation de crépitation neigeuse
- Agitation délirante.

22- Inflammation suppurative affectant la moelle et l'os, notamment le tissu conjonctif des espaces travéculaires ; deux(02) germes sont en causes : lesquels

(2 points)

- Pneumocoque
- Staphylocoque blanc ou doré
- Colibacille
- Streptocoque
- Gonocoque

23- Les complications générales des furoncles sont : (choisir les deux bonnes réponses)

(2 points)

- La septicémie aiguë
- La lymphangite
- La bactériémie passagère
- L'adénite aiguë ou adéno-phlegmon
- L'abcès chaud circonscrit.

24- Le délai normal de consolidation d'une fracture de la diaphyse de l'humérus est de :
(1 point)

- 4 semaines
- 6 à 8 semaines
- 8 à 12 semaines

25- L'une des complications secondaires des fractures est :
(1 point)

- Le retard de consolidation.
- L'atrophie musculaire
- La lésion nerveuse

26- Le traitement des entorses graves associe deux méthodes ; lesquelles ?
(2 points)

- l'immobilisation plâtrée suivie d'une rééducation.
- La cryothérapie
- La physiothérapie
- La suture du ligament

27- lorsque la hanche est luxée chez le nourrisson avant la marche il y'a : (choisir les deux bonnes réponses).
(2 points)

- Une asymétrie des plis fessiers.
- Une déformation de la colonne vertébrale en scoliose.
- Une situation anormale de la tête du fémur.
- Bascule du bassin du côté de la luxation

28- la clinique du pied bot varus équin chez le nouveau-né associe : (choisir deux bonnes réponses).
(2 points)

- Une adduction
- Un pied tendant de plus en plus à s'enrouler sur son bord interne
- Une supination
- Un pied avec son bord externe s'allongeant
- Une attitude vicieuse du pied au repos.

29-Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes :

La moitié de la tete - les deux avant bras - la main gauche

En référence au cours sur les brulures. Selon la **règle de BAXTER**.

Pour le remplissage vasculaire, la formule utilisée à J1 est la suivante :

(Choisir la bonne réponse).

J1=

(1 point)

Localisation \ Age	Adulte
Tête	7 %
Un avant-bras	3 %
Une main	2,5 %

- J1= Poids (kg) x 5 x SCB
- J1= Poids (kg) x 3 x SCB
- J1= Poids (kg) x 4 x SCB

30-Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes :

la moitié de la tete - les deux avant bras - la main gauche

Selon la table de LUND et BROWDER, la surface corporelle brûlée est :

(1 point)

Localisation \ Age	Adulte
Tête	7 %
Un avant-bras	3 %
Une main	2,5 %

- 12 %
- 12,5 %
- 15,5 %

31-Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes :

La moitié de la tête - Les deux avant-bras - La main gauche

Le **premier jour** de la prise en charge du patient, le chirurgien décide de réhydrater.

La quantité de soluté indispensable selon la règle de BAXTER est :

(1 point)

Localisation	Age	Adulte
Tête		7 %
Un avant-bras		3 %
Une main		2,5 %

- 3500
- 1680
- 3360