

EVALUATION DES ELEVES INFIRMIERS

NIVEAU L2

SUJET 2

QUESTIONS A CHOIX DIRECT : Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)

A= VRAI B=FAUX

- 1- La MILDA est instituée pour la prévention de l'anémie chez la femme enceinte
A= VRAI B=FAUX
- 2- La CPN du 2^e trimestre permet d'évaluer le pronostic d'accouchement par voie basse
A= VRAI B=FAUX
- 3- Le RCF normal est compris entre 100 et 160 bpm
A= VRAI B=FAUX
- 4- Le traitement prophylactique anti palustre débute uniquement lorsque la femme enceinte ressent les MAF (Mouvement Actif Fœtaux)
A= VRAI B=FAUX
- 5- Les facteurs de mortalité maternelle s'expliquent par les 2 retards
A= VRAI B=FAUX
- 6- Dans la GEU les signes sympathiques de la grossesse sont exacerbés
A= VRAI B=FAUX
- 7- Devant un avortement molaire, la sage-femme doit prendre une voie veineuse et réaliser l'AMIU après l'accord de son médecin responsable
A= VRAI B=FAUX
- 8- La procidence du cordon est une chute du cordon en arrière de la présentation à membranes rompues
A= VRAI B=FAUX
- 9- Le traitement de la GEU consiste en une césarienne en urgence
A= VRAI B=FAUX
- 10- La GEU se définit comme l'implantation de l'œuf dans la cavité utérine
A= VRAI B=FAUX
- 11- La recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux se fait à la 2e et 3e CPN
A= VRAI B=FAUX

12- La première échographie du premier trimestre pour la confirmation de la grossesse doit être réalisée à la 22^e semaine d'aménorrhée

A= VRAI B=FAUX

13- La MAP se définit par une modification du col

A= VRAI B=FAUX

14- Le sulfate de magnésium est le traitement de la crise d'éclampsie

A= VRAI B=FAUX

15- Le placenta prævia fait partie des causes de métrorragies du 2^e trimestre

A= VRAI B=FAUX

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE : Choisissez la ou les bonnes réponses

1- Citez les causes obstétricales directes de mortalité maternelle :

- A- Hémorragie
- B- Eclampsie
- C- VIH et SIDA
- D- Paludisme

2- Quels sont les 2 éléments permettant de faire le diagnostic de l'HRP ?

- A. Utérus de bois
- B. Perception des parties fœtales sous la peau
- C. Col utérin cerclé
- D. Métrorragies rouges de moyenne abondance
- E. Utérus mou

3- Retrouvez 2 complications fœtales de l'anémie au cours de la grossesse

- A. Mort fœtale in utéro
- B. Retard de croissance in utéro
- C. Infections urinaires
- D. Communication interventriculaire
- E. Macrosomie

4- La grossesse extra-utérine est :

- A- Une grossesse qui peut évoluer jusqu'à terme
- B- Une prolifération anormale du trophoblaste
- C- De localisation abdominale dans la majorité des cas
- D- L'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine

5- Le traitement de première intention du paludisme au cours de la grossesse est :

- A. La quinine
- B. La sulfadoxine
- C. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine
- D. La Sulfadoxine-pyriméthamine

6- La prévention du paludisme au cours de la grossesse repose sur 2 des axes suivants :

- A. L'utilisation de la MILDA
- B. La chimioprophylaxie par la Méfloquine
- C. La lutte anti vectorielle par insecticide
- D. La chimioprophylaxie à l'Artéméther-Luméfantrine
- E. La chimioprophylaxie à la Sulfadoxine-Pyrimétamine

7- Parmi les propositions suivantes, laquelle fait partie des facteurs de risque de l'hémorragie de la délivrance :

- A- Antécédent d'hémorragie de la délivrance
- B- Primiparité
- C- Grossesse extra utérine
- D- Prématuration

8- Identifiez 2 gestes Une hauteur utérine excessive peut faire évoquer tous les diagnostics suivants sauf un :

- A. Une hydrocéphalie fœtale
- B. Une grossesse extra-utérine
- C. Un fibrome associé à une grossesse
- D. Un hydramnios

9- Les gestes essentiels de la réanimation néonatale sont

- A. Aspiration des voies aériennes
- B. Toilette à la chlorexidine
- C. Réchauffement sous lampe chauffante
- D. Ventilation à l'ambu
- E. Massage cardiaque

10- La GATPA comporte 3 phases/ cocher les réponses fausses

- A. L'injection de 10UI en IM de Syntocinon
- B. La vidange vésicale
- C. La TCC
- D. Le massage utérin
- E. L'injection de 10UI en IV de Syntocinon

11- Les gestes contemporains à la délivrance sont : trouvez les deux réponses exactes

- A. Examen des voies génitales
- B. Examen du placenta et des membranes
- C. Assurer la surveillance stricte dans les 6h du post partum
- D. Faire une révision utérine systématiquement
- E. Assurer la vidange vésicale

- 12- Citez 2 causes obstétricales indirectes de mortalité maternelle :
- A- Hémorragie
 - B- Eclampsie
 - C- VIH et SIDA
 - D- Paludisme
 - E- Avortement provoqué
- 13- Citez deux causes fœtales de prématurité
- A. Hydramnios
 - B. Grossesse multiple
 - C. Anémie
 - D. HTA
 - E. Diabète maternel
- 14- La prise de poids normale au cours de la grossesse ne doit pas excéder :
- A. 20 kg
 - B. 16 kg
 - C. 12 kg
 - D. 10 Kg
- 15- Dans les 2 pathologies suivantes la myomectomie est un facteur favorisant :
- A- Le placenta praevia
 - B- L'hématome retro placentaire
 - C- La rupture utérine
 - D- La rupture prématurée des membranes
 - E- Grossesse extra-utérine
- 16- Quels sont les signes cliniques en défaveur d'une GEU ?
- A- L'utérus est augmenté de volume
 - B- Des métrorragies minimes sépia
 - C- L'œuf est perçu sous la peau
 - D- Masse latéro-utérine
 - E- Algies pelviennes
- 17- Les objectifs de la 2eme CPN sont : cocher la réponse fausse
- A. Réévaluer les facteurs de risque
 - B. Vérifier la bonne évolutivité de la grossesse
 - C. Faire les prescriptions
 - D. Confirmer la grossesse
- 18- Au 6^{ème} mois de la grossesse, la hauteur utérine normale doit être de :
- A. 20 cm

- B. 22 cm
- C. 24 cm
- D. 28 cm

19- Quel est parmi les signes suivants, le signe annonciateur d'une crise d'éclampsie ?

- A. Œdèmes des membres inférieurs.
- B. Vomissements à répétition
- C. Douleurs épigastriques en barre.
- D. Une dyspnée de décubitus

20- L'évaluation du bien-être fœtal est appréciée par :

- A- Le rythme cardiaque fœtal
- B- Degré de modelage de la tête
- C- Le niveau de la présentation fœtale