

SANTÉ INFANTILE GROUPE 2

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (OCD)

1. Jusqu'à 2 ans, il faut utiliser une toise horizontale pour la taille. **B**
2. La taille normale d'un nouveau-né à terme est de 40 à 50 cm. **A**
3. La fontanelle antérieure se ferme à 12 mois. **B**
4. La forme sporulée est la forme infectante **A**
5. Non traité, le tétanos néonatal est mortel dans 100% des cas. **A**
6. Le V.A.T est obligatoire chez tous nouveaux nés dès la naissance. **B**
7. Remercier la mère pour sa collaboration avant de prendre congé d'elle est une des précautions à prendre après le soin. **A**
8. Pour obtenir son adhésion et sa participation, il faut avertir la mère pendant le soin. **A**
9. La notification du soin se fait après l'exécution de celui-ci. **B**
10. La toilette est l'immersion du corps de l'enfant dans l'eau. **B**
11. Le sérum bicarbonaté à 14% est utilisé dans le soin de la bouche. **B**
12. Le terme de conditions AFADS (acceptable, Faisable, Abordable, Durable et sûre) est utilisé lors de l'allaitement pour déceler les difficultés liées à l'allaitement **B**
13. Le soutien psychologique de la mère allaitante est un facteur favorisant la montée laiteuse lors de l'allaitement. **A**
14. L'extraction manuelle est plus sûre et comporte plus risque d'infection que l'extraction par pompe **B**
15. Le tétanos modéré a un score compris entre 4 et 6. **A**
16. L'enfant âgé de 3 mois et demi a droit à 5 repas. **B**
17. En début de tétée, pendant la mise au sein, le lait est riche en eau et en sucre
18. La fontanelle postérieure se ferme normalement à 10 mois. **A**
19. Un nouveau-né prématuré pesant 500 grammes à la naissance est un nouveau-né viable. **B**
20. Les scissures crâniennes se ferment à l'âge de 5 ans. **B**
21. L'hypothermie est un risque lié à la prématurité. **A**
22. Les fausses routes peuvent être observées au cours des vomissements du nourrisson. **A**

QUESTION A CHOIX MULTIPLE (QCM)

23. A quel âge apparaît la première dentition de l'enfant ?
- A. 05 mois.
 - B. 06 mois**
 - C. 08 mois
24. La période néonatale s'étend de:
- A. J1 à j28**
 - B. 12 mois
 - C. J0 à J28
 - D. J1 à J07
25. Le nouveau-né perd :
- A. 5 à 10% du poids de naissance entre le 8^e et le 10^e jour
 - B. 3 à 5% du poids de naissance entre le 5^e et le 10^e jour
 - C. 5 à 10% du poids de naissance entre le 8^e et le 14^e jour**
 - D. 3 à 5% du poids de naissance entre le 3^e et le 5^e jour
26. Le méconium représente
- A. L'émission de selles chez le prématuré
 - B. L'émission de selles chez le nouveau-né normal avant 24 heures.
 - C. Les 1^{ère} émissions de selles chez le nouveau-né.**
 - D. Les selles jaunâtres du nouveau-né
27. Le BCG est recommandé
- A. Dès la naissance**
 - B. A partir de 1 mois
 - C. Dès la 6^e semaine
 - D. A 17 de vie
28. Quelle est la définition du prématuré selon l'OMS ? Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge gestationnel est compris entre :
- A. 28 semaines et 42 semaines révolues
 - B. 28 semaines et 37 semaines révolues C. 37 semaines et 42 semaines révolues.**
 - C. 22 semaines et 37 semaines révolues

29. Cette liste dresse les critères de sortie d'hospitalisation d'un prématuré sauf un. Lequel ?
- A. Coloration rose,
 - B. Bonne succion-déglutition
 - C. **Température inférieure à 35°C**
 - D. Prise de poids régulière et suffisante
30. Au niveau des organes des sens, quelle séquelle peut laisser une oxygénothérapie mal conduite (intensive, longue durée, non contrôlée) chez un prématuré ?
- A. **Cécité**
 - B. Surdit 
 - C. Anosmie
 - D. Insensibilit  cutan e
31. Les gestes ci-dessous sont effectu s pendant 60 et 90 minutes de vie :
- A. Examiner le nouveau-n    la recherche d' ventuelles malformations et des r flexes archa ques ;
 - B. Couvrir le nouveau-n  avec un linge propre et chaud ;
 - C. **Sectionner le cordon ombilical**
 - D. Instiller 2 gouttes de collyre antiseptique dans chaque  il une seule fois, E. Communiquer avec la m re sur l'importance de la mise au sein pr coce

F. Porter le bonnet au nouveau-n  :

Entourez les deux r ponses exactes

32. Cocher l' l ment qui n'appartient pas aux avantages que tire l'enfant lors de L'allaitement maternel :
- A. D veloppement cognitif optimal
 - B. Croissance harmonieuse
 - C. Favorise l'attachement   la m re
 - D. **Favorise l'ob sitt **

Entourez la r ponse exacte

33. Je re ois un nourrisson qui p se 10,5 kg. Il est n    3,5kg et correctement aliment  depuis la naissance. Ce nourrisson est  g  de:
- A. 12 mois
 - B. 14 mois
 - C. **16 mois**
 - D. 10 mois

Cocher la bonne affirmation

34. CF monte l'escalier en se tenant à la rampe. Il tape le pied dans le ballon et imite les tâches ménagères de l'adulte. CF a les performances psychomotrices d'un enfant de :

- A. 12 mois
- B. 16 mois
- C. 15 mois
- D. 18 mois

Cocher la bonne affirmation

35. Quelle est la fausse information parmi les propositions suivantes?

- A. Jusqu'à 3 ans, on utilise un pèse bébé pour le poids.
- B. Jusqu'à 4 ans, on utilise une toise horizontale pour la taille
La taille normale d'un nouveau-né à terme est de 49 à 52 cm
- C. Le nouveau-né normal double son poids de naissance à 5 mois

36. Quelle est l'affirmation juste parmi les suivantes?

- A. Le nourrisson tient la tête entre 1-4 mois
- B. Le suivi des objets s'acquière entre 5 à 8 mois
- C. L'enfant utilise le je entre 2 ans et 3 ans.
- D. L'enfant sait faire bravo entre 14-24 mois.

37. Cocher seulement les bonnes réponses parmi les facteurs de déclin de l'allaitement

- A. Le congé de maternité avec présence de la mère à la maison ;
- B. Le soutien psychologique de la mère allaitante ;
- C. Promotion et vulgarisation des laits infantiles ;
- D. La montée laiteuse précoce

Entourez la réponse exacte

38. Les critères d'une bonne succion sont :

- A. L'enfant fait le rot au cours de la tétée
- B. La bouche est grandement ouverte et prend largement l'aréole
- C. Une succion lente, profonde et continue
- D. On entend le nouveau-né déglutir le lait maternel

Choisissez la bonne réponse

39. Au niveau des organes des sens, quelle séquelle peut laisser une oxygénothérapie mal conduite (intensive, longue durée, non contrôlée) chez un prématuré ?

- A. Cécité
- B. Surdit 
- C. L'orarat
- D. Anosmie
- E. Insensibilit  cutan e

40. Quelle est la fausse information parmi les propositions suivantes?

- A. Jusqu'à 3 ans, on utilise un pèse bébé pour le poids.
- B. Jusqu'à 4 ans, on utilise une toise horizontale pour la taille.
- C. La taille normale d'un nouveau-né à terme est de 49 à 52 cm.
- D. **Le nouveau-né normal double son poids de naissance à 5**

41. Quelle est l'affirmation juste parmi les suivantes

De 0-3 mois, le périmètre crânien d'un nourrisson à développement physique normal augmente de :

- A. 0.5 cm
- B. **1.0 cm**
- C. 1.5 cm
- D. 2.0 cm

42. La livedo est

- A. Est la coloration jaune de la peau survenant au 2^e jour de vie
- B. Un grain de milium visible chez le prématuré
- C. **Un lacis capillaire visible chez le nouveau-né**
- D. La coloration bleue du nouveau-né

43. Les scissures se ferment à

- A. **6 ans**
- B. 7 ans
- C. 4 ans
- D. 5 ans

44. Tout enfant de plus de 1 an qui a un périmètre brachial :

- A. **Supérieur à 16 cm est considéré comme malnutri**
- B. Supérieur à 14 cm est considéré comme malnutri
- C. Inférieur à 15 cm considéré comme malnutri
- D. Inférieur à 12 cm est considéré comme malnutri

Choisissez la bonne réponse

45. Les objectifs des soins essentiels sont :

- A. Maintenir une température normale.
- B. **Détecter les signes de danger ;**
- C. Aider la mère à mettre le nouveau-né au sein ;

Entourez la réponse exacte

46. Le périmètre brachial permet d'évaluer l'état nutritionnel du nourrisson. Entre 1 et 2 ans il est de :

- A. 12 à 14 cm
- B. **14 à 16 cm**
- C. 16 à 20 cm
- D. 11 à 13 cm

Choisissez la bonne réponse

47. Pendant les 90 premières minutes de vie extra-utérine il faut :

- A. Sécher le nouveau-né avec un linge propre sec et chaud ;**
- B. Administrer la vit ki au nouveau-né ;
- C. Rechercher les malformations congénitales ;
- D. Ligaturer et sectionner le cordon ombilical du nouveau-né;
- E. Faire la mise au sein précoce ;**

Entourez les deux réponses exactes

48. Le pansement ombilical du cordon sec se fait

- A. A partir du 2ème jour de vie ;
- B. De la base vers le haut ;**
- C. De l'intérieur vers l'extérieur.
- D. De l'extrémité vers la base ;

Choisissez la bonne réponse

49. Parmi les avantages que tire la mère réalisant l'allaitement s'y trouve un intru, lequel :

- A. Protège des grossesses précoces
- B. Favorise attachement à son enfant
- C. Coûteux ;**
- D. Protège contre l'hémorragie de la délivrance ;

Entourez la réponse exacte

50. Quelle est l'affirmation juste parmi les suivantes ?

- A. Le nourrisson tient la tête entre 1-4 mois.
- B. Le suivi des objets s'acquière entre 5 à 8 mois.
- C. L'enfant utilise le « je » entre 2 ans et 3 ans.
- D. L'enfant sait faire bravo entre 14-24 mois.**