




TEST FORMATIF EN IST/VIH/SIDA

● 21h00-22h00

1. **CORRECTION**

Entrez votre réponse

2. Une femme enceinte séropositive peut avoir un accouchement prématuré au deuxième et troisième trimestre (1 point) 

Vrai

Faux


3. Les gènes responsables des IST sont d'origine : (1 point)

Bactérienne

Parasitaire

Mycosique

Virale

4. La double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger à la fois contre les grossesses non désirées et les IST/VIH SIDA (1 point) 

Vrai


Faux

5. Le VIH est un virus qui appartient à la famille des rétrovirus du genre lentivirus (1 point)




Faux

Vrai

6. Il existe quatre stratégies pour vulgariser la double protection (1 point) 

Vrai

Faux

7. On définit trois approches de prise en charge des IST: (1 point) 

Approche clinique, symptomatique et curative

Approche clinique étiologique et curative

Approche clinique étiologique et syndromique

Approche clinique étiologique et préventive

8. Il existe deux types de VIH (1 point) 


Faux

Vrai

9. Nous avons trois niveaux d'intervention des IST dans la pyramide sanitaire (1 point) 


Vrai

Faux

10. Le VIH 1 est essentiellement localisé en Afrique de l'ouest (1 point) 


Vrai

Faux

11. Au cours de la grossesse, on observe une baisse de l'immunité cellulaire (1 point) 


Vrai

Faux

12. Dans le cadre de la lutte contre IST en côte d'ivoire 7 syndromes ont été identifiées (1 point) 


Vrai

Faux

13. Une femme enceinte séropositive est exposée aux risques accrus de mort in-utero et d'avortement au premier trimestre (1 point) 

Vrai

Faux

14. Un virus est composé d'un génome, une capsidie et une enveloppe (1 point) 

Faux

Vrai

15. Le virus de sida possède un système de métabolisme (1 point) 


Vrai

Faux

16. Le test ELISA est un test qui dure plus de 20 minutes (1 point) 

Vrai

Faux

17. Le niveau IST 1 dispose d'un laboratoire (1 point) 


Vrai

Faux

18. Les rétrovirus sont des virus à ARN (1 point) 


Vrai

Faux

19. La primo infection ou phase aiguë dure en moyenne 3 mois (1 point) 


Vrai

Faux

20. Les principaux éléments de la réponse anti VIH sont les lymphocytes t8 et les anticorps (1 point) 

Vrai

Faux

21. Les étapes de la réplication virale sont: (1 point) 

1-Pénétration du virus 2-reconnaissance des cellules 3- retrotranscription 4- production des particules virales 5- libération des vibrons 6- intégration

1-reconnaissance des cellules 2- pénétration du virus 3- retrotranscription 4- intégration 5- production des particules virales 6- libération des vibrons

Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles. | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)