

COMPO TEST MÉDECINE 1



Pathologies médicales QCM/ QCD

Bonjour, TEHUA. Lorsque vous soumettez ce formulaire, le propriétaire verra votre nom et votre adresse e-mail.

* Obligatoire

Information personnelle

Veillez saisir vos informations personnelles

1. NOM et PRÉNOM *

Entrez votre réponse

2. MATRICULE *

Entrez votre réponse

3. Groupe *

Entrez votre réponse

4. L'ascaridiose est une parasitose intestinale cosmopolite et spécifiquement humaine. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

5. Les nématodoses intestinales sont causées par des vers plats. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

6. L'homme se contamine par l'ascaris en ingérant des œufs embryonnés (voie digestive). (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

7. L'occlusion intestinale par un peloton d'ascaris et la péritonite par perforation sont des complications possibles.

(1 point) *

☐ Faux

☐ Vrai

8. L'ankylostomiase est causée par *Ankylostoma duodenale* et *Necator americanus*. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

9. La migration larvaire de l'ascaris au niveau pulmonaire peut provoquer une toux et une dyspnée asthmatiforme. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

10. La contamination par l'ankylostome se fait principalement par ingestion d'eau souillée. (1 point) *

☐ Faux

☐ Vrai

11. L'anguillulose est due au parasite *Strongyloides stercoralis*. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

12. L'ankylostomiase entraîne une spoliation sanguine pouvant causer une anémie grave chez l'enfant.

(1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

13. L'oxyurose est une affection cosmopolite très fréquente chez les enfants, causée par un petit ver rond blanc. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

14. Pour éviter la réinfestation par l'oxyure, il est recommandé de traiter tous les membres de la famille en même temps. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

15. Le signe principal et pathognomonique de l'oxyurose est un prurit anal intense, souvent vespéral ou nocturne. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

16. La dracunculose (ver de Guinée) est provoquée par le ver *Dracunculus medinensis*. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

17. L'Homme contracte le ver de Guinée en mangeant de la viande de porc mal cuite. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

18. L'hôte intermédiaire et vecteur de la dracunculose est un petit crustacé appelé Cyclops. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

19. Les cestodoses sont des helminthiases causées par des vers plats rubanés (cestodes) (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

20. *Diphyllobothrium latum* (Bothriocéphale) est le plus grand cestode adulte chez l'Homme (jusqu'à 20 m). (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

21. Le *Taenia saginata* est le ténia du bœuf et peut mesurer 4 à 12 mètres de long. L'Homme s'infecte par *Taenia saginata* en mangeant de la viande de porc mal cuite. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

22. L'Homme s'infecte par *Taenia saginata* en mangeant de la viande de porc mal cuite. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

23. Le paludisme est une maladie parasitaire due à un protozoaire transmis par la piqûre de l'anophèle femelle. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

24. Le neuropaludisme se caractérise chez l'adulte par un coma hypotonique et aréflexique. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

25. Question (1 point) *

☐ Option 1

☐ Option 2

26. À l'entrée du patient, le rôle de l'auxiliaire inclut l'accueil, le tri, la prise des paramètres vitaux et l'orientation. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

27. La pulvérisation d'insecticide type DDT a un effet rémanent pour lutter contre les moustiques adultes (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

28. L'ictère, l'anémie grave et l'hypoglycémie ne font pas partie des critères de gravité du paludisme (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

29. L'infection par *Taenia saginata* est très souvent asymptomatique ou révélée par la découverte d'anneaux dans le linge et la literie. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

30. Le *Taenia solium* est le ténia du porc et mesure généralement 2 à 8 mètres de long. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

31. La prophylaxie des téniasés repose sur le contrôle vétérinaire et la cuisson suffisante des viandes. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

32. L'accès palustre intermittent classique se déroule selon 3 phases : frissons, chaleur, puis sueurs abondantes. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

33. Pendant la phase de frisson de l'accès palustre, la température corporelle diminue. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

34. La prostration, les convulsions répétées et les troubles de la conscience sont des critères d'accès palustre grave. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

35. L'accès palustre simple de première invasion comporte une fièvre pouvant atteindre 39°C - 40°C après 8 à 15 jours d'incubation. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

36. Le seul réservoir de parasites pour le paludisme humain est l'Homme. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

37. Le Plasmodium falciparum est la seule espèce responsable des formes graves et mortelles de paludisme. (1 point) *

☐ Vrai

☐ F

☐ Option 3

38. La localisation habituelle de la lésion causée par le ver de Guinée se situe au niveau du visage. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

39. auxiliaire de santé ne doit pas intervenir dans l'information du patient ni dans les activités d'IEC/CCC. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

40. La gestion des déchets et le tri du matériel usagé relèvent de la responsabilité des équipes des soins. (1 point) *

☐ Faux

☐ Vrai

41. Assurer la traçabilité des soins et des transmissions n'est pas nécessaire pour une prise en charge de qualité. (1 point) *

☐ Faux

☐ Vrai

42. La surveillance des paramètres vitaux (Température, Pouls, Tension Artérielle) fait partie intégrante des soins

(1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

43. L'hygiène des mains et l'utilisation d'équipements de protection individuelle font partie des mesures de prévention des risques infectieux. (1 point) *

☐ Vrai

☐ Faux

44. Lors de la phase de migration larvaire pulmonaire de l'Ascaridiose (Syndrome de Löffler), on peut observer :
A. Une fièvre
B. Une toux sèche ou quinteuse
C. Une dyspnée asthmatiforme avec expectorations
D. Une hématurie récurrente
E. Des douleurs articulaires aiguës

(2 points) *

☐ A- Fièvre

☐ B-Toux sèche ou quinteuse

☐ C- Une dyspnée esthmatiforme avec expectations

☐ D- une hématurie récurrente

☐ E- Des douleurs articulaires aiguës

☐ Toutes les réponses

45. Concernant l'Ascaridiose, quelles sont les affirmations exactes ? Cochez les bonnes réponses
(2 points) *

3 Bonnes réponses

☐ Elle est spécifiquement humaine et cosmopolite.

☐ A. C'est une parasitose intestinale strictement tropical et rare.

☐ La contamination s'effectue par ingestion d'eau, de légumes/crudités souillés par des œufs embryonnés.

☐ La contamination se fait par voie transcutanée passive.

☐ Le parasite responsable est un nématode nommé Ascaris lumbricoides.

46. Concernant l'Ankylostomiase, quelles sont les propositions correctes ? Cochez les bonnes réponses (2 points) *

4 bonnes réponses

☐ A- Elle entraîne une spoliation sanguine pouvant conduire à une anémie séchante microcytaire hypochrome.

☐ B- Elle est causée par Ankylostoma duodenale et Necator americanus.

☐ C- Le mode de contamination est la pénétration cutanée des larves infectantes (marche pieds nus sur sol humide).

☐ D- Les vers adultes vivent en liberté dans l'estomac.

☐ La phase de pénétration cutanée se manifeste par un érythème maculo-papuleux très prurigineux (gourme dumineur).

47. Parmi toutes ces réponses Cochez celles Concernant l'Anguillulose (Strongyloïdose) : (2 points) *

4 bonnes réponses

☐ A- L'agent pathogène est Strongyloides stercoralis.

☐ B- La contamination est cutanée (marche pieds nus dans la boue ou eau douce).

☐ C- Le diagnostic biologique reposant sur la recherche des larves dans le selles

☐ D- Elle provoque une anémie hémolytique aiguë immédiat

☐ E- Elle se caractérise par la possibilité d'une auto-infection maintenant la parasitose pendant des décennies

☐ Toutes les réponses

48. LA DRACUNCULOSE (Ver de Guinée) (2 points) *

4 bonnes réponses

☐ A- L'homme se contamine en se faisant piquer par une moustique.

☐ B- L'homme se contamine en buvant de l'eau non filtrée contenant des Cyclops infestés.

☐ L'agent responsable est Dracunculus medinensis.

- ☐ C- L'hôte intermédiaire et vecteur est un petit crustacé d'eau douce appelé Cyclops.
- ☐ D- La localisation la plus fréquente du ver adulte s'observe au niveau des membres inférieurs (pied, cheville).

49. Concernant l'oxyurose, cochez la ou les bonnes réponses : (2 points) *

- ☐ A- Ce prurit est lié à la ponte des femelles à la marge anale.
- ☐ B- Le signe clinique pathognomonique est un prurit anal nocturne très vif.
- ☐ C- Le test consiste à appliquer un ruban adhésif transparent sur la marge anale, de préférence le matin avant la toilette et avant toute défécation.
- ☐ D- Le diagnostic de certitude repose sur la découverte des œufs dans les selles par coproculture.
- ☐ E- Le diagnostic de certitude se fait par le Scotch-test de Graham (test à l'anal-scotch).



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

[Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)