

L'anémie se définit comme : (1 point)

- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 8g/dl ($< 11\text{g/dl}$).
- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 10g/dl ($< 11\text{g/dl}$).
- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 9g/dl ($< 11\text{g/dl}$).
- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 11g/dl ($< 11\text{g/dl}$).

Z- score < -3 ou 60% -70% est une malnutrition sévère (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Pendant la grossesse la femme enceinte doit réduire ses apports alimentaires pour répondre à ses besoins ou ceux du fœtus (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Les principales causes d'anémie du nourrisson et de l'enfant sont : (1.5 points)

☐ Infections.

☐ Drépanocytose ;

☐ Carence en fer ;

☐ Prélèvements sanguin répétés

Voici quelques rôles de l'ASI/ASO dans la prise en charge de la diarrhée : (1 point)

- ☐ En cas d'alimentation mixte, Conseiller la mère de continuer le lait artificiel (AR)
- ☐ Conseiller la mère de maintenir un état normal d'hydratation jusqu'à la cessation de la diarrhée en lui donnant à boire à volonté ;
- ☐ En cas d'allaitement : Conseiller la mère d'arrêter sans problème l'allaitement ;

Chez la femme allaitante il faut recommander l'apport en vitamine A (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

L'anémie se définit comme : (1 point)

Le rôle de soins de l'AS dans la prise en charge de l'anémie est de conseiller la mère à : (1.5 points)

- ☐ Prendre régulièrement du fer et de l'acide folique pendant la grossesse ;
- ☐ Effectuer les consultations prénatales ;
- ☐ Prendre régulièrement du fer.
- ☐ Dormir avec leur enfant sous moustiquaire;

La malnutrition est l'état pathologique résultant d'une inadéquation par excès ou par défaut entre les apports alimentaires et les besoins de l'organisme (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Pendant la grossesse la femme enceinte doit réduire ses apports alimentaires pour répondre à ses besoins ou ceux du fœtus

Parmi les facteurs favorisant l'anémie liés à l'enfant une est fausse, laquelle ? (1 point)

- ☐ La mise au sein précoce
- ☐ La prématurité
- ☐ La malnutrition, la diarrhée aiguë, le paludisme,
- ☒ L'alimentation avec les substituts de lait de mère

Les différents types de malnutrition par carence est au nombre de 5 (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Il existe 3 types de malnutrition (1 point)

- ☐ VRAI

L'anémie se définit comme : (1 point)

- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 8g/dl ($< 11\text{g/dl}$).
- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 10g/dl ($< 11\text{g/dl}$).
- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 9g/dl ($< 11\text{g/dl}$).
- ☐ La diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 11g/dl ($< 11\text{g/dl}$).

Z- score < -3 ou 60% -70% est une malnutrition sévère (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Envoyer