Fomesoutra.com
ça soutra!

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 Aboisso_ D.E Blanc_Date : 1/09/2021 ***BLOC A*** *Durée 1h*

QCM

- ***Une réponse juste donne droit à 1 point***
- ***Une réponse fausse équivaut à 1 point***
- ***Une absence de réponse équivaut à 0 point***

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE PROPOSITION

1. **L'enfant né à terme et correctement nourri triple sa surface corporelle à :**

A	36 mois
B	24 mois
C	12 mois
D	9 mois

2. **Dans les unités de néonatologie de l'Afrique subsaharienne, le nombre de cas de maladie hémorragique du nouveau-né enregistrées est plus élevé entre**

A	J0 et J1 post natal
B	J2 et J3 post natal
C	J3 et J4 post natal
D	J5 et J6 post natal

3. **Parmi les activités psychomotrices suivantes que le nourrisson de 9 mois 3 semaines est capable de réaliser se cache un intru. Quel est cet intru ?**

A	A peur de l'étranger
B	Fait le geste de bravo
C	Monte les escaliers à 4 pattes
D	Fait le geste au revoir

4. **GK vient de naître facilement par voie basse à 36 semaines d'aménorrhée. Il présente une détresse respiratoire isolée d'aggravation progressive. La détresse respiratoire du nouveau-né GK a pour cause**

A	Une infection bactérienne précoce
B	Un retard de résorption du liquide pulmonaire
C	Une inhalation du liquide amniotique
D	Une maladie des membranes hyalines

5. **Parmi les avantages des soins Mère-Kangourou listées ci-après se cache un intru. Quel est cet intru ?**

A	Favorise l'allaitement exclusif
B	Favorise le suivi du nouveau-né
C	Favorise la présence continue de la mère
D	Favorise l'alimentation au biberon

6. **PK est né à terme ses mensurations à la naissance sont : Poids 2450g, Taille 48 cm, PC : 34 cm. A l'âge adulte PK est à risque de faire les maladies suivantes sauf une. Quelle est cette maladie ?**

A	Le cancer
B	L'hypertension artérielle
C	Le diabète
D	L'obésité

7. **Le nouveau-né PK de la question 6 nécessite que je lui administre de l'acide folique dosé à 5mg. Je débute l'administration de l'acide folique a :**

A	J0 de vie
B	J3 de vie
C	J5 de vie
D	J8 de vie

8. **Le très grand prématuré a un âge gestationnel compris entre** *:*

A	[22 – 28[semaine d'aménorrhée
B	[22 – 28] semaine d'aménorrhée
C	]22 – 28] semaine d'aménorrhée
D	]22 – 28[semaine d'aménorrhée

9. **Les causes suivantes sont des causes spontanées de prématurité sauf une. Laquelle ?** *:*

A	Hypertension artérielle légère
B	Paludisme simple maternelle
C	Hématome retro placentaire
D	Travaux pénibles maternelles

10. **PK est né à 38 semaines d'aménorrhée. Il pèse 2350 grammes et à l'aspect d'un vieillot. Il ne présente pas de détresse vitale. Les soins suivants sont recommandés chez PK sauf un. Quel est ce soin ?**

A	Mise au sein précoce
B	Antianémique (fer) orale
C	Comprimé d'acide folique
D	Contact peau à peau prolongé

11. **CK, 2 jours de vie. Il pèse 1520gramme et présente une avitaminose K1. La dose du médicament curatif que j'administre par voie parentéral est**

A	0,5 mg en IM
B	1 mg en IM
C	10 mg en IV
D	10 mg en IM

Prof OULAI, Prof ASSE– Bonne chance à tous

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 Aboisso_ D.E Blanc_Date : 1/09/2021 ***BLOC A*** *Durée 1h*

12. **BH est né à 12H00 minute à terme. Il est en bonne santé apparente. Je réalise son premier examen clinique entre**

A	13h31 min et 14h00 min
B	13h01 min et 13h30
C	12h 31 min et 13h00 min
D	12h00 min et 12h30 min

13. **RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. Le problème infirmier de RB est**

A	Perturbation des échanges gazeux
B	Dégagement inefficace des voies respiratoires
C	Infection locale du nez et la gorge
D	L'hygiène corporelle

14. **RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. La réalité personnelle de RB comprend**

A	1 donnée
B	2 données
C	3 données
D	4 données

15. RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. RB a

A	5 données d'indépendance
B	4 données d'indépendance
C	6 données d'indépendance
D	7 données d'indépendance

16. **RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. RB a**

A	5 données de dépendance
B	4 données de dépendance
C	6 données de dépendance
D	7 données de dépendance

17. **Le nourrisson RB étant malade. Vous l'accompagnez chez le Kinésithérapeute pour une séance de Kinésithérapie respiratoire.** *Cet acte de soins figure dans votre rôle de soins :*

A	Propres
B	Délégués
C	Collaboration
D	Conseils et prévention

18. **PK est né à 43 semaines d'aménorrhées. L'examen du placenta montre des microcalcifications en faveur d'un vieillissement de cet organe. Parmi les poids suivants, un seul ne peut pas se retrouver chez PK. Quel est ce poids ?**

A	Poids 2650 grammes
B	Poids 2850 grammes
C	Poids 3250 grammes
D	Poids 3999 grammes

19. **RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. Parmi les propositions suivantes cochez celui qui fait partie de l'identification de RB.**

A	Il vit avec sa mère
B	Il respire difficilement
C	Il tousse
D	Il souffre d'une bronchiolite aiguë

20. **RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. Parmi les propositions suivantes cochez celui qui correspond au diagnostic infirmier de RB.**

A	Perturbation des échanges gazeux reliée au manque de force physique
B	Dégagement inefficace des voies respiratoires relié au manque de connaissance
C	Dégagement inefficace des voies respiratoires relié au manque de force physique
D	Perturbation des échanges gazeux reliée au manque de force physique

21. RB, 6 mois, vie à Aboisso avec sa mère. Il souffre d'une bronchiolite aiguë selon le médecin. RB tousse, respire difficilement mais ne présente pas d'écoulement nasal. L'objectif de soins de RB est de

A	Ramener la fréquence respiratoire dans les limites de la normale (40-60 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins
B	Ramener la fréquence respiratoire dans les limites de la normale (30-40 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins
C	Ramener la fréquence respiratoire dans les limites de la normale (20-30 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins
D	Ramener la fréquence respiratoire dans les limites de la normale (15-20 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 Aboisso_ D.E Blanc_Date : 1/09/2021 ***BLOC A*** *Durée 1h*

22. **Pour confirmer la maladie hémorragique du nouveau-né, je collabore avec le médecin pour la réalisation du:**

A	Taux d'hématocrite
B	Taux de fibrinogène
C	Taux d'hémoglobine
D	Taux de céphaline kaolin

23. **Les facteurs maternels et environnementaux suivants favorisent la dermatose du nouveau-né sauf un. Quel est ce facteur ?**

A	Soins septiques sur le nouveau-né
B	Hygiène insuffisante du nouveau-né
C	Infection pendant la grossesse
D	Peau fragile du nouveau-né

24. **Pour prévenir la survenue pendant la vie intra-utérine le spina bifida chez le fœtus je conseille la femme gestante de**

A	Manger équilibrée
B	Suivre la prophylaxie contre le paludisme
C	Suivre la prophylaxie contre l'anémie
D	Suivre la prophylaxie contre le tétanos

25. **JK est né prématuré et hospitalisé depuis 5 jours. Je souhaite faire sortie. Quel est le paramètre dans la liste suivante qui n'autorise pas la sortie.**

A	Fréquence respiratoire 66 cycles /min
B	Température corporelle 37°5 Celsius
C	Fréquence cardiaque 132 battements/min
D	La courbe de poids est croissante

26. **Les facteurs suivants, liés à l'environnement, favorisent la diarrhée sauf un. Quel est ce facteur ?**

A	Retard à la consultation
B	Pauvreté
C	Sevrage précoce
D	Substitut de lait maternel

27. **TG, 12 mois, consulte pour diarrhée. Vous retrouvé chez lui une fontanelle très déprimée, les yeux enfoncés, les lèvres très sèches. Je traite TG avec :**

28. **Le nouveau-né normal a un âge gestationnel compris entre :**

A	[37-42] semaines d'aménorrhée
B	[37-42[semaines d'aménorrhée
C	]37-42] semaines d'aménorrhée
D	]37-42[semaines d'aménorrhée

29. **Les signes suivants sont observés chez le nouveau-né normal à la naissance, sauf un. Quel est ce signe ?**

A	Coloration rose
B	Clitoris saillant
C	Nodule mammaire à 5 mm
D	Bourses striées

30. **L'âge gestationnel du nouveau-né moyen prématuré est compris entre**

A	]33-35] semaines d'aménorrhée
B	]33-35[semaines d'aménorrhée
C	[33-35] semaines d'aménorrhée
D	[33-35[semaines d'aménorrhée

31. **Le nouveau-né prématuré rattrape son retard pondéral entre**

A	1 et 3 mois
B	3 et 6 mois
C	6 et 9 mois
D	9 et 12 mois

32. **Les observations suivantes sont des critères de sortie d'hospitalisation du nouveau-né prématuré, sauf une. Laquelle ?**

A	Température 36,8°Celsius
B	Fréquence cardiaque 168 batt/min
C	Coloration rose
D	Fréquence respiratoire 52 cycles/min

33. **La principale cause de détresse respiratoire chez le nouveau-né prématuré est**

A	Inhalation du liquide amniotique
B	Infection bactérienne néonatale
C	Maladie des membranes hyalines
D	Détresse respiratoire transitoire

34. **Le lait de transition est produit chez la mère allaitante entre**

A	1 et 3 semaines
B	3 et 6 semaines
C	6 et 9 semaines
D	9 et 12 semaines

35. **Les affirmations suivantes ont un lien avec la prolactine au cours de l'allaitement, sauf une. Laquelle ?**

A	Plan A
B	Plan B
C	Plan C
D	Plan D

A	Produit au niveau de l'antéhypophyse
B	Agit sur les acini du sein
C	Produit lors de la succion du mamelon
D	Agit sur les cellules myoépithéliales du sein

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 Aboisso_ D.E Blanc_Date : 1/09/2021 ***BLOC A*** *Durée 1h*

36. Au cours de la surveillance de l'enfant allaité, la prise de poids normale est de l'enfant est comprise entre

A	10 à 15 grammes/jour
B	15 à 20 grammes/jour
C	20 à 25 grammes/jour
D	25 à 30 grammes/jour

37. L'enfant né à terme et correctement nourri double sa taille de naissance à :

A	3 ans
B	5 ans
C	4 ans
D	2 ans

38. L'enfant né à terme et correctement nourri double sa surface corporelle à :

A	6 mois
B	7 mois
C	8 mois
D	9 mois

39. A 16 mois le nourrisson réalise les activités psychomotrices suivantes, sauf une. Laquelle ?

A	Monte les escaliers à 4 pattes
B	Gribouille sur du papier
C	S'agenouille et se relève seul
D	Tape le pied dans un ballon

QCD

- ***Une réponse juste donne droit à 1 point***
- ***Une réponse fausse retranche 1 point***
- ***Une absence de réponse équivaut à 0 point***

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE AFFIRMATION.

40. Le nouveau-né BK présente une collection sanguine, occipital bien limité et sous le périoste. BK souffre d'un céphalhématome.

A	Vrai
B	Faux

41. Lorsque la mère allaitante regarde son enfant avec attention et écoute le son émis par ce dernier, cela déclenche chez elle la production d'ocytocine.

A	*Vrai*
B	*Faux*

42. PL, 15 jours de vie, sexe masculin il présente une respiration rapide synchrone et régulière, un tirage intercostal modéré, un entonnoir xyphoïdien modéré, un battement des ailes du nez modéré et un geignement audible au stéthoscope de Pinard. PL a une détresse respiratoire modérée

A	Vrai
B	Faux

43. Pendant la grossesse, la période qui part de 0 à 8 jour s'appelle stade d'œuf

A	Vrai
B	Faux

44. Durant la période d'embryogénèse, le feuillet responsable de la formation des glandes et des vaisseaux sanguins s'appelle ectoblaste

A	Vrai
B	Faux

45. Le contact peau à peau prolongée est un soin essentiel du nouveau-né hypotrophe

A	
B	Faux

46. La mise au sein précoce signifie que la mère met son enfant au sein entre 30 et 60 minutes de vie.

A	*Vrai*
B	*Faux*

47. En Côte d'Ivoire le taux d'allaitement exclusif est de 23%

A	*Vrai*
B	*Faux*

48. En Côte d'Ivoire la proportion des mères qui suivent la recommandation de la mise au sein précoce est de 36%

A	*Vrai*
B	*Faux*

49. Le nouveau-né de mère diabétique fait le diabète durant les cinq premières années de sa vie

A	Vrai
B	Faux

50. La mère Rhésus négatif qui accouche d'un nouveau-né rhésus positif et n'ayant pas reçue le sérum anti D allaite son enfant

A	Vrai
B	Faux

51. Dame ZY porte une grossesse de 33 semaines et présente une hémorragie du troisième trimestre. Le fœtus est en souffrance et l'obstétricien réalise l'accouchement en urgence. La cause de la prématurité est spontanée.

A	Vrai
B	Faux

52. KL a un paludisme confirmé par TDR. Il est âgé de 6 mois. Il frissonne et la température corporelle est chiffrée à 40° Celsius. Je conclue de KL a un paludisme grave

A	Vrai
B	Faux

53. Pour décider en salle de naissance de la réanimation du nouveau-né ma boussole est la respiration et le tonus musculaire

A	Vrai
B	Faux

54. GJ, infirmier, conseille la mère de poursuivre l'administration de collyre au nouveau-né à la maison pour une durée totale d'une semaine. Ce conseil est non pertinent.

A	Vrai
B	Faux

55. L'ocytocine est une hormone sécrétée par la partie postérieure de l'hypophyse de la mère

A	Vrai
B	Faux

56. Le traumatisme obstétrical est un ensemble de lésions constaté chez le nouveau-né à la naissance et provoquées par l'acte d'accouchement.

A	Vrai
B	Faux

57. KT, 12 mois, 10kg, est admis en urgence pour une fièvre à 39°C. Il pleur et les extrémités chaude et le visage est vultueux. BH tolère sa fièvre.

A	Vrai
B	Faux

58. KL est né prématuré avec un poids de 1600g. Je lui administre 1 mg de vitamine K1 pour lui éviter la maladie hémorragique du nouveau-né.

A	Vrai
B	Faux

59. Le nouveau-né hypotrophe dysharmonieux a une taille et un périmètre crânien inférieurs à la normale.

A	Vrai
B	Faux