

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 _ Diplôme Blanc _ Date : 22 juillet 2020 BLOC 1

QCM

- Une réponse juste donne droit à 1 point
- Une réponse fausse équivaut à 1 point
- Une absence de réponse équivaut à 0 point

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE PROPOSITION

1. Le nouveau-né GG est malade. L'infirmier va au laboratoire pour récupérer le résultat de l'hémoculture. Cet acte de soins figure dans les rôles :

A	Propres
B	Délégués
C	Collaboration
D	Conseils et prévention

2. JK, 6 mois, sexe masculin, domicilié à Nzikaha et correctement vacciné. Il tousse, respire difficilement avec un tirage sous costal. Les narines de JK ne sont pas encombrées. Le problème infirmier de JK est :

A	Pneumonie grave de l'enfant
B	Dégagement inefficace des voies respiratoires
C	Perturbation des échanges gazeux
D	Infection pulmonaire grave

3. JK, 6 mois, sexe masculin, domicilié à Nzikaha et correctement vacciné. Il tousse, respire difficilement avec un tirage sous costal. Les narines de JK ne sont pas encombrées. JK a :

A	5 données d'indépendance
B	6 données de dépendance
C	6 données d'indépendance
D	5 données de dépendance

4. JK, 6 mois, sexe masculin, domicilié à Nzikaha et correctement vacciné. Il tousse, respire difficilement avec un tirage sous costal. Les narines de JK ne sont pas encombrées. JK a :

A	3 données d'indépendance
B	5 données de dépendance
C	2 données d'indépendance
D	4 données de dépendance

5. JK, 6 mois, sexe masculin, domicilié à Nzikaha et correctement vacciné. Il tousse, respire difficilement avec un tirage sous costal. Les narines de JK ne sont pas encombrées. L'objectif de soins de JK est

A	Ramener la fréquence respiratoire de JK entre 40 et 60 cycles/min
B	Ramener la fréquence respiratoire de JK entre 16 et 20 cycles/min
C	Ramener la fréquence respiratoire de JK entre 20 et 30 cycles/min
D	Ramener la fréquence respiratoire de JK entre 30 et 40 cycles/min

6. PL, 18 mois, sexe masculin. Il a une fièvre à 40°Celsius et pèse 10kg. Sa paume est très chaude, les yeux sont enfoncés. Il grélotte et boit avec avidité. Il se trouve dans une chambre climatisée. Pour traiter la fièvre de PL

A	Je recouvre PL avec un linge mouillé
B	Je donne de l'eau à boire à PL
C	Je porte des habits à PL
D	J'éteins le climatiseur

7. Dans l'exécution des soins essentiels du nouveau-né, la prise du poids et la réalisation des soins prophylactique interviennent entre

A	Avant 60 minutes de vie
B	60 et 90 minutes de vie
C	90 et 120 minutes de vie
D	Après 120 minutes de vie

8. Dans l'exécution des soins essentiels du nouveau-né, j'aide la mère à mettre son bébé au sein

A	Avant 60 minutes de vie
B	60 et 90 minutes de vie
C	90 et 120 minutes de vie
D	Après 120 minutes de vie

9. L'infection néonatale précoce d'origine bactérienne est causée dans la majorité des cas par

A	Streptocoque A
B	Streptocoque C
C	Streptocoque D
D	Streptocoque B



EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 _ Diplôme Blanc _ Date : 22 juillet 2020 BLOC 1

10. Le soluté de réhydratation orale (SRO) de l'OMS à osmolarité réduite à une osmolarité totale de

A	235 mmol/litre
B	255 mmol/litre
C	225 mmol/litre
D	245 mmol/litre

11. WV est âgé de 16 mois. Il a une diarrhée sans déshydratation. La quantité de SRO à fournir à la mère pour le traitement à domicile est

A	250 ml/jour
B	500 ml/ jour
C	1000 ml/jour
D	1500 ml/litre

12. WV est âgé de 16 mois. Il a une diarrhée avec signes sévère de déshydratation. Le soluté idéal pour la réhydratation par voie parentérale est

A	Sérum glucose 10%
B	Sérum bicarbonate
C	Manitol
D	Ringer lactate

13. Le globule rouge parasité par Plasmodium falciparum possède à sa surface des renflements appelés

A	Phénomène de rosette
B	Récepteur endothéliaux (ICAM)
C	Cytokine TNF alpha
D	KNOB

14. Dans la forme commune du paludisme grave neurologique l'enfant présente

A	Une altération de la conscience
B	Une anémie clinique décompensée
C	Une insuffisance rénale
D	Une hémoglobinurie

15. Les deux principales formes cliniques du paludisme grave en Côte d'Ivoire sont

A	Convulsions et hyperparasitémie
B	Convulsions et hypoglycémie
C	Convulsions et anémie décompensée
D	Convulsions et œdème pulmonaire

16. Les deux principales formes cliniques du paludisme grave en Côte d'Ivoire sont

A	Convulsions et hyperparasitémie
B	Convulsions et hypoglycémie
C	Convulsions et anémie décompensée
D	Convulsions et œdème pulmonaire

17. GB tourne les pages d'un livre, monte les escaliers à 4 pattes, aime à jeter et demande les objets en les montrant du doigt. Je conclus que GB à

A	15 mois
B	18 mois
C	12 mois
D	24 mois

18. KL court vite, saute, danse et tourne en cercle. Il a une bonne prise digitale et réunit 2 ou 3 mots dans une phrase. Il comprend et exécute des ordres en 2 parties. Je déduis que KL a

A	15 mois
B	18 mois
C	12 mois
D	24 mois

19. BV est correctement nourri depuis la naissance et a une taille de 92 cm. Le médecin vous informe que BV viens de doubler sa taille de naissance. Je déduis que BV est âgé de

A	24 mois
B	36 mois
C	12 mois
D	48 mois

20. Dans la malnutrition aiguë sévère avec complication l'enfant

A	est éveillé
B	a un bon appétit
C	une anorexie
D	a les yeux brillants

21. Dans la malnutrition aiguë sévère avec complication, la survenue d'une déshydratation favorise le décès de l'enfant dans

A	50 à 80% des cas
B	30 à 50% des cas
C	20 à 30% des cas
D	10 à 20% des cas

Prof ASSE KV – Bonne chance à tous

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 _ Diplôme Blanc _ Date : 22 juillet 2020 BLOC 1

22. La principale porte d'entrée du tétanos néonatal est ombilicale

- | | |
|---|---------------------------|
| A | Ombilicale |
| B | Injection intramusculaire |
| C | Excision |
| D | Circoncision |

23. Le trismus se manifeste chez le nouveau-né souffrant du tétanos par une impossibilité :

- | | |
|---|----------------------|
| A | d'ouvrir la main |
| B | d'évacuer les urines |
| C | d'évacuer les selles |
| D | d'ouvrir la bouche |

QCD

- Une réponse juste donne droit à 1 point
- Une réponse fausse retrace 1 point
- Une absence de réponse équivaut à 0 point

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE AFFIRMATION.

24. Est qualifié de prématuré tous nouveau-né dont le poids de naissance est en dessous de 2500g

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

25. Le débit d'oxygène pour éviter la rétinopathie du prématuré est comprise entre 1 et 1,5l/min

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

26. BK, garçon, 7 mois, réside à Bouaké. Son calendrier vaccinal est à jour. Il émet 6 selles glaireuses par jour depuis 2 jours. Il est nourri au sein et le sevrage a débuté depuis 1 mois. BK a 5 données d'indépendance

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

27. BK, garçon, 7 mois, réside à Bouaké. Son calendrier vaccinal est à jour. Il émet 6 selles glaireuses par jour depuis 2 jours. Il est nourri au sein et le sevrage a débuté depuis 1 mois. BK a 7 données d'indépendance

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

28. BK, garçon, 7 mois, réside à Bouaké. Son calendrier vaccinal est à jour. Il émet 6 selles glaireuses par jour depuis 2 jours. Il est nourri au sein et le sevrage a débuté depuis 1 mois. BK a 2 données de dépendance

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

29. Pour préparer le F75, je dilue le sachet de 410 grammes dans 2 litres d'eau

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

30. BK, garçon, 7 mois, réside à Bouaké. Son calendrier vaccinal est à jour. Il émet 6 selles glaireuses par jour depuis 2 jours. Il est nourri au sein et le sevrage a débuté depuis 1 mois. BK a 2 données de dépendance. BK a plus de données d'indépendance que de dépendance. Cela signifie que BK est en bonne santé.

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

31. Le complexe d'oedipe apparaît chez l'enfant entre 24 et 36 mois .

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

32. La peur du visage inconnu apparaît à l'âge de 9 mois.

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

33. Pour traiter les signes évidents de déshydratation, j'applique le plan B de traitement

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

34. BV, 1 mn de vie, ne respire pas, ne pleure pas, tout mou, bleu de partout et le cœur bat à 90 batt/min. Le score d'APGAR de BV est 3 à 1 min de vie

- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |

EPREUVE DE PEDIATRIE

INFAS _ Licence 3 _ Diplôme Blanc _ Date : 22 juillet 2020 BLOC 1

35. La déshydratation compliquant la malnutrition aiguë sévère survient durant la première semaine de traitement
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
36. Pour préparer le F100, je dilue le sachet de 456 grammes dans 2 litres d'eau
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
37. Je reçois un nourrisson de 18 mois présentant une malnutrition aiguë sévère avec complication. Il a une diarrhée et une anémie. La prescription de l'antianémique (fer + acide folique) est faite avant l'arrêt de la diarrhée.
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
38. Nouveau-né CLW, Jour 6 de vie. Il a un tétanos néonatal avec un score pronostic de Dakar à 3. Le tétanos de CLW est grave.
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
39. Le *Clostridium tetani*, agent pathogène du tétanos, est un germe aérobic
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
40. KL, J4 de vie a une maladie hémorragique du nouveau-né. Il pèse 1530g. je lui administre 1 mg de vitamine K1 en IM
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
41. On parle de retard de maturation dentaire chez un nourrisson si ce dernier n'a aucune dent dans la bouche à partir de 15 mois
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
42. Pour réanimer le nouveau-né en souffrance qui ne pleure pas et ne respire pas, je sectionne immédiatement le cordon ombilical et le pose sur la table de réanimation pour le nettoyer.
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
43. L'infection urogénitale de la mère pendant la grossesse est un facteur non favorisant de l'infection tardive du nouveau-né
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
44. Le stress est une cause induite ou médicale de la prématurité
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
45. Dans la maladie hémorragique du nouveau-né il y a un excès de la vitamine K1
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
46. L'essentiel de la réanimation néonatale, est d'aider le bébé à respirer après la première minute de vie
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
47. La durée de l'administration du collyre antiseptique au nouveau-né après la naissance est d'un jour
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
48. Dans le score pronostic de Dakar une température à 38°4 Celsius est coté à 1
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
49. Un score Pronostic de Dakar à 2 signifie que le tétanos est frustre
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
50. BH, 8 mois, 9kg, est admis en urgence pour une fièvre à 40°C. La dose journalière recommandée de paracétamol est de 135 mg x 3/ jour.
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |
51. Le faible poids de naissance favorise la maladie hémorragique du nouveau-né
- | | |
|---|------|
| A | Vrai |
| B | Faux |