EPREUVE DE PEDIATRIE

Bouaké- Evaluation Diagnostique Licence III _Juin 2023

QCD

- *une réponse juste : 1 point,*
- *une réponse fausse : -1 point*
- *aucune réponse : 0 point*

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE AFFIRMATION

1. **Le tétanos néonatal est une maladie infectieuse provoquée par un virus**

A	Vrai
B	Faux

2. **Le Spina bifida est une maladie congénitale causée par une insuffisance d'apport de Vitamine B9 pendant la grossesse**

A	Vrai
B	Faux

3. **L'enveloppement humide est recommandé pour traiter l'hyperthermie de l'enfant**

A	Vrai
B	Faux

4. **Le lait maternel est plus riche en prébiotique que le lait de vache**

A	Vrai
B	Faux

5. **L'ictère apparu au premier jour de vie du nouveau-né est physiologique**

A	Vrai
B	Faux

6. **Lait thérapeutique F100 est utilisé pour nourrir le nouveau-né prématuré**

A	Vrai
B	Faux

7. **La diarrhée persistante signifie que l'enfant émet au moins trois selles molles ou liquide depuis plus de 3 semaines**

A	Vrai
B	Faux

8. **Le lait maternel de transition fait suite au lait mature**

A	Vrai
B	Faux

9. **Le lait maternel est produit par les cellules myoépithéliales du tissu glandulaire du sein**

A	Vrai
B	Faux

10. **La dose de vitamine K1 recommandée pour prévenir l'avitaminose K1 du nouveau-né à terme eutrophique est de 0,5 mg en intraveineuse directe**

A	Vrai
B	Faux

11. **Après la naissance, le nouveau-né normal au sein perd 10% du poids corporel au 3e jour de vie.**

A	Vrai
B	Faux

12. **PK est admis aux urgences de pédiatrie pour une anémie à 8g/dl associée à une goutte épaisse positive. Je conclue que PK à un paludisme grave dans sa forme anémique**

A	Vrai
B	Faux

13. **Nourrisson CG robert, 10 mois est amené par sa mère inquiète en consultation pour difficulté respiratoire et toux. Il pèse 8 kg. Le médecin diagnostique une pneumonie.** *Dans ma démarche de soins, je classe le poids (7kg) et nourrisson dans la réalité personnelle de CG*

A	Vrai
B	Faux

Bonne chance à tous

14. **Le carnet de santé mère-enfant est couvert par le secret médical.**

A	Vrai
B	Faux

15. **Avant de gaver un nouveau-né, je vérifie le résidu gastrique.**

A	Vrai
B	Faux

16. **FT est âgé de 6 mois. Il émet 8 selles molles par jour depuis 5 jours. FT est incapable de boire et léthargique. Je conclue que FT à des signes sévères de déshydratation**

A	Vrai
B	Faux

17. **Pour prendre la taille d'un enfant âgé de 18 mois j'utilise une toise verticale.**

A	Vrai
B	Faux

18. **La diversification alimentaire est l'action de nourrir un enfant avec un aliment autre que le lait de mère.**

A	Vrai
B	Faux

19. **L'ocytocine favorise l'éjection du lait maternel des seins**

A	Vrai
B	Faux

20. **Le gavage est une prescription médicale**

A	Vrai
B	Faux

21. **Le reflexe ocytocique est inhibé par la douleur et l'anxiété de la mère allaitante**

A	Vrai
B	Faux

QCM

- *une réponse juste : 1 point,*
- *une réponse fausse : 0 point*
- *aucune réponse : 0 point*

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHER LA BONNE AFFIRMATION

22. **Le nourrisson BN, 8 mois, souffre d'une diarrhée aiguë. Je lui administre par voie orale du zinc à la dose de**

A	5 mg
B	10 mg
C	15 mg
D	20 mg

23. **KN est âgé de 3 ans. Sa surface corporelle est estimée par le pédiatre à 0,63 m2. KN est né avec une surface corporelle de**

A	0,20 mois
B	0,21 mois
C	0,22 mois
D	0,23 mois

24. **Les moyens physiques suivants sont utilisés pour traiter la fièvre de l'enfant. Le moyen physique dont l'efficacité est prouvée et recommandée est**

A	Bain d'eau froide
B	Ventiler l'enfant
C	Enveloppement humide
D	Déshabiller l'enfant

Bonne chance à tous

EPREUVE DE PEDIATRIE

Bouaké- Evaluation Diagnostique Licence III _Juin 2023

25. **HJ est âgé de 11 mois et pèse 8 kg. Il a une diarrhée avec signes sévères de déshydratation. La quantité de soluté de réhydratation par voie parentérale a perfusé sur 5 heures de temps après la période de traitement initial est**

A	460 ml
B	560 ml
C	360 ml
D	660 ml

26. **La succion du sein par le nouveau-né lors de la tétée provoque chez la mère :**

A	Une production accrue de lait
B	Une douleur vive du mamelon
C	Un relâchement du muscle utérin
D	Une crise génitale

27. **La mise au sein après l'accouchement est dite précoce lorsqu'elle survient**

A	Avant la 1ère heure de vie
B	Avant la 2e heure de vie
C	Avant la 3e heure de vie
D	Avant la 24e heure de vie

28. **Une mère allaitante a besoin de boire au moins**

A	1 litre d'eau
B	2 litres d'eau
C	3 litres d'eau
D	4 litre d'eau

29. **Pour garantir la santé de la mère et du nourrisson en Côte d'Ivoire, le programme national de nutrition recommande de débuter le sevrage du nourrisson à partir de :**

A	Six mois
B	Un an
C	Un an et demi
D	Deux ans

30. **Parmi les propositions suivantes cocher celle qui contient tous les gestes de la bonne pratique de la réanimation néonatale en salle de naissance**

A	Agir avec rapidité, douceur, Sang-froid
B	Agir avec asepsie, sang-froid, précipitation
C	Agir avec vitesse, normo thermie, brutalité
D	Agir avec sang-froid, Précipitation, Asepsie

31. **Le nourrisson BC présente une diarrhée aiguë avec signes sévères de déshydratation. Il est pris en charge à l'hôpital pendant au moins**

A	4 heures
B	6 heures
C	12 heures
D	24 heures

32. **La phénylcétonurie est une maladie métabolique provoqué par un déficit enzymatique. L'examen de laboratoire qui permet de faire le diagnostic**

A	Test de Coombs direct
B	Test de Coombs indirect
C	Test de Guthrie
D	Test de provocation

33. **Le pansement du cordon ombilical frais est réalisé pendant les**

A	2 premiers jours de vie
B	3 premiers jours de vie
C	4 premiers jours de vie
D	5 premiers jours de vie

34. **Le premier germe de l'infection bactérienne précoce encore appelée materno-fœtale est**

A	Streptocoque A
B	Escherichia coli
C	Streptocoque B
D	Streptocoque D

Bonne chance à tous

35. **L'alimentation à la tulipe est contre indiquée chez le nouveau-né si ce dernier présente :**

A	Une difficulté respiratoire
B	Une pâleur des téguments
C	Une diarrhée aiguë
D	Un ictère franc

36. **La couleur du lait de transition est**

A	Jaune bleuté
B	Jaune or
C	Jaune foncé
D	Jaune orangé

37. **On appelle lait pré-terme, le lait produit par la mère qui a accouché à la**

A	34e semaine d'aménorrhée
B	36e semaine d'aménorrhée
C	33e semaine d'aménorrhée
D	32e semaine d'aménorrhée

38. **Le pansement du cordon ombilical sec est réalisé à partir du :**

A	2e jour de vie
B	3e jour de vie
C	4e jour de vie
D	5e jour de vie

39. **Parmi les signes suivants, le signe clinique fréquemment observé dans la forme classique de l'avitaminose K du nouveau-né est :**

A	Purpura
B	Hématémèse
C	Pétéchie
D	Gingivorragie

40. **LP est âgé de 8 mois et pèse 10 kg. Il a une diarrhée aiguë avec signes évidents de déshydratation. La quantité de SRO à administrer durant les quatre premières heures est**

A	1500 ml
B	1000 ml
C	500 ml
D	750 ml

41. **Les phases successives de production du lait maternel après un accouchement normal sont au nombre de** *:*

A	cinq
B	quatre
C	trois
D	deux

42. **La mise au sein après l'accouchement est dite précoce lorsqu'elle survient**

A	Avant la première heure de vie
B	Avant la deuxième heure de vie
C	Avant la troisième heure de vie
D	Avant la sixième heure de vie

43. La **succion du mamelon de la mère par le nouveau-né dans l'heure qui suit l'accouchement**

A	Favorise l'angoisse maternel
B	Favorise l'allaitement exclusif
C	Favorise l'espacement de naissance
D	Favorise le cancer du sein

44. **KL est né avec un poids de 3300g et correctement nourrit. A l'âge de 24 mois, le poids de naissance sera multiplié par**

A	2
B	3
C	4
D	5

45. **La bonne position de l'enfant au sein est faite lorsque :**

A	Le dos de l'enfant repose sur le bras de la mère et la nuque dans le pli du coude
B	Le bras de l'enfant est bien serré sous les aisselles de la mère et les fesses dans la paume
C	Le ventre de l'enfant fait face et en contact avec celui de la mère
D	La bouche de l'enfant effleure le mamelon de la mère

46. **Le mélange I de l'INSP d'Adjamé utilisé pour la réhabilitation nutritionnelle du nourrisson malnutri est composé de**

Bonne chance à tous

A	Lait+ huile + sucre
B	Lait+ sucre+ farine
C	Lait + farine + huile
D	Lait + huile + sucre+ farine

47. **La nouvelle performance psychomotrice attendue chez le nourrisson de 9 mois dans les affirmations suivantes est**

A	Maintien la tête dans l'axe
B	Dire « papa- maman »
C	Marche à reculons
D	Fait « bravo- aurevoir »

48. **Le nourrisson BH a 11 mois souffre du marasme et une anémie modérée. L'anémie de BH est :**

A	Normochrome normocytaire
B	Hypochrome microcytaire
C	Macrocytaire normochrome
D	Microcytaire normochrome

49. **KL est né le 20 avril 2020. Le 22 avril 2020 il est amené d'urgence en pédiatrie pour une fièvre et une détresse respiratoire. Le médecin diagnostic une infection bactérienne. L'infection de KL est une infection**

A	Postnatale
B	Précoce
C	Prénatale
D	Périnatale

50. BC est âgé de 28 jours et hospitalisé pour une infection postnatale. L'antibiotique de choix est

A	Amoxicilline + gentamicine
B	Ampiciline + gentamicine
C	Penicilline + gentamicine
D	Cefotaxime + gentamicine

51. Le nourrisson CJ est âgé de 7 mois et vie avec sa mère à Aboisso. Il est au sein exclusif et vacciné. VB régurgite plusieurs fois dans la journée. Le médecin pense à un reflux. Parmi les propositions suivantes cocher la seule qui fait partie de la réalité personnelle de CJ

A	7 mois
B	Nourrisson
C	Reflux
D	CJ

52. Le nourrisson CJ est âgé de 7 mois et vie avec sa mère à Aboisso. Il est au sein exclusif et vacciné. VB régurgite plusieurs fois dans la journée. Le médecin pense à un reflux. Parmi les propositions suivantes cocher la seule qui fait partie des données d'indépendance de CJ

A	Régurgite
B	Vacciné
C	Reflux
D	Non vacciné

Le nourrisson CJ est âgé de 7 mois et vie avec sa mère à Aboisso. Il est au sein exclusif et vacciné. VB régurgite plusieurs fois dans la journée. Le médecin pense à un reflux. Parmi les propositions suivantes cocher la seule qui fait partie des données de dépendance de CJ

A	Sein exclusif
B	7 mois
C	Vie à Aboisso
D	Régurgite

53. **Le nouveau-né de FX est de sexe masculin. Je recherche lors de son examen clinique en salle de naissance une cryptorchidie au niveau :**

A	Des yeux
B	Des fesses
C	Des doigts
D	Des bourses

54. Le nourrisson VB est âgé de 6 mois et vie avec sa mère à Pkaha. Il est au sein exclusif et non vacciné. La mère ne fait pas roter VB après les tétées et il régurgite plusieurs fois dans la journée. Le médecin pense à un reflux. Dans les propositions suivantes cocher celle qui

correspond au problème infirmier de VB.

A	Excès d'apport de nutriment
B	Défaut d'apport de nutriment
C	Défaut d'hygiène et propreté
D	Malnutrition débutante

55. Le nourrisson GH est âgé de 10 mois et souffre d'une diarrhée aiguë avec des signes évidents de déshydratation. Dans les propositions suivantes cocher le signe qui correspond au mieux à l'état clinique de GH

A	GH est léthargique
B	GH a les yeux très enfoncés
C	GH s'agite dans tous les sens
D	GH a une fontanelle très enfoncée

56. VB est né avec un poids de 3500g et correctement nourrit depuis la naissance. Le poids de VB a 7 ans est de :

A	22 000 g
B	24 000 g
C	20 000 g
D	18 000 g

57. GV est âgé de 10 mois et pèse 10 kg. Il a une déshydratation sévère. La dose de Ringer lactate que j'administre en 5 heures de temps par voie parentérale après la première heure de réhydratation est

A	750 ml
B	1000 ml
C	700 ml
D	1500 ml

58. Au cours de l'examen du nouveau-né en salle de naissance, je recherche laparochisis au niveau de :

A	Dos
B	Tête
C	Fesses
D	Abdomen

59. **FG est âgé de 48 mois. Il est correctement nourri et la croissance est normale. Il mesure 104 cm. Taille de naissance était**

A	49 cm
B	50 cm
C	51 cm
D	52 cm

60. **Parmi les propositions d'association de signes suivants, l'association qui comporte le plus de signes de paludisme simple est**

A	Prostration + peau brûlante + Ictère
B	Frissons + collapsus+ Splénomégalie
C	Fièvre, Céphalées + Courbatures
D	Diarrhée + urine foncée + oligurie

61. **Parmi les propositions d'association de signes suivants, l'association qui comporte le plus de signes de paludisme grave**

A	Prostration + fièvre + anémie sévère
B	Frissons + collapsus+ Splénomégalie
C	Fièvre, Céphalées + asthénie
D	Diarrhée + frisson + vomissements

Bonne chance à tous