

Université Aboubekr BELKAID - Tlemcen	A.U 2019/2020 - 2ème année Mathématiques
Faculté des Sciences - Département de Mathématiques	Analyse 3 - Fiche de T.D n°3

Exercice 1 : Déterminer les rayons de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{n^n z^n}{(2n+3)!} \quad , \quad \sum_{n \geq 0} \frac{(n!)^3}{(3n)!} z^n$$

Exercice 2 : Soit $(b_k)_{k \geq 1}$ une suite positive décroissante telle que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{b_k}{k}$ soit convergente.

1. Montrer que $\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = 0$.

2. Posons $c_n = b_1 b_2 \cdots b_n$. Déterminer le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 1} c_n x^n$.

Exercice 3 : Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier fixé. On pose

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$$

1. Montrer que la fonction J_n est bien définie sur \mathbb{R} et qu'elle est de classe C^2 .

2. En déduire qu'elle vérifie l'équation différentielle

$$x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = 0$$

Exercice 4 : En utilisant des opérations permises sur les séries entières, calculer les sommes suivantes en indiquant le domaine de validité :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n+2}{n+1} x^n \quad , \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n n!} x^{2n} \quad , \quad \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

Exercice 5 : Donner le développement en série entière centrée en 0 pour chacune des fonctions suivantes, en précisant le rayon de convergence pour chaque cas :

$$f(x) = \ln(1+x-2x^2) \quad , \quad g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

Exercice 1: Rayons de convergence.

$$* \sum_{n \geq 1} \frac{n^n z^n}{(2n+3)!} ; C_n = \frac{n^n}{(2n+3)!} \Rightarrow \frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \cdot \frac{(2n+3)!}{(2n+5)!}$$

$$\Rightarrow \frac{C_{n+1}}{C_n} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e} \cdot \underbrace{\frac{n+1}{(2n+1)(2n+4)}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'où } \boxed{R = \infty}$$

$$* \sum_{n \geq 0} \frac{(n!)^3}{(3n)!} z^n ; C_n = \frac{(n!)^3}{(3n)!} \Rightarrow \frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{((n+1)!)^3}{(n!)^3} \cdot \frac{(3n)!}{(3n+3)!}$$

$$\Rightarrow \frac{C_{n+1}}{C_n} = (n+1)^3 \cdot \frac{1}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} = \frac{(n+1)^2}{3(3n+2)(3n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{27}$$

d'où $\boxed{R = 27}$

Exercice 2: Hyp: $b_k > 0$, (b_k) décroissante; $\sum_{k \geq 1} \frac{b_k}{k}$ converge.

10/ $\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = 0$: Puisque (b_n) est décroissante, minorée par 0, alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = l$ existe. Supposons que $l > 0$.

Alors $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$: $\forall k, k \geq N(\varepsilon) \Rightarrow l - \varepsilon \leq b_k \leq l + \varepsilon$

Choisissons (par exemple) $\varepsilon = \frac{l}{2}$, alors $\forall k, k \geq N(\frac{l}{2})$: $b_k \geq \frac{l}{2}$

d'où $\frac{b_k}{k} \geq \frac{l/2}{k}$, or comme $\sum_{k \geq N(\frac{l}{2})} \frac{l/2}{k}$ diverge alors $\sum_{k \geq 1} \frac{b_k}{k}$

diverge aussi, ce qui contredit l'hypothèse.

Ainsi nous avons forcément $l = 0$.

2° Rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} c_n x^n$, $c_n = b_1 b_2 \dots b_n$.

Il est facile de voir que $\frac{c_{n+1}}{c_n} = b_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ donc

le rayon de convergence $R = \infty$.

Exercice 3: $n \in \mathbb{N}$ fixe, et $J_n(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$

1° J_n est bien définie sur \mathbb{R} et de classe C^∞ : il suffit de montrer que le rayon de convergence est ∞ . En effet

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} 2^{2k} (2x^2)^k$$

En considérant la série précédente (sans $(\frac{x}{2})^n$) comme fonction de x^2 , on voit bien que c'est une série entière (pleine) avec

$$c_k = \frac{(-1)^k}{k!(n+k)! 2^{2k}} \Rightarrow \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \frac{1}{(k+1)(n+k+1) 2^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

donc $R = \infty$. Nous avons montré (en cours), qu'une série entière définit une fonction C^∞ à l'intérieur de son domaine de convergence. Ici le domaine est \mathbb{R} tout-entier.

2° J_n vérifie l'éq. diff: $x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = 0$. En effet

$$\text{On a: } J_n'(x) = \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} (2k+n) \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n-1}$$

$$J_n''(x) = \frac{1}{4} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} (2k+n)(2k+n-1) \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n-2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Also } x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n &= F(x) \\
 &= \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} (2k+n)(2k+n-1) \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} \leftarrow x^2 J_n'' \\
 &\quad + \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} (2k+n) \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} \leftarrow x J_n' \\
 &\quad + \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} (-n^2) \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} \leftarrow -n^2 J_n \\
 &\quad + \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} 4 \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n+2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow F(x) &= \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} \left\{ (2k+n)(2k+n-1) + (2k+n) - n^2 \right\} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} \\
 &\quad + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1} 4}{(k-1)! (n+k-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \circ \quad (2k+n)(2k+n-1) + (2k+n) - n^2 &= (2k+n)^2 - n^2 = 2k(2k+2n) \\
 &= 4k(k+n)
 \end{aligned}$$

$$\text{Also } F(x) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k 4}{(k-1)! (n+k-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1} 4}{(k-1)! (n+k-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$$

et donc $F(x) \equiv 0$, (c/d).

Exercice 4: Calcul de sommes de séries entières.

a/ $S_1(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{n+2}{n+1} x^n$, $R=1$ (facile).

$$S_1(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{n+1+1}{n+1} x^n = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n+1} + \sum_{n \geq 0} x^n$$

Si $x \neq 0$, $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x} \sum_{n \geq 0} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ et $\left(\sum_{n \geq 0} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$

d'où $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x)$ ($|x| < 1$)

et donc (toujours avec $x \neq 0$) $S_1(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x} \ln(1-x)$

Ainsi:
$$S_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x} \ln(1-x) & \text{si } x \in]-1, 1[\setminus \{0\} \\ 2 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que pour $x=1$ ou $x=-1$, la série diverge; et que S_1 est C^∞ en $x=0$. (analytique d'ailleurs).

b/ $S_2(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n \cdot n!} x^{2n}$; ($R=\infty$)

$$= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} \left(\frac{-x^2}{2} \right)^n = -e^{-x^2/2} + 1$$

d'où $\forall x \in \mathbb{R}$, $S_2(x) = 1 - e^{-x^2/2}$

c/ $S_3(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n}}{2n+1}$ ($R=1$)

Si $x \neq 0$, $S_3(x) = \frac{1}{x} \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ et $\left(\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n \geq 0} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$

d'où $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ ($|x| < 1$)

$$\Rightarrow S_3(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) & \text{si } x \in]-1, 1[\setminus \{0\} \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 5: Développement en séries entières centrées en 0.

a/ $f(x) = \ln(1+x-2x^2)$, $D_f =]-\frac{1}{2}, 1[$ (facile)

On a aisément $1+x-2x^2 = (1-x)(1+2x)$ et pour $x \in D_f$ on peut écrire $f(x) = \ln(1-x) + \ln(1+2x)$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{1-x} + \frac{2}{1+2x} = - \sum_{n \geq 0} x^n + 2 \sum_{n \geq 0} (-2x)^n$$

càd $f'(x) = \sum_{n \geq 0} \{-1 + (-1)^n 2^{n+1}\} x^n$

et donc $f(x) = f(0) + \sum_{n \geq 0} \frac{-1 + (-1)^{n+1} 2^{n+1}}{n+1} x^{n+1}$ ($f(0) = 0$).

En définitive: $f(x) = - \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1 + (-1)^n 2^n}{n} \right) x^n$ et seulement avec $|x| < \frac{1}{2}$
 $R = \frac{1}{2}$

b/ $g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$, $D_g =]-1, 1[$

Si $x \neq -1$, $g(x) = (1+x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1+x)(1-x^2)^{-1/2}$. Après les développements donnés en cours on a :

$$(1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n \geq 0} \frac{(\frac{1}{2})_n}{n!} x^{2n}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{(2n-1)}{2} = \frac{(2n)!}{2^{2n} \cdot n!}$$

donc $g(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(2n)!}{2^{2n} \cdot (n!)^2} (x^{2n} + x^{2n+1}) = \sum_{k \geq 0} c_k x^k$

avec $c_{2n} = c_{2n+1} = \frac{(2n)!}{2^{2n} \cdot (n!)^2}$ $R = 1$

càd le développement est valable dans $]-1, 1[$.