

Lycée de Wona

Année scolaire 2021-2022

Professeur : M KABRE

Durée : 4h

Classe : Terminale D

Date : 02-12-2021

**Epreuve n°2 de Mathématiques**

**Questions de cours (5pts)**

- 1) Soit  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f(x) = \frac{x^2+x}{x}$ ; Calculer la limite de  $f$  en 0 puis en déduire un prolongement par continuité **(1pt)**
- 2) Déterminer la primitive  $F$  de  $f(x) = 2 + \cos(x)$  qui s'annule en  $\pi$  **(0,5pt)**
- 3) Déterminer une primitive de  $f(x) = (1 + \tan^2 x) \tan x$  sur  $I = ]0, \frac{\pi}{2}[$  **(0,5pt)**
- 4) Etudier la continuité de  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto E(x)$  en 2. **(0,5pt)**
- 5) Déterminer l'ensemble de définition des fonctions  $f$  définies par : **(1,5pts)**
  - a)  $f(x) = \ln(5-2x)$
  - b)  $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
  - c)  $f(x) = \ln(4x^2 - 25)$
- 6) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ 
  - a)  $\ln(x-4) + \ln(x-2) = \ln 3$
  - b)  $\ln(2x^2 - 9x + 4) = 2 \ln 3$ . **(1pt)**

**Exercice (5pts)**

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  unité graphique 1cm. On considère les points A et B d'affixes respectives :

$$z_A = 2 + 2i; z_B = (1 + \sqrt{3}) + i(3 + \sqrt{3})$$

- 1) Placer les points A et B. **(0,5pt)**
- 2) Ecrire le nombre complexe  $Z = \frac{z_A}{z_B}$  sous forme algébrique. **(1pt)**
- 3) a) déterminer OA et AB. Vérifier que  $OB = 2(1 + \sqrt{3})$  **(0,75pts)**  
 b°) déterminer en radian, la mesure principale de  $(\vec{u}; \vec{OA})$  et de  $(\vec{u}; \vec{OB})$  en déduire une mesure en radian de l'angle  $(\vec{OA}; \vec{OB})$  **(0,75pts)**
- 4) en utilisant les questions précédentes, donner les valeurs exactes de  $\cos \frac{\pi}{12}$  et de  $\sin \frac{\pi}{12}$ . **(1pt)**
- 5) a) déterminer l'affixe du point D image de A par la rotation de centre O et d'angle  $\alpha = 2(\vec{OA}; \vec{OB})$  **(0,5pt)**  
 b) Quelle est la nature exacte du triangle OABD ? justifier **(0,5pt)**  
 On donne  $\sqrt{3} = 1,7$

## Problème (10pts)

### Partie A

on considère la fonction numérique  $g$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $g(x) = x^2 + 2 - 2\ln(x)$

- 1) déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  (1pt)
- 2) Étudier le sens de variation de  $g$  et dresser le tableau de variation de  $g$ . (0,5pt)
- 3) En déduire que pour tout  $x > 0$  on a  $g(x) > 0$  (0,5pt)

### Partie B

Soit la fonction numérique  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = x + \frac{2\ln(x)}{x}$  ; on considère par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  (unité : 2cm)

- 1) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  en déduire que (C) admet une asymptote verticale que l'on précisera l'équation. (1,5pts)
- 2) a°) calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x)$  a le même signe que  $g(x)$ . (1pt)  
b°) en déduire le sens de variation de  $f$  puis dresser son tableau de variation. (1pt)
- 3) a°) montrer que la droite (D) d'équation  $y = x$  est asymptote à (C). Préciser la position de (C) par rapport à (D) (1pt)  
b°) déterminer les coordonnées du point B de (C) en lequel la tangente est parallèle à (D). (0,5pt)
- 4) Soit (T) la tangente à (C) au point A d'abscisse 1. Déterminer une équation de (T). (0,5pt)
- 5) a°) démontrer que  $f$  est une bijection définie de  $]0; +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ . (0,5pt)  
b°) montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha \in \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$  (0,5pt)  
c°) construire (C) ( on placera les points A et B et les tangentes à (C) en A et en B). (1pt)
- 6) construire dans le même repère , la courbe (C') de la fonction  $f^{-1}$  réciproque de  $f$ . (0,5pt)

