

\* Obligatoire

## 1. NOM ET PRÉNOM \*

Entrez votre réponse

2. Un prématuré né à 36 semaines d'aménorrhée sans signe de danger est pris en charge à l'hôpital de référence  
(0.5 points)

A

B

3. Un prématuré né à 22 semaines d'aménorrhée est prise en charge dans un hôpital de premier contact  
(0.5 points)

A

B

4. Le poids de naissance normal d'un nouveau-né est compris entre 3000 et 4000 g  
(0.5 points)

A

B

5. La crise génital du nouveau-né est provoquée par une hormone appelée ocytocine  
(0.5 points)

A

B

6. Le meconium est le nom donné aux selles secondaires aux premières du nouveau-né  
(0.5 points)

A

B

7. L'insuffisance de production du surfactant par les cellules pulmonaires est la cause de la maladie des membres hyalines du prématuré  
(0.5 points)

A

B

8. Le vomissement est fréquent chez le nourrisson du fait de l'immaturité de l'extrémité du cardia  
(0.5 points)

A

B

9. Le débit d'oxygène est compris entre 0, 5 et 1l/min chez le nouveau-né prématuré en détresse respiratoire  
(0.5 points)

A

B

10. La fécondation a lieu au tiers interne de la trompe de la femme (0.5 points)

A

B

11. L'urée et la créatinine sanguine font partie du bilan prénatal recommandé vu au cours  
(0.5 points)

A

B

12. Mme KS a réalisé sa prophylaxie antitétanique recommandée. Elle accouche d'un garçon à la maison lors de son évacuation au CHR de Korhogo, le cordon ombilical est sectionné avec le coupé-ongle de sa tante puis ligaturé avec les lassés des paires de crêpes de son frère.

Le nouveau-né risque le tétanos néonatal

(0.5 points)

A

B

13. Un enfant classé avec le code de couleur vert signifie que l'enfant est traité à l'hôpital de référence

(0.5 points)

A

B

14. On parle de retard de maturation dentaire chez un nourrisson si ce dernier n'a aucune dent dans la bouche à partir de 10 mois

(0.5 points)

A

B

15. Le nourrisson double sa surface corporelle à 9 mois (0.5 points)

A

B

16. Le maintien de la tête est une nouvelle performance psychomotrice attendue chez le nourrisson de 4 mois

(0.5 points)

A

B

17. La mère allaitante boit en plus de l'eau contenu dans les aliments au maximum 1 Litre d'eau par jour

(0.5 points)

A

B

18. Chez le nouveau-né normal la fontanelle postérieure est plus large que l'antérieure (0.5 points)

A

B

19. Les premières selles du nouveau-né s'appellent méconium (0.5 points)

A

B

20. La succion du mamelon par déclenche un influx nerveux qui stimule au niveau de l'antéhypophyse la sécrétion de l'ocytocine (0.5 points)

A

B

21. Le manque de cohésion familiale ne favorise pas les vomissements du nourrisson (0.5 points)

A

B

22. L'infection est la première cause de détresse respiratoire du prématuré (0.5 points)

A

B

23. Le nouveau-né BK a jour 6 de vie il a un tétanos néonatal avec un score pronostic D'APGAR à 2.

Le tétanos de BK est sévère

(0.5 points)

A

B

24. Le spina bifida du nouveau-né est favorisé par le non-respect par la mère de la prophylaxie contre l'anémie durant la grossesse

(0.5 points)

A

B

25. Mme KT réalise durant sa grossesse une dose de vaccin antitétanique à une szma avant l'accouchement de sa fille.

Le nouveau-né ne risque pas le tétanos néonatal

(0.5 points)

A

B

26. Un enfant classé avec le code de couleur rose signifie que l'enfant est traité à l'hôpital de référence

(0.5 points)

A

B

27. Pour éviter la survenue de la maladie hémorragique du nouveau-né l'agent de santé administre au nouveau-né de la vitamine K1 par voie musculaire  
(0.5 points)

A

B

28. J'accompagne en radiologie pour sa radiographie du thorax du nouveau-né malade.

Ce acte de soins figure dans mes rôles  
(0.5 points)

Propres

Délégués

Collaboration

Conseils et prévention

29. Les signes suivants témoignent d'une immaturité du nouveau-né sauf un. (0.5 points)  
Lequel?

Lobule de l'oreille présent

Fins poils au dos

Enduit blanchâtre sur le corps

Nodule mammaire <4 mm

30. La fréquence cardiaque normale du nouveau-né est comprise entre (0.5 points)

---

90 à 120 battements par minute

100 à 160 battements par minute

100 a 120 battements par minute

90 à 150 battements par minute

31. Dodo 5 min de vie bleu de partout, tout flasque, respire difficilement, ne pleure pas, le coeur bat à 120 par minute.

Le score de vitalité de dodo est

(0.5 points)

0

1

2

3

32. Les bilans sanguins suivant vu au cours sont recommandé pendant la grossesse sauf un.

Lequel?

(0.5 points)

Sérologie hépatite B

Sérologie syphilis

Sérologie rubéole

Sérologie VIH

33. KH est né avec une surface corporelle à 0,25 m<sup>2</sup>. Il est correctement nourri à 9 mois

la surface corporelle de KH est  
(0.5 points)

0,44 m2

0.50 m2

0.40 m2

0. 70 m2

34. L'âge gestationnel du moyen prématuré est (0.5 points)

] 33-35] semaines d'aménorrhée

] 33-35 [ semaines d'aménorrhée

[33-35] semaines d'aménorrhée

[33-35[ semaines d'aménorrhée

35. KJ est âgé de 9 ans. Il à une croissance normale. (0.5 points)

Le poids idéal théorique de KJ est

24 kg

20 Kg

22 kg

26 kg

36. À 6 mois le nourrisson (0.5 points)

Option porte l'objet à la bouche

Faire quatre pattes

Fait bravo et au revoir

Saisit l'objet entre les pouce et index

37. Le nourrisson CV émet les sons <<da- da- da >>et se tient debout avec appui. Je conclus que CV a les acquisitions psychomotrices d'un enfant de (0.5 points)

12 mois

9 mois

8 mois

6 mois

38. KB a 9 kg aujourd'hui. Il est né à 3 kg et correctement alimenté. KB est âgé de (0.5 points)

16 mois

12 mois

18 mois

10 mois

39. On parle de retard dentaire d'éruption à partir de (0.5 points)

12 mois

18 mois

15 mois

16 mois

40. La fontanelle antérieure de l'enfant a la forme d'un (0.5 points)

Rectangle

Carré

Losange

Cercle

41. La fontanelle antérieure de l'enfant est une (0.5 points)

Zone anatomique au niveau de la tête

Maladie sous la peau de la tête

Maladie au milieu de la tête

Aucune des trois propositions

42. Le grand prématuré a un âge gestationnel compris entre (0.5 points)

[28-32] semaines d'aménorrhée

]28-32 [ semaines d'aménorrhée

[28-33[ semaines d'aménorrhée

]28-33] semaines d'aménorrhée

43. Un enfant qui émet au moins trois selles molles par 24 heures depuis 15 jours présente une  
(0.5 points)

- Diarrhée aiguë
- Diarrhée persistante
- Diarrhée chronique
- Diarrhée subaiguë

44. La maturation correspond à :(0.5 points)

- Augmentation du volume des tissus
- Augmentation de la taille des tissus
- Perfectionnement des tissus
- Aucune des trois propositions

45. Le nouveau-né de sexe masculin normal à (0.5 points)

- Nodule mammaire <3mm
- Température rectale 35°5 celsius
- Fréquence respiratoire 70 cycles /min
- Fréquence cardiaque 120 battements /min

46. À l'âge de 7 mois le nourrisson (0.5 points)

Le bébé de 12 mois le nouveau-né (0.5 points)

- Attrape ses pieds
- Tire un objet par ficelle
- A peur de l'étranger
- Émet les sons (da- da-da)

47. Pour traiter le syndrome extrapyramidal par l'antiémétisant, j'administre (0.5 points)

- Amoxicilline
- Ceftriaxone
- Diazepam
- Paracetamol

48. La principale complications métabolique du nouveau-né prématuré est (0.5 points)

- Hypoglycémie
- Hyponatrémie
- Hypomnésie
- Hypocalcémie

49. Le principal agent pathogène de la diarrhée aiguë bactérienne est (0.5 points)

- Shigelle
- Escherichia coli

Salmonelle

Staphylocoque

Envoyer

Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Avec Microsoft Forms | [Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)