

1- La branche de la médecine qui étudie les maladies infectieuses est l'infectiologie

A- vrai

B- Faux

2- L'entérobactérie est un microbe redoutable dans les infections les plus courantes en milieu hospitalier

A- vrai

B- faux

3- L'asepsie en chirurgie est l'absence de tout germe microbien ou de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection

A- vrai

4- La rougeur est le premier signe qui définit l'inflammation

A- vrai

B- Faux

5- Au cours de l'incubation, il y a multiplication du germe et élaboration des toxines

A- Vrai

B- Faux

6- Il y a toxi-infection à la période d'état

A- vrai

B- faux

7- La phlébite constitue une porte d'entrée de la septicémie à colibacille

A- Vrai

B- Faux

8- L'hémoculture pratiquée en cas de septicémie montre un hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles

A- vrai

B- faux

9- L'une des causes du panaris est l'infection de la pulpe des doigts due au staphylocoque doré

A- vrai

B- Faux

10- La douleur spontanée pulsatile est un signe général du panaris

A- vrai

B- Faux

11- La douleur siégeant à la jambe ou à l'avant-bras est un signe fonctionnel et physique de la lymphangite

A- vrai

B- faux

12- La lymphangite est toujours accompagnée d'adénite dans son évolution

A- VRAI

B- FAUX

13- L'abcès chaud résulte d'une défense locale de l'organisme

A- VRAI

B- FAUX

14- La vasoconstriction est une réaction de défense de l'inflammation en cas d'abcès chaud

A- VRAI

B- FAUX

15- Si l'abcès froid est fistulisé, il est nécessaire de procéder à une exérèse totale au-delà des tissus sains

A- VRAI

B- FAUX

16- L'altération l'état général est facteur général qui favorise le furoncle

A- VRAI

B- FAUX

17- L'adénite aigu ou adeno-phlegmon est une complication générale des furoncles

A- VRAI

B- FAUX

18- Le genu varum est la déviation des jambes en dehors et des jambes en dedans (jambe X)

A- VARI

B- FAUX

19- L'anthrax est une agglomération de : (cocher la bonne réponse)

A- Panaris superficiels et profonds

B- Furoncles reliés entre eux par une suppuration du derme

C- Phlegmons des gaines digitales moyennes

20- Deux (02) signes fonctionnels modérés de l'anthrax circonscrit de la nuque au début, parmi ceux indiqués ci-dessous :

A- Malaise général

B- Sensation de tension douloureuse

C- Température variable

D- Prurit

21- Deux (02) signes précocement importants en cas de gangrène gazeuse traduisent la toxémie :

A- Sensation de tension

B- Accélération du pouls

C- Altération du faciès

D- Sensation de crépitation neigeuse

E- Agitation délirante.

22- Inflammation suppurative affectant la moelle et l'os, notamment le tissu conjonctif des espaces travéculaires; deux(02) germes sont en causes : lesquels

A- Pneumocoque

23- Les complications générales des furoncles sont: (choisir les deux bonnes réponses)

A- La septicémie aiguë

B- La lymphangite

C- La bactériémie passagère

D- L'adénite aiguë ou adéno-phlegmon

E- L'abcès chaud circonscrit.

24- Le délai normal de consolidation d'une fracture de la diaphyse de l'humérus est de :

A- 4 semaines

B- 6 à 8 semaines

C- 8 à 12 semaines

25- L'une des complications secondaires des fractures est :

A- Le retard de consolidation.

B- L'atrophie musculaire

C- La lésion nerveuse

26 Le traitement des entorses graves associe deux méthodes; lesquelles?

A- L'immobilisation plâtrée suivie d'une rééducation.

B- La cryothérapie

C- La physiothérapie

D- La suture du ligament

27- Lorsque la hanche est luxée chez le nourrisson avant la marche il y'a : (choisir les deux bonnes réponses).

A- Une asymétrie des plis fessiers.

B- Une déformation de la colonne vertébrale en scoliose.

C- Une situation anormale de la tête du fémur.

D- Bascule du bassin du côté de la luxation

28- la clinique du pied bot varus équin chez le nouveau-né associe (choisir deux bonnes réponses).

A- Une adduction

B- Un pied tendant de plus en plus à s'enrouler sur son bord interne

C- Une supination

D- Un pied avec son bord externe s'allongeant

E- Une attitude vicieuse du pied au repos.

29- Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes :

La moitié de la tête - les deux avant

Bras - la main gauche

En référence au cours sur les brûlures. Selon la règle de BAXTER.

Pour le remplissage vasculaire, la

Formule utilisée à J1 est la suivante :

(Choisir la bonne réponse).

Localisation \ Age	Adulte
Tête	7%
Un avant-bras	3%
Une main	2,5%

A- $J1 = \text{Poids (kg)} \times 5 \times \text{SCB}$

B- $J1 = \text{Poids (kg)} \times 3 \times \text{SCB}$

C- $J1 = \text{Poids (kg)} \times 4 \times \text{SCB}$

30- Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes : la moitié de la tête - les deux avant bras - la main gauche

Selon la table de LUND et BROWDER, la surface corporelle brûlée est :

Localisation \ Age	Adulte
Tête	7%
Un avant-bras	3%
Une main	2,5%

A- 12%

B- 12,5%

C- 15,5%

31- Un patient de 57 ans, 70 kg est reçu aux urgences chirurgicales pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de garde notifie les lésions suivantes :

La moitié de la tête - Les deux avant

Bras - La main gauche

Le premier jour de la prise en charge du patient, le chirurgien décide de réhydrater.

La quantité de soluté indispensable selon la règle de BAXTER est:

Localisation \ Age	Adulte
Tête	7%
Un avant-bras	3%
Une main	2,5%

A- 3360

B- 1680

C- 3500