

SUJET 1 : TOILETTE, BAIN, SOINS DES ORIFICES

ITEMS

1. La toilette est une technique qui consiste à exécuter l'ensemble des soins de propriété du corps **A- vrai** B- faux
2. Il existe trois types de toilettes A- vrai **B- faux**
3. Pour exécuter la toilette du nouveau-né en toute sécurité, quatre précautions sont à prendre A- vrai **B-faux**
4. Le matériel courant pour la toilette du nouveau-né : une cupule, une poubelle ou un haricot **A- vrai** B-faux
5. Pendant la toilette du nouveau-né il n'est pas nécessaire d'insister sur les plis A- vrai **B-faux**
6. La toilette est indiquée chez nouveau-né dont le cordon ombilical n'a pas chuté et dont la plaie ombilicale n'est pas encore cicatrisée **A-vrai** B-faux
7. Pendant la toilette il faut ouvrir les portes et les fenêtres A- vrai **B- faux**
8. Après le soin il n'est pas nécessaire de faire la transmission A- vrai **B-faux**
9. Les soins des orifices se font après l'habillement A- vrai **B- faux**
10. La toilette du nouveau-né se fait : du cou au thorax en passant par l'abdomen, les pieds, les jambes et les cuisses **A- vrai** B- faux
11. Le bain de propriété est un risque pour l'enfant entre 12 et 18 mois A- vrai **B- faux**
12. Il existe 4 types de bain A- vrai **B- faux**
13. Le bain thérapeutique se fait en cas de fièvre **A- vrai** B- faux
14. Le bain, c'est l'immersion du corps de l'enfant dans l'eau afin de maintenir la peau en parfait état de propriété et prévenir l'apparition de lésions cutanées **A- vrai** B- faux
15. Dans le matériel spécifique pour l'exécution du bain chez l'enfant, on a besoin de : deux serviette propres, une poubelle, des vêtements et des couches propres et une cupule **A- vrai** B- faux
16. Le bain est un moment privilégié avec l'enfant pour jouer, dialoguer et rire ensemble **A- vrai** B- faux
17. Le but des soins des orifices c'est d'éliminer une parties des sécrétions en vue de rétablir le fonctionnement normal des orifices A- vrai **B- faux**
18. Les indications des soins des orifices dans vos documents nous en avons énuméré 05 A- vrai **B- faux**
19. Dans le cas où l'œil est chassieux, le nettoyage se fait du coin extérieur vers le coin intérieur **A- vrai** B- faux

20. La malnutrition sévère, les maladies infectieuses, les sécrétions abondantes sont des indications des soins des orifices **A- vrai** B- faux

## **SUJET 2 : SOINS OMBILICAUX, MENSURATIONS, CARNET DE SANTE-MERE ENFANT, GAVAGE**

21. Il existe deux types de soins ombilicaux A- vrai **B- faux**
22. Le pansement du cordon frais a lieu les 04 premiers jours de vie du nouveau-né  
A- vrai **B- faux**
23. Les soins ombilicaux se déroulent en trois phases **A- vrai** B- faux
24. Le pansement du cordon sec se déroule à partir du 5<sup>e</sup> jour de vie du nouveau-né jusqu'à la chute du moignon du cordon A- vrai **B- faux**
25. Dans le pansement du cordon frais, le nettoyage se fait au niveau de l'extrémité du moignon de l'intérieur vers l'extérieur **A- vrai** B- faux
26. Le pansement du cordon sec, le procédé consiste à nettoyer le moignon du cordon ombilical sec de l'extérieur vers la base A- vrai **B- faux**
27. Le cordon chute entre le 8<sup>e</sup> et le 15<sup>e</sup> jour de naissance A- vrai **B- faux**
28. Les indications de croissance permettent de suivre le développement somatique de l'enfant de la naissance à l'adolescence **A- vrai** B- faux
29. Pour un meilleur soin à la Chlorhexidine, il faut appliquer la Chlorhexidine immédiatement après avoir coupé le cordon **A- vrai** B- faux
30. A 12 mois, l'enfant pèse entre 9 et 12 kg **A- vrai** B- faux

## **QCM**

**Entourez la ou les lettres correspondant aux réponses correcte ou incorrecte ; une réponse juste accorde 0,5 point total : 05 point**

31. La pesée se fait :
- A- Une fois par semaine le 1<sup>er</sup> semestre
  - B- Deux fois par mois le 3<sup>e</sup> mois
  - C- Trois fois par mois le 2<sup>e</sup> mois
  - D- Une fois tous les trois mois à partir du 13<sup>e</sup> mois jusqu'à 24 mois**
32. Avant l'alimentation à la tulipe, lorsque la sonde est déjà en place, vous :
- A- Vérifier et mesurer le résidu gastrique
  - B- Faites un lavage gastrique d'abord
  - C- Diminuez la ration de 2 à 5cc
  - D- Sautez un repas et vous informer le pédiatre
33. Pour une alimentation à la tulipe continue, il faut : **(cochez la réponse incorrecte)**
- A- Remplir de moitié la seringue
  - B- Remplir la seringue selon la ration par repas de l'enfant
  - C- Placer la seringue dans le pousse-seringue qui est déjà relié à la sonde
  - D- Régler le chronomètre et le débit

34. L'enfant est déjà alimenté, son résidu gastrique est supérieur au tiers de sa ration  
(cochez la réponse incorrecte)
- A- L'enfant digère bien
  - B- L'enfant digère lentement
  - C- Faire un lavage gastrique
  - D- La ration est importante alors diminuer la ration de 2 à 5cc
35. L'évolution pondérale de l'enfant se fait de la manière suivante, de la naissance à trois mois : (cochez la réponse correcte)
- A- 0 – 3 mois, il prend en moyenne 25 à 30 mg/jr
  - B- 0 – 3 mois, il prend en moyenne 10 mg/jr
  - C- 0 – 3 mois, il prend en moyenne 15 mg/jr
  - D- 0 – 3 mois, il prend en moyenne 20 mg/jr
36. Les éléments quantitatifs de la croissance de l'enfant sont : (cochez la réponse correcte)
- A- Le poids, la taille, le PC, le périmètre thoracique, le périmètre brachial
  - B- Le Z score, le poids, la taille, et le PC
  - C- La croissance des os, la taille, et le périmètre thoracique
  - D- La fermeture de la fontanelle antérieure, la dentition
37. Le carnet mère enfant comprend quatre parties à savoir : (cochez la réponse incorrecte)
- A- 1<sup>ère</sup> partie : identité et conditions de vie des parents
  - B- 2<sup>e</sup> partie : suivi de la grossesse
  - C- 3<sup>e</sup> partie : suivi de la vaccination de l'enfant et de la mère
  - D- 4<sup>e</sup> partie : suivi de l'enfant (sain ou malade)
38. Le carnet de santé mère enfant est un : (cochez la réponse correcte)
- A- Instrument de liaison entre le gynécologue et la SF uniquement
  - B- Un dossier médical pour la mère pendant la grossesse et l'enfant dès la naissance
  - C- Un instrument de liaison entre la mère et l'enfant
  - D- Un instrument de liaison entre le père, la mère et le professionnel de santé
39. A la naissance perd (cochez la réponse correcte)
- A- Le 5<sup>e</sup> de son poids initial et le récupère vers le 7<sup>e</sup> et le 10<sup>e</sup> jour
  - B- Le 1/3 de son poids initial et le récupère vers le 10<sup>e</sup> et le 15<sup>e</sup> jour
  - C- Le 10<sup>e</sup> de son poids initial et le récupère vers 10<sup>e</sup> et le 15<sup>e</sup> jour
  - D- Le ¼ de son poids initial et le récupère vers le 7<sup>e</sup> et le 15<sup>e</sup> jour
40. La perte de poids physiologique est la conséquence de : (cochez la réponse correcte)
- A- L'hérédité
  - B- L'élimination du méconium
  - C- La déperdition d'eau de la peau.