

**2022 KORHOGO 1<sup>er</sup> EXAMEN BLANC DE CERTIFICATION EN GYNECO-OBSTETRIQUE**

**QCD**

1. Dans la réalisation de la GATPA par TCC, on injecte 5 UI de syntocinon\* en IM à la parturiente. **B**
2. Au cours de la délivrance normale, l'hémorragie qui s'écoule par la vulve doit être inférieure ou égale à 500 ml. **B**
3. Dans les suites de couches normales, l'utérus est rétro pubien au 15<sup>ème</sup> jour après l'accouchement. **A**
4. Dans la présentation du sommet, la tête fœtale est bien fléchie. **A**
5. La GATPA est toujours suivie des gestes complémentaires comme le massage utérin et l'examen du placenta. **B**
6. A partir du 2<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse, la parturiente doit porter des chaussures à talon de hauteur courte ou moyenne et à base large. **B**
7. La survenue des contractions utérines qui entraînent une dilatation du col utérin signe le travail de l'accouchement. **A**
8. La traction contrôlée sur le cordon ombilical (T.C.C.) est systématiquement recommandée, en Côte d'Ivoire, durant la délivrance juste après la naissance de J1. **B**
9. Le travail d'accouchement trop rapide et le placenta prævia sont des causes d'hémorragie du post partum immédiat. **A**
10. La chorio-amnionite est une complication des ruptures prématurées des membranes. **A**
11. La mammographie bilatérale et l'échographie pelvienne sont des examens complémentaires pour dépister le cancer du sein. **B**
12. Après la fin du 3<sup>ème</sup> mois de grossesse, le risque de toxicité médicamenteuse est très grand chez le produit de conception. **A**

**SUJET I=CAS CLINIQUE N°1. Points=10**

Mme C.C.C. est venue aujourd'hui à 7 heures en consultation prénatale pour écoulement depuis hier à 8 heures du liquide amniotique sur grossesse à terme. Elle est une 4<sup>ème</sup> geste, 3<sup>ème</sup> pare. Aucune contraction utérine n'est ni signalée à l'interrogatoire, ni objectivée à l'examen physique. Aucune autre pathologie n'est signalée chez Mme C.C.C. Au toucher vaginal combiné au palper abdominal : col

fermé, mesurant 4 cm de long ; bon segment inférieur, présentation du sommet fixée ; bassin maternel normal ; liquide amniotique clair et non fétide.

**13. Chez Mme C.C.C., il s'agit de quel type de rupture spontanée des membranes ? Relever la réponse correcte.**

A : Rupture tempestive des membranes

B : Rupture précoce des membranes

C : Rupture à temps des membranes

**D : Rupture prématurée des membranes**

La Sage-Femme décide de mettre en observation Mme C.C.C. qui entre en travail d'accouchement à 10 heures 40 minutes. Les bruits du cœur fœtal=140/minute et réguliers.

A 12 heures, le col utérin est dilaté à 9 cm et les doigts de la Sage-Femme touchent le cordon ombilical localisé dans le col utérin en avant de la présentation fœtale. Les bruits du cœur fœtal=140/minute et réguliers. A 12 heures 10 minutes, elle accouche par voie basse d'un enfant pesant 3600 grammes ayant un score d'Apgar 8 à la première minute et 8 à la cinquième minute.

**14. En fonction de l'histoire du travail d'accouchement de Mme C.C.C., relever les 2 affirmations exactes parmi les propositions ci-dessous :**

**A : Le nouveau-né de Mme C.C.C. a un bon score d'Apgar à la naissance**

B : Il y avait une procidence du cordon ombilical du 2<sup>ème</sup> degré ou stade 2

C : Il y avait un procubitus du cordon ombilical du 1<sup>er</sup> degré ou stade 1

D : Le nouveau-né de Mme C.C.C. a un mauvais score d'Apgar à la naissance

E : Devant toute procidence du cordon ombilical, il ne faut pas apprécier la vitalité du fœtus en palpant le cordon ombilical pour voir s'il bat.

**F : Il y avait une procidence du cordon ombilical du 1<sup>er</sup> degré ou stade 1**

**15. A l'examen du placenta, vous avez noté dans le registre d'accouchement, les phrases suivantes : (Relever les 2 affirmations qui sont justes)**

**A : Le poids du placenta est normal car il pèse 600 grammes.**

B : Le cordon ombilical est inséré sur la face maternelle du placenta.

C : Le poids du placenta est normal car il pèse 400 grammes.

D : Le poids du placenta est normal car il pèse 500 grammes.

**E : Tous les cotylédons sont en place sur la face maternelle du placenta.**

F : Tous les cotylédons sont en place sur la face fœtale du placenta.

**16. La sage-femme veut éviter que Mme C.C.C. saigne après l'accouchement. Parmi les propositions suivantes, relever celle qui est exacte :**

A : La traction contrôlée sur le cordon ombilical (T.C.C.) est la technique de la G.A.T.P.A. vivement recommandée en Côte D'Ivoire

B : La délivrance dirigée avec le Syntocinon est recommandée juste après la naissance de J1.

C : La traction contrôlée sur le cordon ombilical (T.C.C.) n'est pas systématiquement recommandée durant la délivrance.

D : La traction contrôlée sur le cordon ombilical (T.C.C.) est systématiquement recommandée avant la naissance.

**17. Aussitôt après la G.A.T.P.A. correctement pratiquée, vous, Sage-Femme à 5 étoiles, avez décidé de surveiller Mme C.C.C. (Relever l'affirmation qui est juste) :**

A : Je surveille la perfusion intra-veineuse en cours chez Mme C.C.C.

B : Je surveille les varices et la T.A.

C : Je surveille la survenue d'un ictère et l'écoulement sanguin vulvaire, après avoir ôter la garniture vulvaire.

D : L'un des buts de cette surveillance, est de dépister et traiter une hémorragie du post partum immédiat.

E : L'un des buts de cette surveillance, est de dépister et traiter une endométrite.

F : Je surveille les varices, la T.A., les œdèmes et la coloration de la muqueuse conjonctivale.

**18. Je dois surveiller attentivement chez Mme C.C.C, dans les 3 heures qui suivent la délivrance, les éléments suivants : (Relever l'affirmation qui est juste) :**

A : La reprise du transit intestinal (voir si Mme C.C.C. a fait les gaz).

B : La T.A., la vulve et le poids de l'accouchée.

C : Le globe de sécurité

D : La coloration des conjonctives et les œdèmes de Mme C.C.C.

E : La reprise du transit intestinal (voir si Mme C.C.C. a fait les selles).

F : Le globe de sécurité, la montée laiteuse chez Mme C.C.C. et son nouveau-né.

**19. Vers 20 h 30 mn, Mme C.C.C. saigne abondamment par voie vaginale ; l'utérus**

**est très mou et son fond est situé au-dessus de l'ombilic. (Relever les 2 affirmations qui sont justes)**

**A : Il s'agit d'une hémorragie de la délivrance par atonie utérine chez Mme C.C.C.**

B : Aussitôt, j'organise très rapidement le transfert de Mme C.C.C.

C : Je prescris rapidement le kit de césarienne en attendant l'arrivée du médecin.

D : Je réalise une délivrance artificielle suivie d'une révision utérine avec massage utérin

**E : Aussitôt je réalise une révision utérine suivie de massage utérin.**

F : Je réalise une délivrance artificielle suivie d'une révision utérine

### **SUJET II=CAS CLINIQUE N°2. Points=4**

Mme D.D.D. âgée de 29 ans, femme au foyer, est venue aujourd'hui, voir la sage-femme, car, elle a un mois de retard des règles.

Dans ses antécédents, on note : en juin 2021, une AMIU pour œuf clair à 2 mois ; en octobre 2021, expulsion d'un fœtus mort-né ayant plusieurs malformations dont le bec de lièvre (fente labio-palatine) ; N.B. : Aucune des grossesses antérieures n'a été suivie et aucun vaccin n'a été administré auparavant à Mme D.D.D. durant ses grossesses antérieures. Le test de grossesse est positif chez Mme D.D.D., et l'hémogramme révèle : taux d'hémoglobine=10,5g/100 ml ; Volume globulaire moyen en hémoglobine(VGM) = 97  $\mu$ 3.

**20.Le test de grossesse est positif chez Mme D.D.D. parce que : (Relever la réponse exacte)**

A : Les urines de Mme D.D.D. contiennent l'hormone chorionique gonadotrope sécrétée par la morula

B : Les urines de Mme D.D.D. ne contiennent pas d'albumine et de sucre

C : Les urines de Mme D.D.D. contiennent l'hormone chorionique gonadotrope sécrétée par l'amas interne encore appelé bouton embryonnaire

D : Les urines de Mme D.D.D. contiennent l'hormone chorionique gonadolibérine (H.C.G.) sécrétée par le corps jaune gravidique

E : Les urines de Mme D.D.D. contiennent l'hormone chorionique gonadotrope sécrétée par le corps jaune gravidique

**F : Les urines de Mme D.D.D. contiennent l'hormone chorionique gonadotrope sécrétée par le trophoblaste**

**21.En fonction des éléments cliniques et paracliniques ci-dessus mentionnés chez Mme D.D.D, vous pensez que celle-ci a :(Relever la réponse exacte).**

A : Une anomalie chromosomique

B : Une hémoglobinopathie majeure

C : Une anémie par carence en fer et en acide folique

D : Une anémie par carence en fer

**E : Une anémie par carence en acide folique**

F : Une anémie normochrome normocytaire

**22.Mme D.D.D. souhaite se faire vacciner durant cette grossesse. Parmi les vaccins suivants, indiquer les 2 vaccins à ne pas faire actuellement.**

A : le vaccin anti COVID-19

B : le vaccin anti-hépatite virale B

C : le vaccin anti-poliomyélite injectable

**D : Le vaccin anti-rubéoleux**

**E : le vaccin anti-poliomyélite oral**

F : le vaccin anti-poliomyélite inactivé