

GYNECO N03- LICENCE 2 IDE

DATE : 27/11/2020

DUREE : 15mn

- Choisir A = Vrai si l'affirmation est vraie
- Choisir B =Faux si l'affirmation est fausse
- Une réponse exacte = +1pt
- Une réponse fausse = -1 pt
- Aucune réponse = 0 pt

NB: L'étudiant doit composer qu'une (1) seule fois, autrement il sera sanctionné par une note de 00/20

...

* Obligatoire

1. MATRICULE *

18-1432IA

2. FILIERE *

Infirmier

3. NOM (en Majuscule) *

KONAN

4. PRÉNOMS (en Majuscule) *

Kouakou priva

5. La MILDA est instituée pour la prévention de l'anémie chez la femme enceinte (1 point)

VRAI

FAUX

6. La CPN du 2e trimestre permet d'évaluer le pronostic d'accouchement par voie basse
(1 point)

VRAI

FAUX

7. Le RCF normal est compris entre 100 et 160 bpm
(1 point)

VRAI

FAUX

8. Le traitement prophylactique anti palustre débute uniquement lorsque la femme enceinte ressent les MAF
(1 point)

VRAI

FAUX

9. Les facteurs de mortalité maternelle s'expliquent par les 2 retards
(1 point)

VRAI

FAUX

10. Dans la GEU les signes sympathiques de la grossesse sont exacerbés
(1 point)

VRAI

FAUX

11. Devant un avortement molaire, la sage-femme doit prendre une voie veineuse et réaliser l'AMIU après l'accord de son médecin responsable

(1 point)

VRAI

FAUX

12. La procidence du cordon est une chute du cordon en arrière de la présentation à membranes rompues

(1 point)

VRAI

FAUX

13. Le traitement de la GEU consiste en une césarienne en urgence

(1 point)

VRAI

FAUX

14. La GEU se définit comme l'implantation de l'œuf dans la cavité utérine

(1 point)

VRAI

FAUX

15. La recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux se fait à la 2e et 3e CPN

(1 point)

VRAI

FAUX

16. La première échographie du premier trimestre pour la confirmation de la grossesse doit être réalisée à la 22e semaine d'aménorrhée

(1 point)

VRAI

FAUX

17. La MAP se définit par une modification du col

(1 point)

VRAI

FAUX

18. Le sulfate de magnésium est le traitement de la crise d'éclampsie

(1 point)

VRAI

FAUX

19. Le placenta prævia fait partie des causes de métrorragies du 2e trimestre

(1 point)

VRAI

FAUX

20. Citez les causes obstétricales directes de mortalité maternelle :

(1 point)

A- Hémorragie

B- Eclampsie

C- VIH et SIDA

D- Paludisme

21. Quels sont les 2 éléments permettant de faire le diagnostic de l'HRP ?
(1 point)

A. Utérus de bois

B. Perception des parties fœtales sous la peau

C. Col utérin cerclé

D. Métrorragies rouges de moyenne abondance

E. Utérus mou

22. Retrouvez 2 complications fœtales de l'anémie au cours de la grossesse
(1 point)

A. Mort fœtale in utéro

B. Retard de croissance in utéro

C. Infections urinaires

D. Communication interventriculaire

E. Macrosomie

23. La grossesse extra-utérine est :
(1 point)

A- Une grossesse qui peut évoluer jusqu'à terme

B- Une prolifération anormale du trophoblaste

C- De localisation abdominale dans la majorité des cas

D- L'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine

24. Le traitement de première intention du paludisme au cours de la grossesse est :
(1 point)

A. La quinine

B. La sulfadoxine

C. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine

D. La Sulfadoxine-pyriméthamine

25. La prévention du paludisme au cours de la grossesse repose sur 2 des axes suivants
(1 point)

A. L'utilisation de la MILDA

B. La chimioprophylaxie par la Méfloquine

C. La lutte anti vectorielle par insecticide

D. La chimioprophylaxie à l'Artéméther-Luméfántrine

E. La chimioprophylaxie à la Sulfadoxine-Pyrimétamine

26. Parmi les propositions suivantes, laquelle fait partie des facteurs de risque de l'hémorragie de la délivrance :

(1 point)

A- Antécédent d'hémorragie de la délivrance

B- Primiparité

C- Grossesse extra utérine

D- Prématurité

27. Identifiez 2 gestes Une hauteur utérine excessive peut faire évoquer tous les diagnostics suivants sauf un :

(1 point)

- A. Une hydrocéphalie fœtale
- B. Une grossesse extra-utérine
- C. Un fibrome associé à une grossesse
- D. Un hydramnios

28. Les gestes essentiels de la réanimation néonatale sont

(1 point)

- A. Aspiration des voies aériennes
- B. Toilette à la chlorexidine
- C. Réchauffement sous lampe chauffante
- D. Ventilation à l'ambu
- E. Massage cardiaque

29. La GATPA comporte 3 phases/ cocher les réponses fausses

(1 point)

- A. L'injection de 10UI en IM de Syntocinon
- B. La vidange vésicale
- C. La TCC
- D. Le massage utérin

E. L'injection de 10UI en IV de Syntocinon

30. Les gestes contemporains à la délivrance sont : trouvez les deux réponses exactes
(1 point)

A. Examen des voies génitales

B. Examen du placenta et des membranes

C. Assurer la surveillance stricte dans les 6h du post partum

D. Faire une révision utérine systématiquement

E. Assurer la vidange vésicale

31. Citez 2 causes obstétricales indirectes de mortalité maternelle :
(1 point)

A- Hémorragie

B- Eclampsie

C- VIH et SIDA

D- Paludisme

E- Avortement provoqué

32. Citez deux causes fœtales de prématurité
(1 point)

A. Hydramnios

B. Grossesse multiple

C. Anémie

D. HTA

E. Diabète maternel

33. La prise de poids normale au cours de la grossesse ne doit pas excéder :

(1 point)

A. 20 kgrs

B. 16 kgrs

C. 12 kgrs

D. 10 Kgrs

34. Dans les 2 pathologies suivantes la myomectomie est un facteur favorisant :

(1 point)

A- Le placenta praevia

B- L'hématome retro placentaire

C- La rupture utérine

D- La rupture prématurée des membranes

E- Grossesse extra-utérine

35. Quels sont les signes cliniques en défaveur d'une GEU ?

(1 point)

A- L'utérus est augmenté de volume

B- Des métrorragies minimales sépia

C- L'œuf est perçu sous la peau

D- Masse latéro-utérine

E- Algies pelviennes

36. Les objectifs de la 2eme CPN sont : cocher la réponse fausse
(1 point)

A. Réévaluer les facteurs de risque

B. Vérifier la bonne évolutivité de la grossesse

C. Faire les prescriptions

D. Confirmer la grossesse

37. Au 6ème mois de la grossesse, la hauteur utérine normale doit être de :
(1 point)

A. 20 cm

B. 22 cm

C. 24 cm

D. 28 cm

38. Quel est parmi les signes suivants, le signe annonciateur d'une crise d'éclampsie ?
(1 point)

A. Œdèmes des membres inférieurs.

B. Vomissements à répétition

C. Douleurs épigastriques en barre.

D. Une dyspnée de décubitus

39. L'évaluation du bien-être foetal est appréciée par :
(1 point)

- A- Le rythme cardiaque foetal
- B- Degré de modelage de la tête
- C- Le niveau de la présentation foetale

Envoyer

Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Avec Microsoft Forms | [Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)