

SANTÉ INFANTILE GROUPE 1

1. Le périmètre crânien augmente de 1 cm entre 0-3 mois **A**
2. Le germe du tétanos néonatal est le clostridium tétanique **A**
3. La phase d'incubation est marquée par des difficultés d'alimentation **B**
4. Le tétanos modéré a un score compris entre 4 et 6. **B**
5. Le SAT est recommandé en cas de tétanos néonatal **B**
6. L'intérêt des soins essentiels est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles en Côte d'Ivoire **A**
7. La conduite de la diversification alimentaire avec les produits frais locaux dès l'âge de 6 mois favorise la survenue des vomissements du nourrisson. **B**
8. L'hypoglycémie est un risque lié à la prématurité. **A**
9. L'existence de conflit entre le père et la mère est un facteur favorisant des vomissements de l'enfant. **B**
10. Un nouveau-né normal pesant 3 500 g à la naissance aura 10 500 g à 12 mois. **B**
11. Un vomissement est un rejet volontaire par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique. **A**
12. Jusqu'à 3 ans, on utilise un pèse bébé pour le poids **B**
13. A 5 mois, un nouveau-né normal double son poids. **B**
14. Pour préparer le bol de lait d'un enfant âgé de 2 jours à l'Alimentation de Remplacement, il faut une mesurette rase de lait NAN 2. **B**
15. Entendre l'enfant déglutir est l'un des critères d'une bonne succion. **A**
16. L'enfant âgé de 13 jours a droit à 120 ml de Ration par Repas. **B**
17. Le haricot est un matériel courant de soin dans lequel est déposé les compresses propres **B**
18. Le nettoyage du siège mouillé se fait après le soin. **B**
19. La technique de la toilette consiste à savonner le corps de l'enfant avec un gant et le sécher avec le second gant **B**
20. Une succion lente, profonde et continue est un critère d'une bonne succion. **A**

QCM

21. Quelle est l'affirmation juste parmi les suivantes ?

Entre 0-3 mois, le périmètre crânien d'un nourrisson à développement physique normal augmente de :

- B- 0,5 cm
- C- 1,0 cm
- D- 1,5 cm
- E- **2,0 cm**

22. À quel âge se ferme normalement la fontanelle antérieure ? A. 12 mois.

- A. 12 mois.
- B. 16 mois
- C. **18 mois**

1. 14 mois Un nourrisson de 9 mois a combien de dents ?

- A. **Six dents**
- B. Dix dents
- C. Deux dents
- D. Quatre dents

2. La pesée se fait :

- A. Une fois par semaine le 1er semestre ;
- B. Une fois tous les six mois de 24 mois jusqu'à 36 mois ;
- C. **Une fois par mois de 4 mois à 1 an ;**
- D. Une fois par mois le 2ème mois ;
- E. **Une fois tous les 3 mois au premier trimestre ;**

Choisissez les deux réponses justes

3. Le pansement du cordon sec se fait à partir du :

- A. 4ème jour jusqu'à la cicatrisation de la plaie ombilicale ;
- B. **4ème jour jusqu'à la chute du cordon ;**
- C. 6ème jour jusqu'à la chute du cordon ;

Cocher la réponse correcte

Les gestes ci-dessous sont effectués pendant la minute d'or

- A. Sectionner le cordon ombilical, puis ventiler le bébé
- B. **Sécher le nouveau-né avec un linge propre et sec tout en le stimulant par des frictions :**
- C. Demander de l'aide et améliorer la ventilation,
- D. Mesurer le rythme cardiaque par la palpation du moignon du cordon

Choisissez la bonne réponse

4. Le périmètre crânien à la naissance est de 35 à 36 cm puis il augmente :
- A. **De 3 cm de 3 mois à 6 mois**
 - B. De 1 cm de 6 mois à 12 mois
 - C. De 2 cm de la naissance à 3 mois
 - D. De 1 cm de 4 mois à 24 mois

Choisissez la bonne réponse

5. Les différentes parties du carnet de santé mère-enfant sont:
- A. **L'identité des parents**
 - B. **Le suivi de la grossesse**
 - C. **La vaccination de l'enfant**
 - D. L'accouchement
 - E. Les consultations curatives de l'enfant.

Entourez les trois bonnes réponses

6. Le vernix caseosa est:
- A. Le fin duvet recouvrant les épaules et le dos du prématuré
 - B. **Un enduit gras recouvrant presque tout le corps**
 - C. Une hypertrophie des glandes sébacées.
 - D. Des taches sur le visage du nouveau-né

7. La première émission d'urine chez le nouveau-né commence :
- A. A la 24ème heure
 - B. Autour de la 24me heure
 - C. Après la 24ème heure
 - D. **Avant la 24ème heure**

8. Le cordon ombilical tombe
- A. Au 15ème jour
 - B. Au 10ème jour
 - C. **Au 7ème jour**
 - D. Au 21ème jour

32. Je reçois un nourrisson de 12 mois pesant 12 kg. Il est correctement alimenté depuis la naissance. Le poids de naissance était :

- A. 2500 grammes
- B. 2800 grammes
- C. **3500 grammes**

D. 4000 grammes

33. Les éléments suivants sont des critères morphologiques de prématurité sauf un. Lequel ?
- A. Cartilage du lobule de l'oreille est mou ou absent
 - B. Nodule mammaire est supérieur à 10 mm
 - C. **Testicules sont absents dans les bourses chez le garçon**
 - D. Petites lèvres chez la fille sont saillantes
34. Chez le prématuré, quelle est la maladie qui est due à un déficit en surfactant ?
- A. Hépatite
 - B. Infection bactérienne
 - C. Maladie hémorragique
 - D. **Maladie des membranes hyalines**
35. Le nourrisson GH émet les sons « da-da-da » et se tient debout avec appui. Je conclus que GH a les acquisitions psychomotrices d'un enfant de :
- A. **12 mois**
 - B. 9 mois
 - C. 8 mois
 - D. 6 mois

Cocher la bonne affirmation

36. Quelle est la complication des vomissements chroniques du nourrisson ?
- A. Dénutrition
 - B. **Sténose du pylore**
 - C. Otite moyenne aiguë
 - D. Occlusion intestinale

Cocher la bonne affirmation

37. L'âge gestationnel du moyen prématuré est !
- A. **[33-35] semaines d'aménorrhée**
 - B. [33-3] semaines d'aménorrhée
 - C. [33-35] semaines d'aménorrhée
 - D. [33-35] semaines d'aménorrhée

Cocher la bonne réponse

38. Le périmètre crânien augmente de
- A. **1 cm entre 0-3 mois.**
 - B. 0,5 cm entre 0-3 mois
 - C. 1,5 cm entre 0-3 mois
 - D. 3 cm entre 0-3 mois

39. Le colostrum est :
- A. De couleur blanchâtre
 - B. **Excellent laxatif ;**
 - C. Riche en antigène
 - D. Prévient l'allergie et la tolérance Choisissez la réponse correcte

40. Les facteurs entravant l'allaitement sont :
- A. Le vidange des seins
 - B. **Les préoccupations d'ordre culturelles de la mère**
 - C. L'activité professionnelle éloignant l'enfant de sa mère
 - D. Le soutien-gorge trop serré
 - E. La vue de son bébé
 - F. **Le manque de soutien psychologique de la mère allaitante**

Choisissez les deux réponses correctes

41. Lorsqu'une mère a une infection des seins, il faut :
- A. Demander à la mère de continuer l'allaitement ;
 - B. Lui conseiller l'extraction manuelle du lait :
 - C. **Prescrire des antibiotiques ;**
 - D. Appliquer des compresses froides sur les seins

Choisissez la bonne réponse

42. Une mère peut sevrer définitivement son enfant
- A. A partir de 6 mois
 - B. A partir de 1 an
 - C. A partir de 1 an et demi
 - D. **A partir de 2 ans**

Cocher la réponse correcte

43. Cocher seulement la bonne réponse concernant les modalités de l'alimentation du nourrisson recommandées par l'OMS
- A. **Allaitement exclusif s'étend de 0-5 mois**
 - B. Alimentation de compléments seins s'étendent de 6-12 mois
 - C. Seins repas familial s'étendent de 12-18mois
 - D. Sevrage définitif à partir de 18 mois

Entourez la réponse exacte

44. Le rôle préventif de l'agent de santé dans la prise en charge des vomissements de l'enfant s'effectue dans le cadre d'une communication pour un changement de comportement des parents. Les thèmes abordés sont les suivants sauf un, lequel ?
- A. Sensibilisation de la mère à l'allaitement exclusif entre 0 et 6 mois
 - B. **Nécessité de séparer le nourrisson de sa mère**
 - C. Importance du respect de l'appétit et du goût de l'enfant
 - D. Sensibilisation de la mère pour qu'elle fasse roter l'enfant après chaque tétée

45. Quelle est la complication des vomissements chroniques du nourrisson ?

- A. **Dénutrition**
- B. Sténose du pylore
- C. Otite moyenne aiguë
- D. Occlusion intestinale

46. Sur la liste suivante, quelle est la cause des vomissements chroniques ?

- A. **Erreur diététique**
- B. Occlusion intestinale
- C. Atrésie de l'œsophage
- D. Intoxication alimentaire

47. Quelle est la définition du prématuré selon l'OMS ?

Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge gestationnel est compris entre :

- A. 28 semaines et 42 semaines révolues
- B. **28 semaines et 37 semaines révolues**
- C. 37 semaines et 42 semaines révolues
- D. 22 Semaines et 37 semaines révolues

48. La première émission d'urine chez le nouveau-né commence :

- A. A la 24 heures
- B. **Autour de la 24 heures**
- C. Après la 24 heures
- D. Avant la 24 heures

49. Le méconium représente

- A. L'émission de selles chez le prématuré
- B. L'émission de selles chez le nouveau-né normal avant 24 heures
- C. **Les 1ère émissions de selles chez le nouveau-né.**
- D. Les selles jaunâtres du nouveau-né

50. Le cordon ombilical tombe

- A. Au 15 jours
- B. Au 10m jour
- C. **Au 7 jours**
- D. Au 21 jours

