

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRES

infas auxillaires de sante 2° annee
tolla mathias yeman (IDES CARDIOLOGIE)

ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFERIEURS

ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFERIEURS

OBJECTIF GENERAL : A la fin du cours, l'étudiant auxiliaire de sante doit être capable d'assurer la prise en charge de tout patient souffrant d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- 1 définir sans en altérer le sens L'AOMI
- 2 énumérer les principaux signes cliniques de L'AOMI
- 3 décrire la CAT dans la prise en charge d'un patient atteint de AOMI

ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

1 DEFINITION

L'AOMI est l'obstruction de la lumière de l'artère du membre inférieur par une plaque d'athérome entraînant une réduction du flux sanguin et de l'oxygène au niveau du membre

2 FACTEURS DE RISQUE

-le tabagisme

-l'HTA

Le DIABETE

-l'âge



ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

3 LES SYMPTOMES

Les symptômes généraux de la maladie sont :

Douleurs musculaires au niveau des membres inférieurs, et plus particulièrement au niveau de jambes

Apparition de crampes répétées (claudications)

Ces douleurs s'intensifient à la marche (pente, montée des escaliers) et obligent la personne à s'arrêter



ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

4 EXAMEN CLINIQUE

- la palpation des pouls au niveau de l'artère pédieuse, poplitée et tibiale qui sont diminuées ou abolies
- recherche de chaleur locale (avec le dos de la main)

Auscultation des trajets artériels à la recherche de souffles systoliques

5 EXAMENS PARA CLINIQUE

- biologie (bilan standard)
- échodoppler vasculaire
- électrocardiogramme
- radiographie pulmonaire



ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS



ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

6 COMPLICATIONS

- occlusion artérielle aigue
- gangrène
- complication emboliques

7 TRAITEMENT

- suppression des facteurs de risque (tabac, traitement du diabète, hygiène de vie...)

Rééducation physique avec reprise de la marche

- les médicaments (vasodilatateur, antalgique...)



ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

8 CONDUITE A TENIR DEVANT UNE AOMI

- accueillir le patient
- installer le patient jambe pendante
- le rassurer
- faire les soins locaux(en cas de lésions)

ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES

