



[T-A]

LA LICENCE 1 EN POCHE



DOCUMENT DES ÉVALUATIONS POUR LA LICENCE 1 PROMOTION 34

Sujet anatomie physiologie Korhogo

- 1- L'ensemble des réaction chimiques qui se déroulent dans l'organisme aboutissant à la formation de l'énergie et des déchets métaboliques s'appelle
A- Anabolisme
B- Catabolisme
- 2- La cellule est la plus petite portion de la matière vivante capable d'exister de façon dépendante
A-vrai
B-faux
- 3- Les métazoaires sont des organismes formés d'une seule couche
A-vrai
B-faux
- 4- La cytologie est l'étude de la cellule par sa constitution, sa morphologie et son évolution A-vrai
B-faux
- 5- Les plus grandes cellules n'atteignent pas 10 cm
A-vrai
B-faux
- 6- L'ultrastructure de la cellule monte de nombreux organites, des inclusions cytoplasmique et hyaloplasme
A-vrai
B-faux
- 7- Le noyau est le siège de toute l'information génétique chez les procaryotes
A-vrai

B-faux

- 8- Les ribosomes constituent les centrales énergétiques de la cellule concurremment avec les mitochondries

A-vrai

B-faux

- 9- Les inclusions cytoplasmiques ou vacuoles chez la cellule animale ne font pas partie intégrante de la matière vivante

A-vrai

B-faux

- 10- La tête de l'ulna participe à l'articulation du coude

A-vrai

B-faux

- 11- L'ingus est un os impair

A-vrai

B-faux

- 12- L'angle sternal est situé entre le corps du sternum et l'appendice xiphoïde

A-vrai

B-faux

- 13- Les côtes qui se terminent en avant par un cartilage commun sont constituées des 9¹⁰ et 11^{nièmes} paires de côtes

A-vrai

B-faux

- 14- Le zygoma est issu d'une ossification cartilagineuse

A-vrai

B-faux

- 15- Les os du tarse sont des os irréguliers

A-vrai

B-faux

- 16- Le coccyx fait partie de la ceinture pelvienne

A-vrai

B-faux

- 17- Le cartilage articulaire est le prolongement de la membrane fibroélastique

A-vrai

B-faux

- 18- La malléole latérale constitue l'extrémité inférieure de la fibula
A-vrai
B-faux
- 19- Le capitulum s'articule avec le radius
A-vrai
B-faux
- 20- Les muscles scalènes et le sterno-cléido mastoïdien sont des muscles latéraux du cou A-vrai
B-faux
- 21- Le grand pectoral ; le petit pectoral, le sous clavier, le grand dentelé, les intercostaux, surcostaux et sous costaux sont les muscles du dos
A-vrai
B-faux
- 22- Le muscle lisse est le muscle qui tapisse la paroi viscérale
A-vrai
B-faux
- 23- Le muscle cardiaque est responsable de l'oxygénation et de l'irrigation en volume sanguin des différents organes du corps,
A-vrai
B-faux
- 24- Le cerveau forme avec le tronc cérébral l'encéphale
A-vrai
B-faux
- 25- Les fibres nerveuses forment avec les fibres nerveuses voisines un organe appelé faisceau nerveux
A-vrai
B-faux
- 26- Les synapses axo-musculaires ou plaques motrices assurent la tonicité du muscle
A-vrai
B-faux
- 27- Les 31 paires de nerfs rachidiens émergent du tronc cérébral
A-vrai
B-faux

- 28- Les 4 phases de la mitose sont dans l'ordre
- A- Anaphase – télophase – interphase – métaphase
 - B- Prophase – anaphase – métaphase – télophase
 - C- Anaphase – télophase – prophase – métaphase
 - D- Prophase – métaphase – anaphase – télophase
 - E- Métaphase – anaphase – télophase – prophase
- 29- La métaphase de la mitose est caractérisée par
- A- La division des deux chromosomes fils
 - B- La division des nucléoles
 - C- Présence des chromosomes au centre de la cellule formant la plaque équatoriale
- 30- La télophase est caractérisée par
(cochez les 2 bonne réponse)
- A- La densification de la chromatine pour former les chromosomes
 - B- La formation de 2 cellules filles identiques
 - C- La migration des chromosomes fils vers les pôles
 - D- Apparition du noyau et de la membrane nucléaire
- 31- La mitose équationnelle donne naissance à
- A- Des cellules haploïdes (n chromosomes)
 - B- Des cellules diploïdes ($2n$ chromosomes)
 - C- Des cellules haploïdes et de cellules diploïdes
- 32- L' Amitose est un mode de division cellulaire chez
- A- Les organismes unicellulaires
 - B- Les métazoaires
 - C- Les organismes unicellulaires et les métazoaires
- 33- La structure de la cellule au microscope optique présente à décrire les éléments suivants
(cochez la bonne réponse)
- A- a/ribosome b/membrane plasmique c/noyau
 - B- a/noyau b/cytoplasme c/membrane cytoplasmique
 - C- a/réticulum endoplasmique granuleux b /cytoplasme c/ hyaloplasme
- 34- La spermatogénèse qui est une cellule $2n$ chromosome donne après méiose naissance à 4 spermatozoïdes possédant chacun
- A- n chromosome
 - B- $2n$ chromosome
 - C- $2n+1$ chromosome
- 35- Tous les êtres humains sont issus d'une cellule unique (cochez la bonne réponse)
- A- haploïde (n chromosome)
 - B- Diploïde ($2n$ chromosome)

C- Haploïde et diploïde

36- Cochez la bonne définition du catabolisme

A- Le catabolisme est la dégradation par la cellule de molécule complexe en molécule plus simple

B- La catabolisme est l'utilisation par la cellule des éléments simples contenus dans son environnement

C- La bonne définition du catabolisme associe les réponses A et B

37- La division directe ou amitose se déroule uniquement chez les êtres unicellulaires et (cochez la bonne réponse)

A- donne naissance à 2 cellules rigoureusement identiques entre elles et la cellule mère

B- donne naissance à 2 cellules grossièrement semblables

C- Donne naissance a 4 cellules grossièrement semblables

38- La membrane cytoplasmique est composée comme suit : cochez la bonne réponse

A- 2 couches protidique entourant une couche lipidique

B- 2 couches lipidiques entourant une couche protidique C- 3 couches de lipide

39- Cochez la bonne définition du tissu

A- Un tissu est un ensemble de cellule qui remplissent en commun un certain nombre de fonctions indéterminées dans l'organisme

B- Un tissu est un ensemble de cellules qui remplissent individuellement un certain nombre de fonction déterminées dans l'organisme

C- Un tissu est un ensemble de cellules qui replissent en commun un certain nombre de fonctions déterminées dans l'organisme

D- Un tissu est un ensemble de cellules qui remplissent en commun un certain nombre d'échanges dans l'organisme

40- Quelles sont les principales variétés de tissu dans cette liste

A- Le tissu adipeux

B- Le tissu conjonctif

C- Le tissu glandulaire

D- Le tissu de régulation

41- Dans cette liste identifier les deux tissus glandulaire exocrines

A-Sudoripare

B- Pancréas

C- Foie

D- sébacée

E- Testicule

F- Ovaire

42- Le tissu épithélial de revêtement peut prendre deux de ces formes les quelles

- A- Ronde
- B- Cylindrique
- C- Cubique
- D-Triangulaire
- E- Carrée

43- Le tissu conjonctif peut être

- A- Lâche
- B- Strié
- C- Gelé
- D- Dense

44- Deux de ces éléments composent le tissu conjonctif.

Lesquelles

- A- Chondrocyte
- B- Adipocyte
- C- Histiocyte
- D- Mucopolysaccharide

45- Deux de ces tissus sont classés parmi les tissus conjonctifs particuliers dans cette liste ;
lesquels

- A- L'épithélium
- B- Le sang
- C- La fibrose
- D- L'adipocyte
- E- Le tissu nerveux
- F- Les glandes

46- Une cellule nerveuse est une cellule animale identifiable par

- A- Ses inclusions cytoplasmiques
- B- Le nombre de ses mitochondries
- C- Ses ramifications

47- L'axone assure à lui seul les fonctions de transmission de l'influx nerveux

- A- vrai
- B- faux

48- Les enveloppes du système nerveux central sont au nombre de

- A- 2
- B- 3
- C- 4
- D- 5

49- La moelle épinière part du bulbe et s'arrête à :

- A- L1
- B- L2
- C- L3

D- L4

50- Les nerfs crâniens innervent uniquement la tête

A- Vrai

B- Faux

51- La lésion du nerf facial entraîne la paralysie faciale

A- vrai

B- faux

52- Dans l'hémiplégie la déviation de la bouche se fait toujours vers

A- L'hémicorps paralysé

B- L'axe du corps

C- L'hémicorps sain

53- La cellule nerveuse est l'unité fonctionnelle du système nerveux

A-Vrai

B- Faux

54- Parmi ces nerfs crâniens un seul n'innerve pas la tête

A- Le nerf X

B- Les nerfs XI

C- Le nerf VIII

D- Le nerf I

55- Le sens de l'influx nerveux de la périphérie au niveau central

A- Dendrite - corps de la cellule nerveuse – axone

B- Corps de la cellule nerveuse- Dendrite – axone

C- Axone- dendrite- corps de la cellule nerveuse

56- Deux éléments font parties des fonctions essentielles des os lesquels

A- Être un support et d'encrage à tous les organes mous

B- permettant au muscle squelettique de se fixer

C- Permettant au cerveau et la moelle épinière les organes intrathoraciques de se nourrir

D- Ils participent à la formation des tissus à partir des cellules

57- Deux de ces éléments font partie du squelette axial lesquels

A- La cage thoracique

B- Le crâne

C- Le fémur

D- L'humérus

E- Les phalanges

F- Le calcanéum

58- Deux de ces éléments font partie de la voûte crânienne. Lesquelles

A- Le frontal

B- L'éthmoïde

C- L'os lacrymal

D- La voûte du palais E- L'OS palatin

F- Le Pariétal

59- Deux de ces muscles font partie du plan superficiel du groupe musculaire postérieur .
Lesquels

A- Le triceps sural

B- Le plantaire

C- Tibia postérieur

D- Long fléchisseur

ÉVALUATION N1 SÉMIOLOGIE MÉDICALE L1 IDE & SF/MTC 2023

1.L'épidémiologie étudie les facteurs de risque d'une maladie. : **Vrai**

2.L'hémoptysie est une expectoration de sang au cours d'un effort de toux : **Vrai**

3.La rétention vésicale est l'impossibilité complète d'obtenir l'évacuation vésicale . : **Faux, plutôt Difficultés à uriner et à vider complètement la vessie**

4.L'abcès hépatique est une cause de vomique : **Vrai**

5.La syncope est une perte de connaissance brutale, totale et brève ,en général avec chute : **Vrai**

6.L'étiopathologie décrit le mécanisme par lequel la cause aboutit à la maladie : **Vrai**

7.La gastrodynie est :

- A) Inflammation des seins
- B) Écoulement des laits par le mamelon en dehors de la lactation**
- C) Douleurs mammaires

8. Le pyrosis est le reflux d'aliments avant sa digestion. : **Vrai**

9. La dysurie traduit un obstacle vésical, prostatique ou urétral : **Vrai**

10. Lorsqu'une maladie est causée par un parasite, la cause est directe : **Vrai**

11. La coalescence vulvaire désigne :

- A) Les grandes lèvres colées
- B) Les petites lèvres colées**
- C) Les malformations du col utérin

12. L'agueusie désigne :

- A) Le goût amer
- B) La perte du goût**
- C) La perte de l'odorat

13. L'anorexie fait partie des signes généraux d'une maladie. : **Vrai**

14. La douleur de l'angine de poitrine survient à l'effort : **Vrai**

15. L'émission de gaz mêlé à l'urine signe pratiquement la communication entre l'appareil digestif et urinaire, cause de fistule colo-vésicale : **Vrai**

16. L'aménorrhée est

- A) L'abondance de règles
- B) L'absence des règles**
- C) Le saignement en dehors de règles

17. La lipothymie est un malaise brutal avec sensation de perte de connaissance imminente, sans que celle-ci n'arrive : **Vrai**

18. Le symptôme décrit les plaintes exprimées par le malade. : **Vrai**

19. La dyspnée au cours des cardiopathies est en général une polypnée : **Vrai**

20. Les veines pulmonaires s'abouchent dans :

- A) L'oreillette droite
- B) L'oreillette gauche**
- C) Le ventricule droit
- D) Le ventricule gauche

21. La nosologie est la classification des maladies : **Vrai**

23. La nosologie est la classification des signes : **Faux**

24. Rechercher les antécédents pulmonaires du client est un geste infirmier dans la prise en charge d'un malade présentant une hémoptysie. : **Vrai**

25. L'hémossalorrhée est une cause de vomique : **Faux**

26. La sténose pylorique est une cause médicale . : **Faux**

27. La valve cardiaque qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit est :

- A) La valve mitrale
- B) La valve tricuspide**
- C) La valve aortique

28. L'épistaxie est une cause d'hémoptysie. : **Faux**

29. L'hypoacousie est le fait de :

- A) Ne pas entendre
- B) Une sensation de bruit dans l'oreille
- C) Entendre faiblement**
- D) Entendre distinctement

30. Les troubles des glandes surrénales entraînent

- A) L'hyperglycémie
- B) L'hypercorticisme
- C) L'hyperglycémiant**
- D) L'hyper androgénie

31. Dans les affectations de la glande thyroïdienne il s'observe :

- A) Une hyperthyroïdie**
- B) Une hyperglycémie
- C) Une hyper androgénie

32. L'hyper androgénie provoque chez l'homme une puberté précoce avant 10 ans par la sécrétion de gonadostimuline : **Faux**

33. Un syndrome est défini par des critères cliniques, paracliniques et physiologiques : **Vrai**

34. L'éructation est l'émission bruyante par la bouche d'aliments provenant de l'estomac : **Vrai**

35. Le fécalome est un retard à l'évacuation des selles au-delà de 3 jours : **Faux**

36. La palpitation est une perception anormale des battements cardiaques qui paraissent irréguliers : **Vrai**

37. Le cœur humain donne à décrire :

- A) Deux cavités
- B) Trois cavités
- C) Quatre cavités**

38. La polydipsie est une exagération de la sueur . : **Faux**

39. Des signes suivants sont liés à la perturbation des glandes surrénales :

- A) Les faiblesses du système de défense
- B) Les troubles cardiaques**
- C) Les troubles digestifs
- D) Les troubles nerveux**

40. La boulimie est une manifestation de la restriction alimentaire : **Faux**

41. La potomanie est le besoin de boire en grande abondance de l'eau. : **Vrai**

42. L'amnésie est :

- A) Une capacité d'une personne de se rappeler du vécu
- B) Une incapacité d'une personne de se rappeler de vécu**
- C) Un signe de vieillissement du cerveau

43. La flatulence est la présence de gaz dans l'estomac avec sensation de ballonnement provoquant des renvois : **Vrai**

44. La dyspnée au cours des cardiopathies survient uniquement à l'effort. : **Faux**

45. La sémiologie respiratoire est une science qui étudie les cellules respiratoires : **Faux**

46. La douleur de l'angine de poitrine se ressent sur la colonne vertébrale. : **Faux**

47. La pancréatite est une cause extradigestive des troubles de la digestion : **Faux**

48. La sémiologie fonde le comportement médical. : **Vrai**

49. La douleur urinaire irradiant habituellement vers le bas, suivant le trajet des voies excrétrices puis les organes génitaux : **Vrai**

50. Le ventricule est une cavité, localisée dans la partie supérieure droite du cœur. : **Faux**

52. Mouiller le lit sans se rendre compte indique :

- A) Une anurie
- B) Une incontinence d'urine**
- C) Une rétention d'urine

53. La vomique est une forme d'expectoration caractérisée par le rejet brutal et massif d'une grande quantité de pus au cours d'un effort de toux : **Vrai**

54. Une altération anatomopathologie permet de définir une maladie. : **Vrai**

55. Bradycardie est le ralentissement du rythme cardiaque inférieur à 50 pulsations/ minutes : **Vrai**

56. L'artère pulmonaire est un vaisseau qui éjecte, à partir du ventricule droit, le sang vers les poumons : **Vrai**

57. L'hyperthyroïdie est due à une augmentation des hormones thyroïdiennes dans les urines : **Vrai**

58. Les symptômes objectifs sont révélés par l'interrogatoire. : **Faux**

59. Le ventricule droit est une cavité, localisée dans la partie inférieure gauche du cœur, point de départ de la circulation systémique : **Faux**

60. Un rejet de sang noir par la bouche au cours d'un effort de vomissement est une hématemèse. : **Vrai**

61. La physiologie est l'étude de la modification des grandes fonctions au cours des maladies : **Faux**

62. L'hyperandrogénie provoque chez l'homme une puberté précoce avant 10 ans par la sécrétion de gonadostimuline : **Faux**

DEVOIR (TEST) SSP Santé Publique IDE/SF L1 2023

1.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et trois composantes promotionnelles.

A

B

2.Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

A-les SSP sont des soins essentiels

B-les SSP sont des soins adoptés

C- les SSP sont des soins accessibles

D-les SSP sont des soins intègres

3..Le CHR signifie :

A.Centre Hospitalier Rural.

B.Conseil Hospitalier Régional.

C.Centre Hospitalier Rare.

D.Centre Hospitalier Région

4.L'ESPC signifie :

A.Etablissement Sanitaires Par Communes.

B.Etablissement Sanitaires de Premier Contact.

C.Entreprise Sanitaire de Premier Choix.

D.Etablissement Sans Paramètres Corrects.

5.La gestion du niveau primaire est assurée par

A-Le Directeur départemental de la santé

B-Le Directeur régional de la santé

C-Le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture Maladie Universelle

6.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives.

A

B

7. La participation active des populations aux activités du centre de santé est une recommandation de l'initiative de Bamako

A

B

8. La liste ci-dessous contient des dates et des événements relatifs à la politique des soins de santé primaires

- | | |
|---------------------|--|
| 1. 1977 | a. Initiative de Bamako |
| 2. 06 au 12/09/1978 | b. Conférence d'Alma Ata |
| 3. 1991 | c. Lancement officiel des SSP en Côte d'Ivoire |
| 4. 1993 | d. Mise en œuvre effective de SSP en Côte d'Ivoire |
| 5. 1987 | e. Définition des niveaux d'application des SSP à Luzaka |
| 6. 1985 | f. Réunion du comité d'experts Africains à Brazaville |

A-(1,a)

B-(2,b)

c-(4,a)

D-(3,c)

E-(1,f)

F-(4,d)

G-(3,b)

H-(6,e)

I-(1,c)

J (2,c)

K-(5,a)

L-(4,c)

M-(1,d)

N- (2,d)

O-(3,d)

9.La pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire comporte :

A.06 niveaux.

B.04 niveaux.

C.03 niveaux.

D.05 niveaux.

10..La mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993.

A

B

11.La politique des SSP définie à l'initiative de Bamako a mis un accent particulier sur la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile

A

B

12.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes promotionnelles.

A

B

13.La composante des SSP qui traite de l'approvisionnement en eau est formulée comme suite :« l'approvisionnement suffisant en eau cotaile et des mesures d'assainissement de base ».

A

B

14..Le niveau d'appui des SSP est aussi appelé niveau secondaire.

A

B

15..Le but particulier des SSP en Côte d'Ivoire est l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant

A

B

16.Le début effectif de la mise en œuvre des activités des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1991 au district sanitaire de Bouaflé

A

B

17.Le niveau d'appui des SSP est aussi appelé niveau intermédiaire.

A

B

18.En quelle année la politique des SSP a-t-elle été officiellement lancée en Côte d'Ivoire ?

A.1990

B.1993

C.1991

D.1988

19.Parmi les établissements sanitaires suivants cochez ceux qui se trouvent au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire

A-CSR

B- CHR

C- CSU

D- Direction Régionale

E-District sanitaire

20..Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité dépendante du système national de santé

A

B

21.L'hôpital général est l'une des structures prestataires du niveau périphérique de la pyramide sanitaire ivoirienne.

A

B

22.Les soins de santé primaires sont la stratégie identifiée à Alma-Ata

A- En septembre 1977

B- En octobre 1985

C- En septembre 1978

D- En mars 1987

E- En septembre 1991

23.Les trois niveaux d'applications de la stratégie des SSP ont été identifiés en :

A.1978

B.1987

C.1991

D.1985

24.Dans le système national de santé, les soins de santé primaire se situent

A. Au niveau tertiaire du système de santé

B. Au niveau intermédiaire du système de santé

C. Au niveau primaire du système de santé

D. A tous les niveaux du système de santé

25.Les trois niveaux d'applications de la stratégie des SSP ont été identifiés à :

A.Lusaka.

B.Bamako.

C.Brazzaville.

D.Ouagadougou.

26..La gestion du niveau primaire est assurée par le Directeur départemental de la santé

A

B

27.Les SSP sont des soins essentiels car ils répondent aux besoins fondamentaux des populations.

A

B

28.La gestion du niveau secondaire est assurée par le Directeur départemental de la santé

A

B

29.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central.

A

B

30.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central

A

B

31.Parmi les composantes essentielles des SSP suivantes, une seule est fausse, laquelle ?

A.La vaccination contre les maladies infectieuses.

B.La prévention et la lutte contre les endémies locales.

C.Le traitement des maladies et lésions courantes.

D.Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.

32..En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes curatives.

A

B

33.Parmi les éléments suivants, lequel constitue une composante essentielle des soins de santé primaires est :

A- L'approvisionnement suffisant en eau saine ou potable

B- La vaccination contre les maladies infectieuses

C-prévention et lutte contre les endémies locales

34.Les Soins de Santé Primaires ont été identifiés par la communauté sanitaire mondiale à :

A.Lusaka.

B.Alma Ata.

C.Genève.

D.Brazzaville.

35.L'initiative de Bamako a été lancée en :

A.1987

B.1985

C.1978

D.1977

36.Les différents niveaux d'application des SSP sont le niveau stratégique et le niveau de mise en œuvre des activités.

A

B

37.La mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'Ivoire est axée en partie sur la participation communautaire.

A

B

38.La pyramide sanitaire ivoirienne comporte des structures de gestion qui sont le district sanitaire, le District régional et le Ministère de la santé et de l'Hygiène publique.

A

B

39.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend deux versants

A

B

40.Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP :

A.Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.

B.Promotion et la lutte contre les endémies locales.

C.Approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base.

D.Prévention et lutte contre les épidémies locales

E.Vaccination contre les maladies infectieuses

41.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes promotionnelles.

A

B

42.L'objectif de santé pour tous au-delà des horizons 2000 a été fixé par :

A.le ministère ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture Maladie Universelle

B.le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

C.l'Organisation Mondiale de la Santé.

D.le bureau Afrique de l'OMS

43.La pyramide sanitaire ivoirienne comprend trois versants

A

B

44..Le niveau central des SSP s'occupe seulement de la conception des politiques de santé

A

B

45.La mise en œuvre effective des activités des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en :

A.1991

B.1993

C.1992

D.1989

46.La vaccination contre les maladies infectieuses est une composante essentielle des SSP.

A

B

47..Le lancement officiel de la mise en œuvre des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993

A

B

48.En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend huit composantes essentielles.

A

B

49.La conférence du 6 au 12 septembre 1978 au cours de laquelle la politique des SSP a été définie par l'OMS a eu lieu à ATA-ALMA en ex URSS

A

B

50.Le nombre des composantes essentielles des SSP est de :

A.12 composantes

B.06composantes.

C.08composantes.

D.10 composantes

51.Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP

A-Approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base.

B-Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.

C-Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.

52.La pyramide sanitaire ivoirienne comporte un versant de prestation de services composé entre autres des ESPC, du CHR et des instituts spécialisés.

A

B

53.Cochez parmi ces éléments, un des motifs qui ont incité l'OMS à concevoir la politique des SSP :

A. L'incapacité des systèmes de santé des pays de répondre efficacement aux besoins de santé des populations ;

B. La cherté du coût des actes de santé qui ne permet pas aux démunis de se soigner correctement

C. L'adéquation de la répartition des ressources allouées à la santé entre les pays.

54.L'analyse de la situation sanitaire mondiale par l'OMS de 1977 a identifié comme problème :

A.la capacité des systèmes de santé des pays de répondre efficacement aux besoins de santé des populations.

B.la cherté du coût des actes de santé ne permettant pas aux démunis de se soigner correctement et efficacement.

C.l'inadéquation et la répartition inéquitables des ressources humaines allouées à la santé.

D.le désintérêt de plus de plus croissant du personnel de santé dans l'exécution de leurs activités parce que non associé aux prises de décision concernant leur profil de carrière.

55.Le CHU signifie :

A.Centre Hospitalier Universel.

- B.Centre Hospitalier Unifié.
- C.Centre Hospitalier Universitaire.
- D.Centre Hospitalier des Universitaires.

56.Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP :

- A-Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de maladie auxquels la population est confrontée
- B-Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction et la planification familiale.
- C-Promotion et la lutte contre les endémies locales.
- D-Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.
- E-Vaccination contre les principales maladies endémiques.

57.Le contenu de l'initiative de Bamako préconise entre autres

- A.un accès prioritaire des femmes et des enfants aux soins de santé
- B.une autonomie de gestion au niveau local à travers les comités de gestion
- C.une interdiction des médicaments génériques dans les structures de santé
- D.une définition des niveaux d'application des soins de santé primaires

58.Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

- A-Les SSP sont des soins accessibles car ils ne coûtent pas cher
- B-Les SSP sont accessibles car ils favorisent l'automédication
- C-Les SSP sont des soins accessibles car ils sont disponibles dans les centres de santé

59.Dans quelle ville, la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie ?

- A.Rome.
- B.Alma Ata.
- C.Genève.
- D.Ata alma

60.Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles est une composante essentielle des SSP.

A

B

61.Quand est-ce que la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie ?

A- En septembre 1977

B- En septembre 1978

C- En mars 1987

62.Le district sanitaire est situé au niveau secondaire de la pyramide sanitaire ivoirienne.

A

B

63.Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé :

A-niveau primaire

B-niveau secondaire

C-niveau intermédiaire

D-niveau central

64.La pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire comprend :

A.un versant gestionnaire et un versant prestataire.

B.un versant gestionnaire et un versant intermédiaire.

C.un versant périphérique et un versant gestionnaire

D.un versant gestionnaire et un versant tertiaire.

65.Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé niveau primaire.

A

B

66. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend :

- A. 02 composantes préventives et 03 composantes curatives
- B. 03 composantes préventives et 02 composantes promotionnelles
- C. 03 composantes préventives et 03 composantes promotionnelles
- B. 02 composantes préventives et 03 composantes promotionnelles

67. L'objectif de la santé pour tous avant l'an 2000 a été défini par l'assemblée mondiale de la Santé en 1977.

- A
- B

68. Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé périphérique.

- A
- B

69. Dans quelle ville les trois niveaux d'application de la politique des SSP ont-ils été définis ?

- A. Lusaka.
- B. Bamako.
- C. Brazzaville.

70. La vaccination contre les maladies infectieuses est une composante curative des soins de santé primaire

- A
- B

71. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité indépendante du système national de santé

- A
- B

73. En 1985, les chefs d'état africains membres de l'OMS se sont retrouvés dans la capitale Zambienne (Lusaka) pour dégager trois niveaux d'application des SSP

A

B

74. Parmi les phrases suivantes identifier celle qui constitue une composante essentielle des soins de santé primaires

A- L'approvisionnement suffisant en eau saine ou potable

B- La vaccination contre les maladies infectieuses

C- Fourniture en médicaments

D- Prévention et lutte contre les endémies locales

E- Traitement des infections et lésions fréquentes

75. Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

A- les SSP sont des soins essentiels

B- les SSP sont des soins intégrés

C- Les SSP sont des soins adoptés

D- les SSP sont des soins acceptables

76. Parmi les composantes essentielles des soins de santé primaire ci-dessous, cochez celles qui sont justes

A. Vaccination contre les maladies courantes

B. Fourniture en médicaments essentiels

C. Promotion de bonnes conditions d'hygiène alimentaire.

D. Prévention et lutte contre les endémies locales

77. Les SSP ont été identifiés comme stratégie pour atteindre l'objectif santé pour tous à l'an 2000 :

A. le 12 septembre 1998.

B. le 12 septembre 1977.

C. le 12 septembre 1978.

D. le 12 septembre 1987.

78. Les SSP sont adaptés car leur mise en œuvre tient compte des caractéristiques socioculturelles et des besoins de santé des populations.

A

B

79. En 1985, les chefs d'état africains membres de l'OMS se sont retrouvés dans la capitale Zambienne pour dégager trois niveaux d'application des SSP.

A

B

80. Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP :

A- Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.

B- Promotion et lutte contre les endémies locales.

C- Approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base.

D- Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.

81. L'OMS compte à ce jour 143 pays.

A

B

82. L'objectif santé pour tous à l'an 2000 ou au-delà des horizons 2000 a été fixé en

A. 1978

B. 1976

C. 1977.

D. 1985.

83. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et deux composantes promotionnelles.

A

B

ÉVALUATION N1: MALADIE INFECTIEUSE

L1 IDE,SF/MTC 2022-2023

1. Pour qu'il ait tétanos il faut trois conditions

A

B

3. Le TRISMUS est le signe pathognomonique du tétanos

A

B

4. L'ovarite est une inflammation des ovaires et se traduit par des douleurs avec Métrorragies

A

B

5. La déshydratation et la malnutrition sont des complications générales de la rougeole

A

B

6. Dans la rougeole, les signes nerveux se caractérisent par les convulsions et la raideur de la nuque

A

B

7. Les signes du syndrome méningé sont caractérisés par le trépied méningétique ; lesquels ?

A) Les vomissements en jets

B) La constipation

C) Céphalées intense en casque

D) La diarrhée

E) Epistaxis

8.L'éruption dans la rougeole est toujours ascendante

A

B

9.Dans la maladie de Bouillaud , l'atteinte articulaire est mobile

A

B

10.Les éléments suivants font partis du but du traitement du tétanos sauf deux ; lesquels ?

A) Augmenter la glycémie

B) Réduire les contractions

C) Détruire le germe

D) Neutraliser la toxine circulante

E) Mettre le malade en confiance

F) Prévenir toute les compositions

11.Le catarrhe Occulo-respiratoire s'observe aussi dans la méningite purulente

A

B

12.Le syndrome infectieux comporte les signes suivants sauf deux ; lesquels ?

A) Constipation

B) Langue saburrale

C) Oligurie

D) Pouls rapide

E) Herpès péri-buccale

F) Insomnie

13. Dans la fièvre typhoïde , le malade présente aussi des vertiges et une épistaxis

A

B

14. Le signe de C-I-V-E-T s'observe dans les méninges purulentes

A

B

15. Les signes suivants font partis des signes du syndrome méningé sauf deux ; lesquels ?

A) La raideur de la nuque

B) Kerning positif

C) Epistaxis

D) Anorexie

E) Brudzinsky positif

16. Le vibron cholérique est l'agent pathogène du tétanos

A

B

17. Dans la rougeole, il ne faut jamais laver l'enfant avec du savon

A

B

18. Le Bacille de Nicolaier est l'agent pathogène du choléra

A

B

19.Cas clinique : Vous recevez un enfant de 12 mois le 02 Février 2020. La mère témoigne que l'enfant a reçu le BCG et la première dose de DT coq Polio à Marabadiassa où elle réside avec carte de vaccination à l'appui .

Quels vaccins feriez-vous lors de votre séance du 02 Février 2022 ?

- A) Le 02 Février 2020, méningite + rougeole + DT coq Polio + RDV
- B) Le 02 Février 2020, rougeole + DT coq Polio + fièvre jaune + RDV
- C) Le 02 Février 2020, DT coq Polio + RDV
- D) Le 02 Février 2020, Hépatite + méningite + RDV
- E) Le 02 Février 2020, rougeole + fièvre jaune - VPO Rota1 + RDV

20.Il existe toujours un pli-cutané dans la déshydratation sévère

- A
- B

21.La dissociation du pouls et de la température s'observe dans la Méningite Purulente

- A
- B

22.Le gargouillement et la sensibilité de la fosse iliaque droite s'observe dans la rougeole

- A
- B

23.Les paroxysmes font partie des signes du tétanos

- A
- B

24.La péritonite est une complication digestive de la fièvre typhoïde

- A
- B

25. La constipation et la langue saburrale font partie des signes de choléra

A

B

26. Le diagnostic de la rougeole est essentiellement biologique

A

B

27. Dans la fièvre typhoïde il n'existe pas de fièvre en plateau

A

B

28. La rougeole n'est pas une maladie contagieuse

A

B

29. Le signe de Koplick s'observe dans la rougeole

A

B

30. Dans la coqueluche, la toux est prédominance :

A) Diurne

B) Post-prandiale

C) Nocturne

D) Matinale

31. La réhydratation au plan C fait appel au S.R.O

A

B

32.L'orchite ourlienne est une localisation glandulaire de l'oreillon

A

B

34.La constipation, l'anorexie font partis des signes des fièvres typhoïdes

A

B

35.Dans le choléra, il ne faut jamais donner de l'eau à boire au malade

A

B

36.Dans le choléra, le malade présente des éruptions cutanées

A

B

37.Dans la coqueluche , les signes suivants font partie des complications mécaniques sauf deux ;lesquels ?

A) La constipation

B) Prolapsus rectal

C) Hernie

D) Epistaxis

E) Ulcération du frein de la langue

F) Insomnie

38.La contamination de la Poliomyélite est féco-Orale

A

B

39.Dans le choléra,il existe pas de déshydratation

A

B

40. Le réservoir du Poliovirus est exclusivement humain

A

B

41. Le R.A.A est aussi appelé maladie de Bouillaud

A

B

42. Dans le choléra, il existe trois stades de déshydratation

A

B

43. Dans le R.A.A, le germe en cause est le streptocoque

A

B

44. Le signe de Koplick se caractérise par l'apparition d'une éruption sur le corps de l'enfant

A

B

45. La réhydratation au plan C fait appel aux solutés

A

B

46. La réhydratation par voie veineuse est strictement interdite chez les clients présente une déshydratation au plan C

A

B

47. A l'examen du malade dans fièvre typhoïde, il existe un météorisme abdominal, une Splénomégalie et une langue saburrale

A

B

48. La phase catarrhale de la coqueluche est caractérisée par une toux remarquable par:

A) Sa durée

B) Son prolongement

C) Sa ténacité

D) Son aspect spasmodique

E) Sa prédominance nocturne

F) Son caractère émetisante

49. La rougeole sévit sous un mode épidémique en zone rurale

A

B

50. Dans la fièvre typhoïde, le malade présente une diarrhée fétide, liquide avec un aspect jus de papaye

A

B

51. Dans la fièvre typhoïde, il existe une seule mode de contamination

A

B

TRAVAUX DIRIGES SEMIOLOGIE ET PATHOLOGIE CHIRURGICALE

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM) :

NOTION D'ASEPSIE-ETUDE DE L'INFLAMMATION- NOTION D'INFECTION EN CHIRURGIE-SEPTICEMIE

1) Compléter la phrase en choisissant le bon item parmi ceux qui sont proposés en dessous ? L'asepsie est....

- A. L'absence de tout germe bactérien pathogène :
- B. L'absence de tout germe bactérien susceptible de provoquer des infections
- C. L'ensemble des méthodes qui ont pour but de détruire les microbes
- D. L'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes
- E. L'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des bactéries
- F. La présence de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection

2) La liste ci-dessous contient les différentes phases chronologiques de l'inflammation au plan local. Laquelle ?

- A- (Phase de réparation - phase cellulaire - phase vasculaire)
- B- (Phase vasculaire - phase de réparation - phase cellulaire)
- C- (Phase vasculaire - phase cellulaire - phase de réparation)
- D- (Phase pyrogène - phase douloureuse - phase œdémateuse) E- (Phase douloureuse - phase pyrogène - phase œdémateuse)

3) Qu'est-ce que la septicémie ?

- A. Une décharge de germes dans un organe
- B. Une décharge répétée de germes dans le sang
- C. Une décharge de germes dans toutes les cellules
- D. Une multiplication de germes dans un tissu

4) L'infirmier prélève le sang pour l'hémoculture en période de frissons chez le patient. Pourquoi ? (Une réponse) Par ce que :

- A. Le germe est encore dans la porte d'entrée
- B. Le germe est dans le sang
- C. Le germe est en métaphase

5) Les signes ci-dessous sont dits physiques dans la septicémie sauf trois. Lesquels ?

- A. Hyperthermie
- B. Cardiomégalie

- C. Eruptions cutanées
- D. Splénomégalie
- E. Arthralgie
- F. Oligurie

6) Quelle est la porte d'entrée d'une septicémie à perfringens ?

- A. Les infections urinaires
- B. Une plaie mal traitée
- C. La ponction veineuse
- D. Un avortement septique

**7) Quels sont les signes fonctionnels de la septicémie parmi ceux qui énumérés ci-dessous ?
(Deux réponses)**

- A. Arthralgie
- B. Hyperthermie
- C. Faciès tiré
- D. Oligurie
- E. Pouls filant
- F. Eruptions cutanées

8) Quelles sont les parties du corps humain ci-dessous pouvant être le siège d'une lymphangite ? (Quatre réponses)

- A- Le cou
- B- La joue
- C- Les membres
- D- Les paupières
- E- Les seins
- F- La verge

9) Quel est le germe responsable de l'abcès froid ?

- A. Le colibacille
- B. Le bacille d'Eberth
- C. Le bacille de Koch
- D. Le bacille de Nicolaier

QUESTION A CHOIX DOUBLE

1. Les exotoxines sont des poisons rejetés dans l'organisme à la mort du germe
2. L'asepsie désigne l'absence de tout germe microbien et tout élément susceptible de provoquer la putréfaction et l'infection

3. Le staphylocoque doré est un microbe saprophyte dans le milieu hospitalier
4. L'utilisation abusive ou incontrôlée des antibiotiques en milieu hospitalier peut entraîner des résistances
5. Le milieu, l'être vivant ou les objets qui ne comportent pas de germe sont dits septiques
6. L'auto-infection, le germe exalte son pouvoir pathogène pour aller contaminer un sujet
7. Le Pseudomonas devient virulent à la suite de l'utilisation d'un antibiotique
8. Le Proteus est un germe saprophyte
9. La virulence est le pouvoir de multiplication du germe dans l'organisme
10. L'hétéro-infection est le fait que le germe provienne d'un autre individu pour contaminer un sujet sain

PANARIS QUESTION A CHOIX DOUBLE

- 1) Les panaris siègent uniquement sur les doigts A/B
- 2) Le panaris peut siéger aussi sur les orteils A/B

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

1. Qu'est-ce qu'un panaris ?

- A. Toute infection de la main
- B. Toute infection aiguë d'un doigt de la main ou d'un orteil
- C. Toute infection généralisée du membre supérieur

2. Quelles sont les causes d'un panaris ? (Deux réponses)

- A. Toute plaie même minime négligée
- A. Inoculation dans le doigt d'un germe
- B. Contusion d'un doigt
- C. Malformation du doigt de la main incriminée

3. Quels sont les signes cliniques de cette affection parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Quatre réponses)

- A. Fièvre
- B. Nausées et vomissements
- C. Insomnie
- D. Douleur spontanée pulsatile
- E. Œdème local
- F. Anorexie

4. Quelles sont les complications du panaris non ou mal traité ? (Trois réponses)

- B. Ostéite
- C. Arthrite
- D. Panaris hyper septique
- E. Gangrène
- F. Amputation
- G. Cals vicieuses

PHLEGMON

QCD

- 1) Le phlegmon est une infection aigüe de l'une quelconque des parties constitutantes des doigts A/B
- 2) On appelle phlegmon toute infection de l'un quelconque des éléments anatomiques d'un doigt A/B
- 3) Le phlegmon est une collection purulente des parties molles, closes dans une cavité inaccessible aux antibiotiques A/B
- 4) Le phlegmon est l'infection des étuis digitaux de la main par les germes pathogènes A/B
- 5) Les phlegmons des espaces cellulaires des gaines digito-carpiennes siègent au niveau du carpe et intéressent les tissus cellulaires jusqu'au poignet A/B
- 6) Les phlegmons des gaines digitales moyennes sont localisés à la gaine synoviale des tendons fléchisseurs des trois doigts médians A/B

QCM

1) Le crochet digital semi-fléchi est un signe physique de l'une des pathologies ci-dessous, laquelle ?

- A. Le phlegmon
- B. La lymphangite
- C. L'abcès lymphatique
- D. Le panaris péri-unguéal

2) Quelles sont les étiologies du phlegmon parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Deux réponses)

- A- Le manque d'hygiène
- B- La macération
- C- Les dermatoses prurigineuses
- D- Plaie contuse négligée
- E- Piqûre hyper septique

ABCES, FURONCLES, ANTHRAX, GANGRENE, OSTEOMYELITIS

AIGÜE

QCD

- 1.** Les abcès cutanés sont une accumulation de pus constituée sous la forme d'une tuméfaction A/B
- 2.** L'abcès est dit "chaud" si présence des signes inflammatoires A/B
- 3.** Une bactérie appelée colibacille cause la plupart des abcès A/B
- 4.** Les abcès chauds se développent le plus souvent aux endroits où la transpiration est massive A/B
- 5.** Un abcès ne peut guérir que par l'évacuation du pus A/B
- 6.** L'abcès ne peut pas récidiver A/B
- 7.** L'infection qui est à l'origine de l'abcès est susceptible de s'étendre à d'autres parties du corps, voire à des organes vitaux A/B
- 8.** L'abcès dentaire est une accumulation de pus liée à une infection bactérienne, au niveau d'une dent ou d'une gencive A/B
- 9.** L'abcès siège uniquement sur le visage A/B
- 10.** L'abcès froid se forme lentement sans réaction inflammatoire A/B
- 11.** L'abcès froid pottique est le plus souvent observé dans le cadre des manifestations cliniques de la tuberculose vertébrale A/B
- 12.** La fistule de l'abcès froid n'a aucune tendance à la guérison spontanée et à la cicatrisation A/B
- 13.** L'abcès est un foyer purulent d'origine bactérienne sur la peau ou à l'intérieur du corps A/B
- 14.** Le furoncle désigne l'infection d'un follicule pileux, d'une glande sudoripare ou d'une glande sébacée A/B
- 15.** La furunculose est l'apparition de furoncles à épisode irrégulier A/B
- 16.** La prise en charge thérapeutique d'un abcès froid dure 6 mois au moins A/B
- 17.** L'anthrax est une tumeur inflammatoire cutanée due à plusieurs furoncles A/B
- 18.** La gangrène est une affection caractérisée par la mort des tissus touchant uniquement les membres A/B
- 19.** La gangrène humide se caractérise par une nécrose des tissus due à l'infection bactérienne A/B
- 20.** La gangrène humide se déclare lorsqu'une gangrène sèche ou une plaie se complique d'une surinfection A/B
- 21.** La cause principale d'une gangrène est une interruption locale de la circulation sanguine A/B
- 22.** La porte d'entrée des germes à l'origine de la gangrène est une plaie négligée ou souillée A/B
- 23.** L'ostéomyélite est une inflammation suppurative affectant seulement le tissu osseux A/B
- 24.** Le nourrisson est épargné par l'ostéomyélite A/B

QCM

25. La liste ci-dessous contient les facteurs généraux favorisant les furoncles (Deux réponses)

- A- Dermatoses prurigineuses
- B- Fièvres éruptives
- C- Manque d'hygiène corporelle
- D- Irritations répétées
- E- Agression chimique de la peau
- F- Présence d'un diabète

26. En quoi consiste la prise en charge du furoncle ? (Deux réponses)

A-

- Faire une antibiothérapie systématique
- B- Presser le furoncle
- C- Faire un antibiogramme
- D- Rechercher systématiquement un diabète
- E- Faire un pansement avec un antiseptique
- F- Orienter le patient chez le dermatologue

27. L'une des parties du corps humain est une zone de prédilection de l'anthrax. Laquelle ?

- A. Le dos
- B. L'aile du nez
- C. La fesse
- D. La nuque

28. La liste ci-dessous contient des porteurs sains. Lesquels ? (Deux réponses)

- A- Le médecin traitant
- B- Le fauteuil du Directeur de l'hôpital et le brassard du tensiomètre
- C- Le délégué médical du CHU
- D- Le chariot

29. La prise en charge de l'abcès chaud collecté comporte trois actions.

Lesquelles ?

- A- Incision au point le plus déclive
- B- Antibiothérapie systématique
- C- Prélèvement de sang pour antibiogramme
- D- Pansement compressif après incision
- E- Sérovaccination antitétanique

30. L'abcès chaud se caractérise au stade de diffusion par trois signes parmi ceux-ci. Lesquels ?

- A- Anorexie
- B- Douleur
- C- Frissons
- D- Hyperleucocytose
- E- Hypothermie
- F- Rougeur

31. L'une des affections suivantes a pour point de départ une annexe de la peau. Laquelle ?

- A- Lymphangite
- B- Abscès froid
- C- Furoncle
- D- Panaris péri unguéal

32. Les phases ci-dessous sont celles du phénomène de l'inflammation sauf deux. Lesquelles ?

- A. La phase vasculaire
- B. La phase cellulaire
- C. La phase fibrillaire
- D. La phase de réparation
- E. La phase protonique

33. Les infections ci-dessous sont directement liées à une porte d'entrée (Trois réponses)

- A. Le panaris
- B. L'abcès chaud
- C. La lymphangite
- D. L'abcès froid
- E. Le phlegmon
- F. La gangrène gazeuse

34. La liste ci-dessous contient des facteurs locaux favorisant les furoncles (deux réponses)

- A. Le surmenage
- B. Le manque d'hygiène
- C. Les fièvres éruptives
- D. Les dermatoses prurigineuses
- E. Le diabète
- F. La baisse du taux de mélanine des mélanocytes

35. Quelles sont les assertions justes concernant la gangrène gazeuse (Trois réponses)

- A. C'est une nécrose locale des tissus, avec tendance à l'extension de proche en proche
- B. Les germes en cause se développent souvent sur des plaies souillées de terre

- C. Les agents pathogènes en cause sont uniquement des germes anaérobies
- D. Les actes de soins sont loin d'être incriminés pour la porte d'entrée
- E. Les troubles circulatoires font partie des facteurs favorisants
- F. L'administration d'une antibiothérapie massive fait partie de l'arsenal de prévention

36. Parmi les assertions ci-dessous relatives à la gangrène gazeuse ; quelles sont celles qui sont justes ? (Trois réponses)

- A. Une nécrose des tissus avec extension spontanée du membre produisant du gaz
- B. Les germes en cause produisent des toxines cytolytiques à l'origine de la nécrose cellulaire et des phénomènes de toxémies
- C. Une mortification locale aboutissant à la nécrose des tissus, avec tendance à l'extension de proche en proche et production de gaz
- D. Une lymphangite locale qui aboutit à la nécrose des tissus, avec tendance à l'extension et une production de gaz
- E. Un phlegmon nécrosant du tissu musculaire à évolution rapide et extensive avec production de gaz au niveau des tissus
- F. Un phlegmon du tissu péri amygdalien à évolution rapide et extensive avec production de tox et un gaz nauséabond

37. La gangrène sèche est caractérisée par : (Trois réponses)

- A- Nécrose tissulaire sans infection bactérienne
- B- Pas de circulation sanguine au niveau de la partie atteinte
- C- Ne se propage pas à d'autres tissus
- D- Nécrose tissulaire due à l'infection par des bactéries
- E- Tissus gonflés et suintants
- F- Se propageant à d'autres tissus

38. La gangrène humide est caractérisée par : (Trois réponses)

- A. Nécrose tissulaire sans infection bactérienne
- B. Pas de circulation sanguine au niveau de la partie atteinte
- C. Ne se propage pas à d'autres tissus
- D. Nécrose tissulaire due à l'infection par des bactéries
- E. Tissus gonflés et suintants
- F. Se propageant à d'autres tissus

39. Identifiez trois (03) facteurs favorisant l'apparition de la gangrène gazeuse parmi ceux qui sont énumérés en dessous.

- A- Contusion des masses musculaires
- B- Troubles circulatoires
- C- Existence de tare organique
- D- Obésité

- E- Sédentarité
- F- Septicémie

40. Identifiez trois (03) facteurs favorisant l'apparition l'ostéomyélite aigüe parmi ceux qui sont énumérés en dessous

- A. Fatigue
- B. Surmenage
- C. Alimentation pauvre en oligoéléments
- D. Obésité
- E. Sédentarité
- F. Septicémie

41. A l'exception de deux (2) toutes les interventions ci-dessous sont celles de l'infirmier dans la prise en charge de la gangrène

- A. Décaper les tissus nécrosés jusqu'aux parties saines à chaque pansement
- B. Etablir le rythme des pansements tous les deux jours dès la première rencontre
- C. Donner les rendez-vous de pansement aux malades externes
- D. Mobiliser régulièrement le membre atteint
- E. Etablir un régime alimentaire aux patients diabétiques ou hypertendus
- F. Prescrire le traitement médicamenteux

42. L'ostéomyélite aigüe est une inflammation suppurative de l'os et du muscle où ; (deux réponses)

- A. Le staphylocoque doré est retrouvé dans 80% à 96% des cas
- B. Les enfants et les adolescents sont plus atteints que les adultes
- C. Surtout les os courts sont généralement concernés par cette infection
- D. Epargnent les nouveau-nés et les nourrissons avant 2 mois

43. L'ostéomyélite aigue se localise généralement au niveau de l'une des parties des os longs. Laquelle ?

- A. La métaphyse
- B. La diaphyse
- C. Le condyle
- D. L'épiphyse

44. La liste ci-dessous contient deux étiologies de l'ostéomyélite aigue ; lesquelles ?

- A. Contusion des masses musculaires
- B. Usage abusif des antibiotiques
- C. Gangrène gazeuse
- D. Furoncle
- E. Anthrax
- F. Angine

45. Dans l'ostéomyélite aiguë, les lésions initiales osseuses siègent aux métaphyses des os longs car, ces zones sont
- A. Très vascularisées
 - B. Moins vascularisées
 - C. Moins oxygénées
 - D. Très oxygénées
46. Trois des signes ci-dessous sont absents dans l'ostéomyélite aiguë ; lesquels ?
- A. Adénopathie inguinale
 - B. Douleur à la palpation
 - C. Etat général altéré
 - D. Asthénie
 - E. Lymphangite
 - F. Arthrite
47. Dans la prise en charge de l'ostéomyélite du nourrisson, la traction du membre inférieur permet d'éviter une complication ; laquelle ?
- A. Une luxation de la hanche
 - B. Une fracture secondaire
 - C. Une pseudarthrose
 - D. Une stase veineuse

FRACTURE

- 1. La fracture se définit comme une solution de continuité de l'os : **Vrai**
- 2. Il existe deux principaux mécanismes de survenue des fractures : **Vrai**
- 3. La fracture se définit uniquement par son siège et son déplacement : **Faux, plutôt**
- 4. La fracture complète se définit comme une atteinte uni-corticale de l'os : **Faux, plutôt BI corticale**
- 5. Il existe 3 types de trait simple : **Vrai**
- 6. Une fracture spiroïde est considérée comme une fracture simple : **Vrai**
- 7. Une fracture bifocale est une fracture simple : **Faux, plutôt complexe**
- 8. Le chevauchement est un déplacement selon la longueur : **Vrai**
- 9. Le craquement est un signe fonctionnel dans la fracture : **Vrai**
- 10. Les déplacements selon la longueur comportent les chevauchements et les rotations : **Faux, pas de rotation**

11. Les signes fonctionnels majeurs d'une fracture sont la douleur, le craquement, et l'impotence fonctionnel : **Vrai**
12. On retrouve fréquemment un raccourcissement et une rotation au cours d'une fracture : **Vrai**
13. La radiographie standard n'est pas utile au diagnostic d'une fracture : **Faux, plutôt obligatoire**
14. Lors du mécanisme direct lors d'une fracture, l'os est rompu à distance de la zone d'impact : **Faux**
15. La torsion osseuse est un mécanisme direct de fracture : **Faux, plutôt indirect**
16. La fracture se définit exclusivement selon le type de trait : **Faux, pas seulement**
17. Le trait de fracture incomplet atteint les deux corticales : **Faux**
18. Le nursing est utilisé pour éviter les complications de décubitus : **Vrai**
19. L'ostéite est une complication tardive et redoutable de la fracture :
20. Une fracture se définit anatomopathologiquement selon le siège seul : **Faux**
21. L'accident de la voie publique peut être une étiologie des fractures : **Vrai**
22. Il existe 4 types de traits complexe : **Faux, plutôt 3**
23. La baïonnette est un déplacement selon la longueur : **Faux**
24. Un varus est une angulation a sommet interne : **Faux, plutôt externe**
25. Lors d'une fracture, le membre fracturé est raccourci : **Vrai**
26. La radiographie est obligatoire en cas de fracture : **Vrai**
27. Une complication immédiate est une complication survenant au moment du traumatisme :
28. On appelle fracture, la rupture de la continuité d'un os : **Vrai**
29. La fracture pathologique survient à la suite d'un traumatisme important : **Faux** ☒
30. La fracture à étage est une fracture où le trait est triple et délimite un 3^{ème} fragment parallèle entre eux : **Faux**
31. La fracture comminutive est une fracture où l'os s'est fracturé en un seul endroit : **Faux, plutôt en plusieurs endroits**
32. La fracture incomplète avec flexion se rencontre chez l'enfant : **Vrai**
33. La fracture incomplète est encore appelée fracture « en bois vert » : **Vrai**
34. La radiographie est le seul examen permettant de confirmer la fracture : **Vrai**
35. La peau est intacte dans une fracture fermée : **Vrai**
36. La fracture ouverte est une fracture dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie même minime des parties molles : **Vrai**
37. La réduction consiste à remettre les fragments osseux dans leur rapport anatomique : **Vrai**
38. L'ostéosynthèse consiste à un assemblage des fragments osseux d'une fracture à l'aide de matériel métallique : **Vrai**
39. La réduction se fait sous contrôle radiologique : **Vrai**
40. La contention se fait à l'aide d'un appareil plâtré : **Vrai**
41. La contention consiste à maintenir les fragments osseux dans leurs rapports normaux jusqu'à consolidation : **Vrai**
42. L'alimentation est très importante pour la consolidation d'un os fracturé : **Vrai**

43. Lors d'une fracture, on peut observer un déplacement de fragment osseux : **Vrai**
44. La fracture en bois vert se manifeste cliniquement par un raccourcissement du membre fracturé : **Faux**
45. Dans la fracture de la diaphyse fémorale, l'impotence fonctionnelle est absolue : **Vrai**
46. Dans la fracture, le déplacement des fragments osseux en translation est décalage en rotation : **Faux, plutôt en diamètre**

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

47. Quels sont les signes qui ne sont pas fonctionnels de la fracture parmi ceux-ci ? (Trois réponses)
- A- Douleur vive
 - B- Impotence fonctionnelle
 - C- **Déformation du membre**
 - D- **Mobilité anormale du membre atteint**
 - E- **Crépitation osseuse**
48. Quels sont les deux types de fractures qu'on peut avoir ? A- La fracture continue
- B- La fracture prolongée
 - C- **La fracture fermée**
 - D- **La fracture ouverte**
49. Quelles sont les méthodes de traitement de la fracture ? (Deux réponses)
- A- Le traitement par irradiation
 - B- Le traitement par chimiothérapie
 - C- Le traitement par Imagerie par résonnance magnétique
 - D- **Le traitement orthopédique**
 - E- **Le traitement sanglant ou ostéosynthèse**
50. Quels sont les buts visés par le traitement de la fracture ? (Deux réponses)
- A- **Le rétablissement anatomique de l'os**
 - B- **Le rétablissement de la fonction du membre atteint**
 - C- La résection
 - D- L'amputation
51. Quelles sont les complications immédiates des fractures parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Trois réponses)
- A- **Lésions cutanées**
 - B- **Lésions vasculaires**
 - C- **Lésions nerveuses**
 - D- Déplacements secondaires locaux
 - E- Cals vicieuses
52. Quelles sont les composantes du traitement orthopédique ? (Trois réponses)
- A- **La réduction**
 - B- **La contention**
 - C- La contemplation

- D- L'amputation
- E- L'éducation
- F- **La rééducation**

53. Le délai de consolidation d'une fracture de la clavicule est estimé à :

- A- **4 semaines**
- B- 6 semaines
- C- 8 semaines

54. Le délai de consolidation d'une fracture de l'humérus est estimé à :

- A- 4 à 6 semaines
- B- **6 à 8 semaines**
- C- 8 à 12 semaines

55. Le délai de consolidation d'une fracture des 2 os de l'avant-bras est estimé à :

- A- 4 à 6 semaines
- B- 6 à 8 semaines
- C- **8 à 12 semaines**
- D- **3 à 4 mois**

56. Le délai de consolidation d'une fracture du fémur est estimé à :

- A- **3 à 4 mois**
- B- 4 à 6 mois
- C- 6 à 12 mois

57. Le délai de consolidation d'une fracture des 2 os de la jambe est estimé à :

- A- 6 à 8 semaines
- B- 8 à 12 semaines
- C- **3 à 4 mois**
- D- 4 à 6 mois

58. La liste ci-dessous contient les mécanismes de survenu d'une fracture, lesquels ?

A. **Choc indirect** B. Choc tangentiel

- C. Choc transversal
- D. Choc par carence
- E. Choc pathologique
- F. **Choc direct**

59. Le chevauchement des fragments osseux dans une fracture est un déplacement

- A. Angulaire
- B. **Longitudinal**
- C. Rotatoire
- D. Transversal

60. A quel squelette appartient le fémur ?

- A. Squelette axial
- B. **Squelette appendiculaire**
- C. Squelette zonal

ENTORSE ET LUXATION

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

Répond par vrai ou faux

- 1) Au cours de l'entorse on retrouve une douleur et une sensation de déchirure
- 2) On réalise une échographie pour le diagnostic d'une entorse
- 3) L'évolution d'une entorse est toujours favorable
- 4) Il existe 4 types d'entorses selon la gravité
- 5) L'impotence fonctionnelle absolue est un signe fonctionnel d'une entorse
- 6) La rupture des ligaments est une entorse grave
- 7) L'entorse est l'ensemble des lésions capsulo-ligamentaires causées par un traumatisme de l'articulation
- 8) Le mouvement anormal mais imposé à l'articulation est un mécanisme survenu d'une entorse
- 9) Une micro rupture est une lésion jonctionnelle dans une entorse
- 10) La recherche de laxité ligamentaire est importante en cas d'entorse
- 11) Les troubles trophiques sont des complications pouvant survenir en cas d'entorse
- 12) La cal vicieuse est une complication tardive en cas d'entorse
- 13) La rupture partielle des ligaments est une entorse grave
- 14) Dans l'entorse, la douleur est proportionnelle à la gravité de la lésion
- 15) La douleur persistante est une complication secondaire des entorses
- 16) Les ligaments ne participent pas à la stabilité articulaire
- 17) Une rupture complète du ligament est une lésion interstitielle
- 18) L'avulsion d'un ligament est une lésion fonctionnelle lors d'une entorse
- 19) L'étirement des ligaments est une entorse grave
- 20) Une luxation se définit comme une perte des rapports normaux entre les surfaces articulaires
- 21) Une convulsion peut être à l'origine d'une luxation
- 22) Devant une luxation on observe une attitude vicieuse du membre
- 23) La luxation peut quelquefois être irréductible
- 24) Les arthroses font partie des complications des luxations
- 25) La luxation est une perte permanente des rapports normaux des surfaces articulaires
- 26) L'impotence fonctionnelle relative est un signe fonctionnel dans une luxation
- 27) L'incoercibilité est semblable à l'irréductibilité d'une luxation
- 28) L'arthrose post-traumatique est une complication tardive lors des luxations
- 29) La luxation est une urgence orthopédique dont la réduction doit se faire dans les 12 heures suivant le traumatisme

- 30) Le bilan loco régional est l'examen du malade en totalité
- 31) La perte incomplète de contact des surfaces articulaires est une subluxation
- 32) L'impotence fonctionnelle relative est un signe physique lors d'une luxation
- 33) La radiographie est obligatoire dans une luxation
- 34) L'irréductibilité est la possibilité de réduire facilement une luxation
- 35. L'entorse est une lésion traumatique d'une articulation produite par l'exagération des mouvements physiologiques sans déplacement des surfaces articulaires
- 36. L'entorse se rencontre surtout au niveau des articulations mobiles A/B
- 37. L'entorse peut récidiver A/B
- 38. La luxation complète est appelée aussi une subluxation. A/B
- 39. Les lésions vasculo-nerveuses sont des complications primaires des fractures du fémur. A/B
- 40. La luxation de l'épaule est une perte de contact plus ou moins importante de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre. A/B

SÉMIOLOGIE CHIRURGICALE

1. L' infectiologie est la branche de la médecine qui étudie les maladies infectieuse

Vrai

Faux

2. La douleur révèle de l' hypertermie locale liés à la vasodilatation

Faux

Vrai

3. Le staphylocoque doré est un microbe redoutable dans les infections en milieu hospitalier

Vrai

Faux

4. La stérilisation des instruments opératoire en métal par la chaleur sèche est fournie pour un Appareil appelé autoclave.

Vrai

Faux

5. Recouvrir la plaie est le tout premier geste dans la chronologie de soins devant toute plaie

Vrai

Faux

6. Le genu varum est la déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambe enx)

Vrai

Faux

7. La syndactylie est une augmentation du nombre des doigts par segmentation de l'un d'entre eux

Vrai

Faux

8. Les 3 signes de l'inflammation sont :

La tuméfaction

La douleur

L'absence de chaleur

L'hématome

La rougeur

9. Les microbes cités ci-dessous sont le plus souvent en cause dans les infections en Milieu hospitalier, sauf un ; lequel

Le *protéus mirabilis*

Le streptocoque

Le staphylocoque doré

Le *candida albicans*

10. Deux des facteurs locaux ci-dessous cités favorisent la survenue des furoncles, lesquels ?

Les dermatoses prurigineuses

Les fièvres éruptives

Le diabète le plus souvent

L'altération de l'état général

Les frottements ou irritations répétées

11. Trois activités entrent dans la prise en charge infirmière du panaris, parmi celles citées ci-dessous, lesquelles ;

Information éducation-communication

Préparation psychologique du patient

Pansement avec bain quotidien

Rééducation après cicatrisation

Prélèvements biologiques en vue d'antibiogramme

12. Les germes souvent mis en cause dans l'abcès chaud sont : (choisir deux bonnes réponses)

Pneumocoque

Staphylocoque blanc ou doré

Colibacille

Streptocoque

Gonocoque

13. La brûlure est grave lorsque la surface corporelle brûlée est : (choisir la bonne réponse)

≥ à 10% chez l'enfant et à 15% chez l'adulte

> à 10% chez l'enfant et à 15% chez l'adulte

< à 10% chez l'enfant et à 15 % chez l'adulte

14. La clinique du pied bot varus équin chez le nouveau-né associe : (choisir deux bonnes Réponses).

Un pied tendant de plus en plus à s'enrouler sur son bord interne

Un pied avec son bord externe s'allongeant

Une supination

Une attitude vicieuse du pied au repos

Une adduction

15. Lorsque la hanche est luxée chez le nourrisson avant la marche il y'a : (choisir les deux)

Bonnes réponses)

Erreur ! Nom du fichier non spécifié.

Une asymétrie des plis fessiers

Une déformation de la colonne vertébrale en scoliose

Bascule du bassin du côté de la luxation

Une situation anormale de la tête du fémur

16. Le traitement des entorses graves associent deux méthodes ; lesquelles ?

La cryothérapie

L'immobilisation plâtrée suivie d'une rééducation.

La suture du ligament

La physiothérapie

17 : L'une des complications secondaires des fractures est :

La lésion nerveuse

Le retard de consolidation

L'atrophie musculaire

18. Les complications générales des furoncles sont : (choisir deux bonnes réponses) :

La lymphangite

La septicémie aiguë

La bactériémie passagère

L'adénite aiguë ou adéno-phlegmon

L'abcès chaud circonscrit

19. La syndactylie est une augmentation du nombre des doigts par segmentation de l'un d'entre eux

Vrai

Faux

20. La douleur siégeant à la jambe ou à l'avant-bras est un signe fonctionnel et physique de la Lymphangite

Vrai

Faux

21. Le streptocoque hémolytique peut avoir pour porte d'entrée gynécologique.

Vrai

Faux

22. Associé chaque localisation au pourcentage de la surface corporelle brûlée selon la TABLE DE LUND et BROWDER (tableau si apres)

1. Tête + cou enfant de 0-4 ans
2. Moitié du tronc antérieur enfant de 1 -4ans
3. Deux mains enfant de 5-9 ans
 - A- 5%
 - B- 21%
 - C- 6,5%

1.A

2.C

3.C

3.A

2.B

1.B

23. Parmi les variations cliniques, indiquez celle qui appartiennent au phlegmon :

Phlegmon de la plante des pieds

Phlegmon des gaines synoviales

Phlegmon du gros orteils

Phlegmon dues espaces cellulux des gaines digito-carpienne

24. Les plaies simples se limitent à l'effraction des tissus de revêtement et comprennent :

Les infections cutanées

L'ulcère de burili

Les délabrements cutanés superficiels

Les larges plaies profondes

25. Il est noté que 96% des cas , l'osteomyélite aiguë est causée par l'Escherichia coli

Vrai

Faux

26. Le cal vicieux est une application secondaire des fractures

Vrai

Faux

27. Les maladies infectieuses revêt l'un des 4 aspects suivants dans la période d'état, lequel

Elaborations des toxines

Éruption cutanée

Multiplication des germes

Septico-pyémie

28. Indiquez parmi les complications de l'anthraxe, celles qui sont considérées comme complications locales

Lymphangite réticulaire

Métastase suppurée

Adénite

Anthrax diffus

29. Le traitement du phlegmon est surtout basé sur la chirurgie

Vrai

Faux

DEVOIR N1 THÉORIES ET CONCEPTS IDE,SF/MTC L1 2023

Instructions : donner la ou les réponses exactes, sachant qu'une bonne réponse donne +1 point et une mauvaise réponse donne 0.

1. Le modèle conceptuel en soins infirmier désigne une façon simplifiée de voir la réalité professionnelle : **Vrai**

2. On évalue la qualité des soins à travers la relation d'aide avec le malade : **Vrai**

3. Les expériences antérieures sont des facteurs d'influence d'une définition personnelle de la santé : **Vrai**

4. L'application du modèle conceptuel dans la pratique infirmière quotidienne nécessite l'utilisation d'une méthode de travail appelée démarche de soins : **Vrai**

5. Le dossier de soins infirmiers est un document collectif pour tous les malades : **Faux**

6. Les Besoins Fondamentaux de ABRAHAM MASLOW sont hiérarchisés : **Vrai**

7. La sage-femme a aussi une mission spirituelle auprès de la parturiente : **Vrai**

9. L'infirmier et la sage-femme travaillent sur les consignes des médecins à l'hôpital : **Faux, ils ont des rôles propres à eux**

10. La fonction de diagnostic est une fonction principale de l'infirmier : **Vrai**

11. Les soins infirmiers sont un ensemble d'activités destinées à répondre aux besoins de santé des personnes malades uniquement : **Faux, plutôt toutes personnes**

13. Le septième besoin de Virginia Henderson est le besoin de s'habiller et se déshabiller : **Faux, plutôt le sixième**

14. Selon Virginia Henderson les soins infirmiers consistent à mettre la personne dans des meilleures conditions afin que la nature agisse sur elle : **Vrai**

15. Le dossier de soins infirmiers augmente la charge de travail de l'IDE/SF : **Faux, plutôt en fait partir**

16. L'infirmier joue un rôle de suppléance de connaissance, de force ou de volonté auprès du client : **Vrai**

17. Le dossier de soins infirmiers est un dossier nominatif, individuel et remis à jour pour chaque patient : **Vrai**

18. La relation d'aide consiste à se soumettre totalement à un patient lors de son hospitalisation : **Faux, plutôt à la disposition**

19. Maintenir la température du corps dans les limites de la normale est le 7ème besoin fondamentaux de HENDERSON VIRGINIA : **Faux, plutôt Virginia Henderson**

20. Appliquer les prescriptions médicales font partie du rôle propre de l'infirmier : **Faux, plutôt rôle délégué**

21. Dans le centre de santé, l'IDE/SF délèguent leur rôle aux auxiliaires : **Faux**

22. Les soins infirmiers préventifs consistent à atténuer les symptômes pénibles d'une maladie : **Faux, c'est plutôt les soins palliatifs**

23. Selon l'OMS (1978) la santé est un état d'une personne sans maladie et sans infirmité : **Faux**

24.L'infirmier a trois fonctions principales : **Faux, plutôt six fonctions principales**

25.La fonction de diagnostic est une fonction principale de l'infirmier : **Vrai**

26.Une profession se distingue d'un métier en ce qu'elle repose sur les connaissances théoriques qui lui sont propres et sur une base scientifique : **Vrai**

27.Les besoins sont universels pour tous les êtres humains mais spécifiques pour chacun : **Vrai**

28.L'écoute active consiste aussi à être neutre et bienveillant : **Vrai**

29.Selon Virginia Henderson, les sources de difficultés liées à la satisfaction des quatorze besoins fondamentaux sont :

- A) le manque de force physique
- B) Le manque de connaissance
- C) Le manque de volonté
- D) Toutes les réponses (A, B et C) sont justes**

30.Un besoin fondamental n'est pas une nécessité vitale : **Faux**

31.Le mot profession signifie une vocation apprise : **Vrai**

32.Le « besoin » exprime à la fois ce que nous sommes et ce qu'il nous faut être : **Faux**

33.Procéder à la toilette du malade est un soin de nature relationnelle : **Vrai**

34.Le besoin de se récréer est un des besoins de Virginia Henderson : **Vrai**

35.Le dossier de soins infirmiers est uniformisé pour tous les établissements sanitaires : **Faux, pas forcément**

36.Apprendre est un besoin fondamental d'Abraham Maslow : **Faux, plutôt de Virginia Henderson (14*)**

37.La maladie a été définie tantôt comme étant une indisposition tantôt comme une déviation d'un état de santé. : **Vrai**

38. Le besoin de respirer est le 1^{er} besoin fondamental de tout individu malade ou en bonne santé selon Virginia Anderson : **Vrai**

39.Le besoin de procréer est un besoin fondamental de Virginia Henderson : **Faux**

40.Les composantes essentielles d'un modèle conceptuel sont : les postulats, les valeurs et les éléments : **Vrai**

41.L'autonomie du malade est perturbée pendant l'hospitalisation : **Vrai**

42.Le modèle conceptuel est un modèle sur lequel un agent de santé se base pour prodiguer des soins de qualité : **Vrai**

43.Le dossier de soins infirmiers contribue au processus d'apprentissage : **Vrai**

44.L'infirmier est une personne qui travaille dans une structure sanitaire : **Vrai**

ÉVALUATION D'ÉTUDE DU MILIEU

1.Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui favorisent la santé

A- L'ignorance

B- Les soucis

C- L'absence de troubles psychiques

D- L'âge

E- L'absence de troubles métaboliques

F- L'environnement affectif satisfaisant durant l'enfance.

2. Dans la monographie, la cartographie permet de

A- Dresser des tableaux avec des données statistiques

B- Établir le plan de la structure de santé sur un support

C- Limiter le bassin de dessert du centre de santé

D- Représenter rien que les infrastructures sanitaires de l'aire sanitaire

3. En monographie, indiquez dans la liste ci-dessous l'élément d'information relative à la communauté

A- Les jours de repos ou jours tabous

B- Les principales fêtes culturelles de la localité et les interdits y afférents

C- Les principaux aliments de base de la population

D- Le nombre de guérisseurs traditionnels et leur domaine de compétence

4. Indiquez parmi les éléments ci-dessous, le facteur psychologique favorisant la santé

A- Absence de promiscuité

B- Environnement affectif durant l'enfance

C- Absence de troubles métaboliques

D- Existence d'un habitat salubre

5. La connaissance des hommes et de l'environnement social dans lequel ils vivent n'a aucun impact sur leur prise en charge sanitaire.

Vrai

Faux

6. L'étude du milieu permet au professionnel de santé de connaître les composantes de la communauté et son organisation sociale.

Vrai

Faux

7.L'étude du milieu permet au professionnel de santé de disposer des données fiables et récentes sur la population de son aire sanitaire.

Vrai

Faux

8.Les attitudes à développer par le personnel de santé pour mener une bonne étude du milieu sont:

A- L'observation

B- La méfiance

C- Le dialogue

D- L'ethnocentrisme

9.Les facteurs psychologiques favorisant la santé

A- Un sevrage bien conduit

B- Une absence de troubles physiques

C- Une affection parentérale durant l'enfance

D- L'insatisfaction du besoin d'être aimé,

10.L'existence d'un habitat salubre est un facteur socio-économique favorisant la santé.

Vrai

Faux

11.La monographie permet au professionnel de santé d'avoir toutes les informations importantes et nécessaires sur les hommes et leurs environnement de vie.

Vrai

Faux

12. Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont psychologiques.

- A- L'absence de troubles psychiques
- B- L'absence de troubles métaboliques
- C- L'existence d'eau courante
- D- L'existence d'un habitat salubre
- E- L'environnement affectif satisfaisant
- F- L'absence de promiscuité

13. Les bruits et les virus sont des facteurs déterminant la maladie

Vrai

Faux

14. Pendant l'étude des différents facteurs le personnel de santé devrait être capable de

- A- Pousser les habitants à demeurer eux-mêmes, sans changement à leur existence
- B- Pousser les habitants à découvrir les possibilités d'amélioration de leur vie
- C- Exploiter les informations sur la communauté et d'en tirer seul les profits
- D- Réprimander les habitants sur les écarts de comportement

15. Indiquez parmi les différents facteurs pouvant agir sur la santé proposés, la bonne formulation

- A- Facteur définissant la maladie
- B- Facteur déterminant la santé
- C- Facteurs déterminant la maladie
- D- Facteurs définissant la santé

16. La réussite des programmes de sensibilisation et d'éducation dépend de la monographie.

Vrai

Faux

17. Facteurs psychologiques favorisant la santé

- A- L'absence de promiscuité
- B- L'existence de moyens de communication acceptables
- C- Une éducation adéquate de l'enfant
- D- L'impression du besoin de s'occuper, de se rendre utile.

18. L'existence de promiscuité est un facteur socio-économique favorisant la maladie

Vrai

Faux

19. Pendant l'étude des différents facteurs pouvant agir sur la santé, l'attitude à développer par le personnel de santé est

- A- L'information et le dialogue
- B- L'observation et la sanction
- C- L'approbation et la menace
- D- L'observation et le dialogue

20. L'ignorance et les soucis sont des facteurs socio-culturel favorisant la maladie

Vrai

Faux

21. La monographie permet au professionnel de santé de vivre en parfaite harmonie et en symbiose avec la population de son bassin de desserte.

Vrai

Faux

22. Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui sont des déterminants de la maladie

A- L'eau polluée

B- Les microbes

C- Les parasites

D- Les ordures

E- Les virus

F- Les bruits

23. Les virus et les parasites sont des facteurs déterminant la santé.

Vrai

Faux

24. L'absence d'un habitat salubre est un facteur socio-économique favorisant la santé.

Vrai

Faux

25. L'existence d'un habitat insalubre est un facteur socio-économique favorisant la santé.

Vrai

Faux

26. La monographie est un outil d'efficacité et de déficience des activités de santé.

Vrai

Faux

27. L'âge et le sexe sont des facteurs biologiques favorisant la maladie

Vrai

Faux

28. L'étude du milieu ou la monographie permet de

- A- Recenser tous les habitants d'une localité desservie
- B- Découvrir les hommes dans leur milieu de vie
- C- Comprendre les seuls facteurs nuisibles à l'existence des communautés
- D- Répertorier uniquement ce qui est favorable au mode de vie de la communauté.

29.L'exercice de la profession infirmière et sage femme dans un milieu social va au delà la maîtrise des compétences pratiques.

Vrai

Faux

30.La présence de troubles psychiques est un facteur psychologique favorisant la santé.

Vrai

Faux

31.Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont physiologiques

- A- L'absence de troubles psychiques
- B- L'absence de troubles métaboliques
- C- Une bonne aération
- D- Un environnement affectif satisfaisant

32.Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont socio-économique et culturels

- A- L'absence de troubles psychiques
- B- L'absence de troubles métaboliques
- C- L'existence d'eau courante
- D- L'existence d'un habitat salubre
- E- L'absence de promiscuité
- F- L'environnement affectif satisfaisant

33.L'étude du milieu est la connaissance des problèmes de santé et des moyens de résolution de ces problèmes qui existent dans ce milieu.

Vrai

Faux

34.L'étude du milieu est la connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent.

Vrai

Faux

35.La présence de troubles métaboliques est un facteur biologique favorisant la santé

Vrai

Faux

36.En étude du milieu, l'attitude à développer par le personnel de santé est

A- Regarder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu

B- Orienter l'entretien vers le maintien de comportement de la population

C- Consigner les informations données par les populations en vue d'établir des rapports

D- Apprendre pour conserver le mode de vie et de pensée de la communauté

37.Dans la liste proposée, indiquez l'intrus parmi les éléments d'information relative à l'identification du centre en monographie

A- Le nom et la fonction de l'agent de santé qui y exerce

B- La dénomination de la structure sanitaire

C- Le code du centre de santé

D- La date d'ouverture du centre de santé

38.Parmi les facteurs physiologiques favorisant la maladie ci-dessous indiquez l'intrus

A- Âge

B- Sexe

C- Soucis

D- Aspect physique

39. Le nombre d'agents de santé dans une structure de santé fait partie des informations sanitaires et épidémiologiques dans l'élaboration d'une étude du milieu.

Vrai

Faux

40. L'aspect physique est un facteur biologique favorisant la maladie.

Vrai

Faux

41. L'absence d'eau courante est un facteur socio-économique favorisant la santé

Vrai

Faux

42. Le chômage et l'ignorance sont des facteurs économiques favorisant la maladie.

Vrai

Faux

43. L'étude du milieu permet au professionnel de santé de ne connaître que les différents atouts de santé du milieu de travail.

Vrai

Faux

44. La monographie ou étude du milieu peut être définie comme

A- L'étude des populations d'une région donnée

B- Une étude sur les historiens et les scientifiques d'un milieu culturel donné

C- La connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent

D- L'ensemble des infrastructures sanitaires d'une région donnée

45.L'existence d'eau courante fait partir de ce facteur favorisant la santé

A- Facteur de l'environnement physique

B- Facteur psychologique

C- Facteur physiologique

D- Facteur de l'environnement social

46.L'étude du milieu ou monographie est

A- La finalité de toute action sanitaire et sociale

B- L'action préalable de toute situation de soins

C- Limitée à l'étude des communautés

D- Une activité dévolue aux seuls agents de santé.

47.L'existence des ordures et les parasites sont des facteurs déterminant la maladie.

Vrai

Faux

48.En monographie, les informations relatives à la communauté permettent à l'agent de santé de connaître l'itinéraire thérapeutique de la communauté.

Vrai

Faux

49.L'absence de promiscuité et de pollution est un facteur de l'environnement physique favorisant la santé.

Vrai

Faux

50. Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui favorisent la maladie.

- A- L'ignorance
- B- Les soucis
- C- L'absence de troubles psychiques
- D- L'absence de troubles métaboliques
- E- Les parasites
- F- Le sexe

ÉPREUVE DE PÉDIATRIE L1 2022-2023

1. Enfant Dam Cissé, nourrisson de 4 mois est nourrit au lait maternel et reçoit du PRIMALAN sirop depuis la naissance pour un problème de santé. La modalité d'alimentation d'enfant Dam cissé s'appelle :

- A) Allaitement mixte
- B) allaitement exclusif
- C) allaitement prépondérant
- D) allaitement diversifié

2. L'hypertension artérielle non compliquée chez la mère à une cause de prématurité :

- A) Induite
- B) Spontanée
- C) provoquée
- D) médicale

3.La dénutrition est une complication des vomissements

A

B

4.Le plan C de traitement de la diarrhée est indiquée pour traiter les signes évidents de déshydratation

A

B

5.Les antibiotiques font partie des causes de vomissements aigus du nourrisson

A

B

6.Le nouveau-né moyen prématuré a un âge gestationnel compris entre

A) 33 et 34 semaines d'aménorrhée

B) 33 et 35 semaines d'aménorrhée

C) 33 et 36 semaines d'aménorrhée

D) 33 et 37 semaines d'aménorrhée

7.La première complication métabolique qui tue le prématuré est l'hypocalcémie

A

B

9.L'ocytocine est l'hormone d'éjection du lait

A

B

10.Le nouveau-né d'une mère correctement vaccinée pendant la grossesse et né à domicile risque le tétanos néonatal

A

B

11.L'âge recommandé pour début le sevrage est de:

A) 6 mois

B) 1an et demi

C) 2 ans

D) 1 an

12.L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids à :

A) 16 mois

B) 14 mois

C) 15 mois

D) 12 mois

13.La principale cause de détresse respiratoire chez le nouveau-né prématuré né par voie basse est

A) troubles de résorption du liquide pulmonaire

B) Infection

C) Maladie des membranes hyalines

D) Inhalation du liquide pulmonaire

14.Les soins mère kangourou chez le nouveau-né prématuré font partie des soins délégués de l'agent de santé

A

B

15.Les problèmes suivants sont ceux du nouveau-né prématuré, sauf un:

A) souffrance cérébrale

- B) polyglobulie
- C) Ictère
- D) Détresse respiratoire

16.L'hypothermie est une complication grave chez le prématuré

- A
- B

17.L'erreur diététique est une cause de vomissements aigus du nourrisson

- A
- B

18.Les caractéristiques suivantes sont celles de la l'ocytocine , sauf une :

- A) agir sur les cellules épithéliales
- B) produit par l'hypophyse postérieure
- C) Est l'hormone d'éjection du lait
- D) Stimulé par la vue du bébé par la mère

19.Le plan de traitement des signes sévères de déshydratation est le :

- A) plan D
- B) plan C
- C) plan B
- D) plan A

20.L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance à 24 mois

- A
- B

21. Le nourrisson présentant des signes évidents de déshydratation est incapable de boire

A

B

22. La principale complication immédiate de la diarrhée aiguë du nourrisson est

A) Dysenterie

B) Déshydratation

C) Dénutrition

D) Septicémie

23. Le nouveau-né prématuré correctement nourri rattrape son retard pondéral entre :

A) 1 et 2 mois

B) 3 et 6 mois

C) 7 et 10 mois

D) 11 et 14 mois

24. Les caractéristiques suivantes sont celles de la prolactine, sauf une :

A) produit par l'hypophyse antérieure

B) agit sur les cellules myoépithéliales

C) Stimulé par la succion du sein

D) Est l'hormone de sécrétion

25. A 3 mois, le nourrisson né à terme et correctement nourri est capable de tenir un objet placé dans sa main pendant quelques secondes

A

B

26. La fontanelle antérieure se ferme à partir de 12 mois

A

B

27.En 2016 , le taux d'allaitement exclusif en Côte d'Ivoire était de :

A) 43%

B) 33%

C) 23%

D) 53%

28.En Côte d'Ivoire, la mise au sein précoce en 2016 était de:

A) 26,6%

B) 36,6%

C) 46,6%

D) 56,6%

29.Comme rôle de soins de l'agent de santé dans la prise en charge du nouveau-né prématuré, les soins mère Kangourou font partie des:

A) soins délégués

B) soins de collaboration

C) soins propres

D) conseil et prévention

30.Le nouveau-né normal a une coloration érythrosique (rouge sombre)

A

B

31.Le nouveau-né normal reçoit de la vitamine K1 en intramusculaires après la naissance

A

B

32. La peur de l'étranger est acquisition psychomotrice de l'enfant de 6 mois

A

B

33. La crise génitale chez le nouveau-né normal est due à un taux élevé dans son corps de:

A) ocytocine

B) Œstrogènes

C) prolactine

D) testostérone

34. Le nouveau-né macrosome a un poids supérieur ou égal à 4000 g

A

B

35. L'enfant né à terme et correctement nourri double sa taille de naissance à :

A) 2 ans

B) 5 ans

C) 4 ans

D) 3 ans

36. L'électrophorèse de protéine fait partie du bilan prénatal recommandé

A

B

37. Éden nourrisson de 12 mois n'a aucune dent dans la bouche, il s'agit d'un retard d'éruption dentaire

A

B

38. A 15 mois le nourrisson est capable de monter en se tenant à la rampe

A

B

39. Le nourrisson de 2 mois allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë

A

B

40. Les caractéristiques suivantes sont celles du nouveau-né normal, sauf un

A) lobule de l'oreille bien ourlé

B) coloration rose

C) fréquence cardiaque à 132 battements /min

D) petites lèvres proéminentes

41. La vomique correspond à une expectoration brutale par la bouche de pus ou de sérosité provenant par les voies respiratoires

A

B

TRAVAUX DIRIGES ANATOMIE PHYSIOLOGIE OBSTETRICALE DEUXIEME SEMESTRE LICENCE 1 2022

I. LE BASSIN OBSTETRICAL

QUESTION A CHOIX DOUBLE

1. Le bassin obstétrical est composé uniquement du bassin mou : **Faux**
2. Le bassin osseux est le bassin que doit traverser le fœtus : **Vrai**
3. Le bassin mou est l'ensemble de la musculature formée par le diaphragme pelvien : **Vrai**
4. L'orifice supérieur du bassin mou s'appelle le détroit supérieur : **Faux**
5. Le détroit supérieur du bassin mou est aussi appelé excavation pelvienne : **Faux**
6. Le détroit supérieur constitue la partie du bassin où le fœtus se dégage : **Faux, s'engage**
7. Le détroit inférieur constitue le lieu d'engagement du fœtus : **Faux**
8. L'excavation pelvienne constitue la région dans laquelle s'effectue la descente et la rotation de la présentation : **Vrai**
9. Le détroit inférieur a une forme losangique : **Vrai**
10. Le bassin féminin ressemble à un cœur de carte à jouer : **Vrai**
11. Le diamètre oblique mesure 14 cm : **Faux plutôt 11cm**
12. Le bassin mou est l'ensemble des muscles formé par le diaphragme pelvien et le périnée : **Faux, pas le périnée**
13. L'engagement est la traversée du détroit inférieur du bassin maternel et du plancher pelvi-périnéal : **Faux**

14. Le détroit inférieur du bassin mou est aussi appelé excavation pelvienne : **Faux plutôt du bassin osseu**

QUESTION A CHOIX MULTIPLE

16. Concernant les propositions suivantes, quelles sont celle(s) qui font partir du détroit supérieur

- A. Le bord supérieur de la symphyse pubienne
- B. Les lignes innominés puis le bord antérieur des ailerons sacrés
- C. Le promontoire
- D. La face antérieure de sacrum

17. Le périnée antérieur comprend :

- A. Le constricteur de la vulve
- B. Le bulbe caverneux
- C. Le transverse superficiel
- D. Le transverse profond

II. NOTION SUR LES PRESENTATIONS FCETALES -NOTION SUR LE MECANISME D'ACCOUCHEMENT-DELIVRANCE NORMALE-SUITE DE COUCHE-AVORTEMENT SPONTANEE ET AVORTEMENT PROVOQUE

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

- 1. La présentation est la partie fœtale qui est en regard avec le détroit inférieur : **Faux plutôt le détroit supérieur**
- 2. L'excavation pelvienne est le lieu de rotation et descente fœtus : **Vrai**
- 3. On parle de présentation céphalique si c'est le pôle podalique: **Faux plutôt du siège**
- 4. On parle de présentation du siège si c'est la tête : **Faux**
- 5. La descente du fœtus comprend trois étapes : **Faux**
- 6. Le dégagement c'est le franchissement du détroit inférieur du bassin maternel et du diaphragme pelvien : **Faux**
- 7. On distingue trois types de présentation : **Vrai**
- 8. Dans la présentation longitudinale l'accouchement par voie naturelle ou voie basse est possible : **Vrai**
- 9. Dans la présentation transversale l'accouchement par voie basse est possible : **Faux**

10. La présentation céphalique est une présentation longitudinale : **Vrai**
11. Il existe deux types de présentation céphalique : **Faux**
12. Le repère de la présentation céphalique du front est le menton : **Faux plutôt le nez**
13. Le repère de la présentation du bregma est la grande fontanelle : **Vrai**
14. Le repère de la présentation transversale est l'acromion : **Vrai**
15. L'accouchement est possible dans toutes les présentations longitudinales : **Faux**
16. Lors d'une présentation transversale la sage-femme ou l'infirmier doit faire l'accouchement : **Faux, doit référé**
17. L'engagement est la plus grande partie du fœtus ayant traversée le détroit supérieur : **Vrai**
18. Le repère de la présentation du front est la pointe du nez : **Vrai**
19. Au cours de l'accouchement par voie basse ou voie vaginale, la descente et la rotation du fœtus s'effectuent dans l'excavation pelvienne maternelle : **Vrai**
20. La présentation du sommet est celle au cours de laquelle la tête est bien défléchie : **Faux, plutôt bien fléchie**
21. Le nez du fœtus ou la racine du nez de la gestante est le repère de la présentation du front : **Faux, pas de la gestante**
22. Pour que le dégagement de la tête fœtal ait lieu il n'est pas nécessaire que le col utérin soit dilaté à 10 cm : **Faux**
23. Les joues du fœtus représentent le repère de la présentation de la face : **Faux**
24. La gestante peut effectuer un voyage d'agrément même en cas de menace d'accouchement prématuré : **Faux**
25. Le terme SONU veut dire soins obstétricaux et néonataux d'urgence : **Vrai**
26. L'administration intraveineuse des antibiotiques fait partie des SONU : **Vrai**
27. La CPN fait partie des SONU : **Faux**
28. La transfusion fait partie des SONU : **Vrai**
29. Toute fièvre au cours de la grossesse peut être responsable d'avortement spontané : **Vrai**
30. Les rapports sexuels sont systématiquement déconseillés au cours de la grossesse : **Faux**
31. Le sacrum de la gestante est le repère de la présentation du siège : **Faux, plutôt du fœtus**
32. Le repère de la présentation du sommet est l'occiput : **Vrai**
33. L'avortement provoqué peut être responsable de stérilité féminine : **Vrai**
34. Une infirmière diplômée d'Etat est un prestataire qualifié et compétent : **Vrai**
35. La durée d'expulsion ne doit pas dépasser 15 minutes chez la multipare : **Vrai**
36. La parturiente est la femme enceinte qui accouche
37. La loi Ivoirienne prévoit au moins 4 consultations prénatales au cours de la grossesse : **Vrai**
38. L'engagement de la tête fœtal se fait sous l'effet des contractions utérine : **Vrai**
39. Le premier temps de travail dans l'accouchement est la dilatation : **Vrai**
40. Le diagnostic biologique de la grossesse est fait grâce à l'échographie : **Vrai**

41. Les complications secondaires des avortements provoqués sont les infections : **Vrai**
42. L'engagement est la plus grande partie du fœtus ayant traversée le détroit supérieur : **Vrai**
43. L'involution utérine s'accompagne de saignement appelé lochies : **Faux**
44. L'accouchement normal est l'expulsion du fœtus hors des voies génitales maternelles au terme de la grossesse : **Vrai**
45. La délivrance est la 3eme grande phase de l'accouchement : **Vrai**
46. Les contractions utérines lors de l'accouchement sont irrégulières partielles et pas douloureuses : **Faux, douloureuse**
47. La GATPA se fait par traction contrôlée du cordon : **Vrai**
48. La deuxième phase de la délivrance normale est la migration du placenta vers la vulve: **Faux, plutôt la naissance**
49. Parmi les facteurs de mortalité maternelles, le 2eme retard est le retard dans l'administration des soins de qualité: **Faux, plutôt le 3eme**
50. L'avortement spontanée est l'expulsion du produit de conception avant 28 semaines d'aménorrhée, sans aucunes actions délibérées : **Vrai**
 51. L'avortement spontanée a répétition est la survenue d'au moins 2 avortements spontanés sans intervalle de grossesse a terme chez la même femme
 52. L'avortement spontanée est toujours complet : **Faux**
 53. Lors de l'accouchement le fœtus traverse successivement l'excavation pelvienne, le détroit inférieur et le détroit supérieur du bassin obstétrical : **Faux**
 54. L'avortement provoqué peut être thérapeutique : **Vrai**
 55. L'infertilité peut être une séquelle des avortements provoqué : **Vrai**

QCM

56. **Les présentations céphaliques comprennent :**
 - A. **Présentation du sommet**
 - B. Présentation de l'épaule
 - C. **Présentation du bregma**
 - D. **Présentation du front**
57. **La gestion active du troisième temps de l'accouchement associe**
 - A. Injection d'utero tonique
 - B. Mise en place d'une sonde urinaire
 - C. **Traction contrôlée du cordon**
 - D. **Le massage utérin**
58. **Lors de l'accouchement normal, trois éléments interviennent :**

- A. Le mobil foetal
 - B. L'utérus**
 - C. Les contractions utérines**
 - D. La filière pelvienne
59. **L'intérêt du détroit supérieur est :**
- A. La descente et la rotation
 - B. Le dégagement
 - C. L'engagement**
60. **Le détroit supérieur est limité en avant par :**
- A. La face postérieure de la symphyse pubienne
 - B. Le bord supérieur de la symphyse pubienne**
 - C. Les lignes innominées
61. **La présentation du sommet a pour repère :**
- A. L'occiput**
 - B. Le menton
 - C. La racine du nez
62. **L'accouchement naturel se définit**
- A. Un accouchement au déroulement parfaitement normal**
 - B. Un accouchement qui se déroule selon sa propre physiologie
 - C. Un accouchement qui bénéficie d'une intervention thérapeutique
63. **La première étape de la phase de travail :**
- A. L'engagement du fœtus
 - B. L'effacement et la dilatation du col**
 - C. La descente et la rotation
64. **Les causes directes de décès maternels sont :**
- A. Le paludisme
 - B. Les infections**
 - C. Avortement provoqué
 - D. Eclampsie**

65. Plusieurs phénomènes physiologiques se produisent pendant la période de suite de couche :

- A. Retour a la normal de l'organisme maternel**
- B. Mise en place de la lactation**
- C. Formations des poches des eaux
- D. Retour à la fonction hormonale

66. Les lochies sont :

- A. Sanglant les quatre premiers jours**
- B. Séro- sanglant vers le 8ieme jour**
- C. Séreux vers le 15ieme jours avec une odeur fade**
- D. Sanglant abondant vers le 20ieme jours

67. La délivrance normale comprend :

- A. La phase de rémission**
- B. La phase de décollement**
- C. La phase de migration**
- D. La phase hémorragique

68. Le diagnostic précoce de la grossesse est posé à l'examen paraclinique par :

- A. La recherche est beta HCG**
- B. La date des dernières règles
- C. L'absence des règles

69. Parmi les propositions suivantes, laquelle appartient aux soins individualisés

- A. Prendre d'une part active aux soins
- B. Mener une vie saine pour préserver sa santé**
- C. Préparation a l'accouchement et aux complications

70. La troisième phase de délivrance normal est :

- A. La phase de migration**
- B. La phase de décollement
- C. La phase d'expulsion**
- D. La phases de rémission

71. Dans les causes directes des décès maternels, les hémorragies représentent :

A. 22 % B. 25 % **C.21**

%

D. 31 %

72. La dernière consultation prénatale est réalisée :

A. Au troisième trimestre

B. Deux semaines avant la date présumée de l'accouchement

C. A la fin du troisième trimestre

D. Après le terme probable de l'accouchement

EPREUVE DE GYNECOLOGIE LICENCE 1 IDE / SF 2SEMETRE 2021

1ere partie : Questions à choix double (QCD) énoncé VRAI=A énoncé FAUX=B NB : Réponse

juste = +1 Réponse fausse= -1 pas de réponse= 0

1. La délivrance est la 3^{ème} phase du travail de l'accouchement.

A : VRAI

B : FAUX

2. La délivrance artificielle se réalise en cas de placenta partiellement décollé.

A : VRAI

B : FAUX

3. L'AMIU est la plus efficace que la méthode médicamenteuse dans la prise en charge des avortements après 12 semaines.

A : VRAI

B : FAUX

4. L'hémorragie lors de la délivrance ou après la complication maternelle la plus grave lors d'un accouchement.

A : VRAI

B : FAUX

5. La révision utérine est l'exploration manuelle de la cavité utérine, après l'expulsion du placenta.

A : VRAI

B : FAUX

6. L'échographie du premier trimestre qui permet de confirmer la grossesse doit être réalisée à la 22 semaine d'aménorrhée.

A : VRAI

B : FAUX

7. La présentation est la partie du fœtus qui présente en premier dans l'aire du détroit supérieur du bassin obstétrical.
A : VRAI B : FAUX
8. L'engagement est lorsque le plus grand diamètre de la présentation a franchi l'aire du détroit supérieur.
A : VRAI B : FAUX
9. Dans la présentation du sommet la présentation est le bregma ou la petite fontanelle.
A : VRAI B : FAUX
10. La délivrance normale doit se faire au maximum dans les 30 minutes après l'expulsion du fœtus.
A : VRAI B : FAUX
11. L'avortement spontané est le plus souvent douloureux et incomplet.
A : VRAI B : FAUX
12. Les complications immédiates sont des complications tardives d'un avortement provoqué.
A : VRAI B : FAUX
13. Le counseling sur une méthode de planification familiale est systématique dans les soins après avortement.
A : VRAI B : FAUX
14. Au cours de la grossesse, le col de la patiente est rosé.
A : VRAI B : FAUX
15. Le principe de la CPN recentrée repose sur les soins individualisés axés sur chaque femme.
A : VRAI B : FAUX
16. Les suites de couches normales durent en moyenne 1 mois.
A : VRAI B : FAUX
17. L'infirmier est qualifié pour procurer des CPN recentrées.
A : VRAI B : FAUX
18. Les saignements observés dans les suites de couches sont appelés des métrorragies.
A : VRAI B : FAUX
19. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont une politique mise en place pour réduire uniquement la mortalité maternelle.
A : VRAI B : FAUX

20. La manœuvre de Budin permet de faire le diagnostic de l'engagement fœtal au cours du travail.
- A : VRAI B : FAUX
21. L'augmentation de poids au cours de la grossesse mono-fœtal normale ne dépasse pas 12 kg environ.
- A : VRAI B : FAUX
22. L'excavation pelvienne sépare le petit bassin qui est en bas du grand bassin qui se trouve en haut.
- A : VRAI B : FAUX
23. La phase de l'expulsion du fœtus est la deuxième au cours de l'accouchement.
- A : VRAI B : FAUX
24. L'excavation est le canal où le fœtus effectue sa descente et sa poussée.
- A : VRAI B : FAUX

2^{ème} partie : QCD

NB : Réponse exacte= 1

Réponse fausse =0

Pas de pénalités

25. La GATPA compte 3 phases
- A L'injection de 10 ui en IM d'un utérotonique
B La vidange vésicale
C La TCC
D Le massage utérin
26. Deux situations ci-dessous sont des contre-indications à l'accouchement de siège sont :
- A SFA
B Bassin normal
C Primigeste
D Prématuro
27. Éléments de surveillance maternelle du post partum immédiat sont : (2 réponses justes).
- A Le globe utérin
B La consistance des mollets
C La recherche d'œdème aux membres inférieurs
28. Lors du diagnostic de la grossesse au début on observe (cocher la réponse fausse) :
- A Une augmentation du volume des seins
B Un col utérin violacé
C Une glaire cervicale abondante et filante

29. Identifiez deux signes digestifs retrouvés en début de grossesse :
- A Diarrhée
 - B Modification du goût
 - C Constipation
 - D Faux besoins
30. Parmi les assertions suivantes, deux sont des complications immédiates de l'avortement provoqué. Lesquels ?
- A Septicémie
 - B Hémorragie
 - C Béance du col
 - D Douleurs pelviennes chroniques
 - E Perforation utérine
31. Identifiez les deux objectifs de la CPN réalisée entre 4 et 6 mois :
- A Donner la 2^{ème} dose de TPI
 - B Suivre l'évolution de la grossesse
 - C Rechercher des facteurs de risques de prématurité
 - D Etablir le pronostic de l'accouchement
32. Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des phases de la délivrance normale.
- A Phase d'expulsion
 - B Phase de migration
 - C Phase de rémission
 - D Phase de décollement
33. Identifiez les examens biologiques obligatoires du bilan prénatal :
- A L'hémogramme
 - B La sérologie VIH
 - C La sérologie syphilitique
 - D Les groupes sanguins rhésus
 - E La glycémie veineuse
34. Les caractéristiques des contractions sont les suivantes sauf une :
- A Involontaire
 - B Permanentes
 - C Douloureuses
 - D Totales
35. Quelles sont les différentes parties de l'accouchement :

- A Phase de travail
- B Phase de toucher vaginale
- C Phase de palpation
- D Phase d'expulsion
- E Phase de délivrance

36. Cocher les deux bonnes réponses, après tout accouchement, l'accouché doit être hospitalisé selon la loi ivoirienne pendant :

- A 72 H
 - B 3 Jours
 - C Au moins 72 h
 - D Au plus 72 h E. Au moins 3 jours
37. La nidation a lieu : A. Dans la trompe
- B. Dans l'ovaire
 - C. Dans l'utérus
 - D. Dans l'endomètre

38. La nidation dure combien de jours

- A. 15 Jours
- B. 7 jours
- C. Au moins 7 jours
- D. Au plus 7 jours

39. Le vagin sert :

- A. À soutenir les organes pelviens
- B. Avoir des rapports sexuels
- C. Sécréter des règles
- D. Produire l'œstrogène

40. Les éléments suivants parties de l'appareil génital de la femme :

- A. Corps caverneux
- B. Trompe utérine
- C. Epididyme
- D. Vagin

41. Dans la présentation du front, le repère est :

- A. Occiput
- B. Petite fontanelle
- C. Racine du nez
- D. Grande fontanelle

42. Dans la présentation sommet, le repère est :

- A. Racine du nez
- B. Petite fontanelle
- C. Occiput
- D. Grande fontanelle

43. Dans la présentation du siège, le repère est

- A. Occiput
- B. Face
- C. Grande fontanelle
- D. Sacrum

EPREUVE D'ANATOMIE OBSTETRICALE

1. La nidation dure 08 jours **B**
2. Le vestibule fait partie de la vulve **A**
3. La fécondation a lieu dans le tiers externe de la corne utérines **B**
4. Le corps jaune se transformé en corpus albicans en cas de grossesse **B**
5. Les bourses et la verge constituent les organes génitaux chez l'homme **B**
6. Le cycle menstruel est long s'il excède 35 jours **A**
7. La puberté féminine aboutit à l'acquisition de la fonction de reproduction **A**
8. La période embryonnaire part de la fécondation a la 8eme semaine
9. L'ovogénèse a lieu dans les follicules ovariens. **A**
10. Le clitoris fait partie des organes érectile de la femme **A**

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE

11. Parmi ces muscles, lesquels font partie du diaphragme pelvien

- A. Le muscle constricteur de la vulve
- B. **Le muscle ischio-coccygien**
- C. Le muscle ischio-caverneux
- D. **Le muscle releveur de l'anus**
- E. Le sphincter externe de l'anus

12. Concernant la spermatogénèse

- A. Elle commence avant la naissance
- B. **Les spermatogonies vont donner naissance aux spermatoocytes primaire**

- C. Les spermatocytes sont le résultat de la méiose 1
- D. **Les spermatides sont des cellules haploïdes**
- E. **La LH augmente la production de testostérone**

13. Concernant le développement

- A. La migration et la fécondation se font simultanément
- B. **La migration et la segmentation se font simultanément**
- C. La segmentation et la nidation se font simultanément
- D. La fécondation et la segmentation se font simultanément
- E. La fécondation et nidation se font simultanément

14. Lesquels de ces organes masculins interviennent dans le transport des spermatozoïdes

- A. **Les canaux éjaculateurs**
- B. **L'épididyme**
- C. Les glandes bulbo-urétrales
- D. Les vésicules séminales
- E. **Les canaux déférents**

15. Pendant la phase folliculaire, les événements suivants sont observés :

- A. Phénomènes prolifératifs
- B. **Sécrétion de la glaire cervicale**
- C. **Sécrétion des œstrogènes**
- D. Sécrétion de la progestérone
- E. **E. Croissance des follicules ovariens**

16. Le pénis ou verge est constitué de :

- A. **Du corps spongieux**
- B. **Du corps caverneux**
- C. **Du gland**
- D. De l'urètre
- E. Du scrotum

17. Parmi ces fonctions, laquelle ne fait partie des fonctions du vagin :

- A. **Organe de gestation**
- B. Voie de passage des sécrétion utérines
- C. Organe de la copulation
- D. Voie d'exploration gynécologie
- E. Voie de passage de fœtus

18. Parmi les éléments suivants, lesquelles sont des parties de l'utérus

- A. **Col utérin**
- B. **Isthme utérin**
- C. Endomètre utérin
- D. **Corps utérin**
- E. Myomètre utérin

19. Concernant l'hormone lactogène placentaire, elle a un effet :

- A. Lutéotrope
- B. **Mammotrope**
- C. **Somatotrope**
- D. Métabolique
- E. Biologique

20. Concernant la puberté féminine

- A. **Le premier signe de cette puberté est le développement mammaire**
- B. La pilosité pubienne apparaît six mois avant le développement mammaire
- C. **Les règles apparaissent en moyenne à l'âge de 13 ans**
- D. La pilosité axillaire apparaît en moyenne à 11 ans
- E. **Le bassin de la jeune fille devient plus large que les épaules**

GYNECO SEMESTRE 2 ABOISSO 2019

VERSION A

QCD

1) Le repère de la présentation du sommet est la fontanelle postérieure ou lambda

- A- Vrai
- B- Faux

2) Parmi les facteurs de mortalité maternelle, le 3^{ème} retard est le retard dans la mise en place effective des éléments du SONU dès l'admission de la patiente dans la structure sanitaire

A- Vrai

B- Faux

3) La béance du col n'est pas une cause d'avortement spontané

A- Vrai

B- Faux

4) Le repère de la présentation du siège décomplété (ou mode des fesses) est les fesses du fœtus

A- Vrai

B- Faux

5) L'accouchement par voie basse n'est pas synonyme de l'accouchement par voie naturelle

A- Vrai

B- Faux

6) Il est conseillé à partir du 4^{ème} mois de grossesse de porter un soutien-gorge dont le bonnet est plus grand que celui porté avant la grossesse

A- Vrai

B- Faux

7) Dans les suites de couches immédiates, l'infirmier ou la sage-femme n'est pas obligé de surveiller le nouveau-né

A- Vrai

B- Faux

8) Au cours de l'accouchement par voie vaginale, la descente et la rotation du fœtus s'effectuent dans l'excavation pelvienne maternelle

A- fron

B- Faux

9) Le nez du fœtus ou la racine du nez de la gestante est le repère de la présentation du front

A- Vrai

B- Faux

10) La gestante peut effectuer un voyage d'agrément même en cas de menace d'accouchement prématuré

A- Vrai

B- Faux

11) L'avortement provoqué peut se compliquer de stérilité masculine

A- Vrai

B- Faux

12) Une infirmière diplômée d'état est un prestataire qualifié et compétente

A- Vrai

B- Faux

13) A partir du 3^{ème} trimestre de la grossesse, il est déconseillé de porter des chaussures à talon court et large

A- Vrai

B- Faux

14) Pour que le dégagement de la tête fœtale ait lieu, il n'est pas nécessaire que le col utérin soit dilaté à 10 cm

A- Vrai

B- Faux

15) Les joues du fœtus représentent le repère de la présentation de la face

A- Vrai

B- Faux

16) Le terme « S.O.N.U » veut dire les soins obstétricaux et néonataux d'urgence

A- Vrai

B- Faux

17) Toute fièvre non traitée à temps au cours de la grossesse peut être responsable d'avortement spontané

A- Vrai

B- Faux

18) Les rapports sexuels sont systématiquement déconseillés au cours d'une grossesse non compliquée

A- Vrai

B- Faux

19) L'avortement peut être responsable de stérilité féminine

A- Vrai

B- Faux

20) Le sacrum de la gestante est le repère de la présentation du siège

A- Vrai

B- Faux

QCM

21) Parmi les pathologies suivantes relevez les deux qui peuvent être des causes d'avortement spontané

A- La bécance du col de l'utérus

B- Le kyste de l'ovaire

C- La fausse couche spontanée

- D- Le myome utérin
- E- La grossesse à son début
- F- La présentation du sommet

22) Parmi les propositions suivantes, relever les deux examens complémentaires qui peuvent confirmer une grossesse à son début

- A- Dosage dans le sang maternel de l'hormone gonadotrophine chorionique
- B- Examen des urines
- C- Examen du sang
- D- Echographie pelvienne
- E- Albumine dans les urines
- F- Sucre dans les urines

23) Parmi les affirmations suivantes, relever les deux qui sont exactes :

- A- La prise de poids maternel caractérise les suites de couches normales
- B- L'involution utérine caractérise les suites de couches normales
- C- La fonction de lactation caractérise les suites de couches normales
- D- La boulimie caractérise les suites de couches normales
- E- La prise de la T.A de la gestante caractérise les suites de couches normales
- F- La perte de poids maternel caractérise les suites de couches normales

24) Parmi les affirmations suivantes, relever les deux qui sont fausses

- A- La période de raccourcissement et dilatation du col utérin est la 1ere période du travail de l'accouchement
- B- La délivrance est la 2eme période du travail de l'accouchement
- C- La naissance est la 3^{ème} période du travail de l'accouchement
- D- L'expulsion des annexes du fœtus est la 3^{ème} période du travail de l'accouchement
- E- L'expulsion du fœtus est la 2^{ème} période du travail de l'accouchement
- F- La délivrance est la 3^{ème} période du travail de l'accouchement

25) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes :

- A- Le myome utérin peut être une complication des avortements provoqués

- B- La grossesse extra utérine ne peut pas être une complication des avortements provoqués
- C- La dyspareunie peut être une complication des avortements provoqués
- D- La grossesse extra utérine peut être une complication des avortements provoqués
- E- La dyspareunie peut être une complication des avortements spontanés
- F- L'avortement provoqué peut être une complication des avortements spontanés

26) Parmi les propositions suivantes, relever 2 qui sont exactes :

- A- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de trois jours en fonction des places disponibles en hospitalisation dans le service
- B- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de deux jours en fonction des places disponibles en hospitalisation dans le service
- C- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures
- D- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures au minimum
- E- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de trois jours même s'il n'y a pas de places disponibles en hospitalisation dans le service
- F- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures au maximum

27) Parmi les propositions suivantes relever les deux qui sont des signes capitaux de la grossesse

- A- Nausée
- B- Aménorrhée
- C- Envies et somnolence
- D- Utérus mou
- E- Vomissement
- F- Dégoûts

28) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes

- A- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1ere journée vise à dépister l'hémorragie génitale
- B- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1ere journée vise à prévenir une phlébite
- C- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1ere journée vise à prévenir la constipation
- D- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1ere journée vise à dépister une anomalie de lactation
- E- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1ere journée vise à prendre la T.A de l'accouché
- F- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1ere journée vise à surveiller la température de l'accouchée

29) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes

- A- La TCC est systématiquement recommandée durant la naissance
- B- La délivrance dirigée avec le syntonisons est une technique de la G.A.T.P.A
- C- La TCC est une technique de la G.A.T.P.A
- D- a TCC n'est pas systématiquement recommandé durant la délivrance
- E- La TCC n'est pas systématiquement recommandée avant la naissance
- F- La TCC n'est pas une technique de la G.A.T.P.A

G- Le prestataire de santé autorisé à réaliser un avortement conforme aux lois doit être (relever les 2 réponses exactes)

- A- Sage-femme diplômée d'état
- B- Infirmier diplômé d'état
- C- Docteur en médecine
- D- Médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique
- E- Infirmière diplômée d'état
- F- Infirmière diplômée d'état ou sage-femme diplômée d'état

H- Présentation selon la tête fœtale (Cochez les réponses justes)

- a. En haut présentation céphalique
- b. En haut présentation siège
- c. Sur les côtés présentation transversale

I- Repère de la présentation

- a. Présentation du sommet, tête bien fléchie, on palpe l'occiput
- b. Présentation du siège, extrémité pelvienne, on palpe le sacrum
- c. Présentation de la face, tête totalement défléchie, on palpe le nez
- d. Présentation du front, tête peu défléchie, on palpe le bregma

J- Le muscle releveur de l'anus est à 3 cm de la vulve

- a. Vrai
- b. Faux

K- Le meilleur moment de pratiquer l'épisiotomie c'est quand l'anus de la parturiente est dilaté à 3 ou 4 cm dans la présentation céphalique

- a. Vrai
- b. Faux

L- La durée de l'expulsion (cochez les réponses fausses)

- a. C'est le temps écoulé depuis la descente et la rotation de la présentation sur le périnée (muscle releveur de l'anus) jusqu'à la naissance
- b. La durée d'expulsion ne doit pas dépasser 15 mn chez la primipare
- c. La durée de l'expulsion ne doit dépasser 20 mn chez la multipare
- d. La durée de l'expulsion ne doit dépasser 20 mn chez la primipare

M- La délivrance est l'expulsion hors des voies génitales maternelles des annexes fœtale (placenta et membrane) environ une demi-heure après la sortie du fœtus

A- Vrai

B- Faux

N- Les lochies sont : (cochez les réponses fausses)

- a. Sero-sanglantes entre le 3^e et le 7^e jour de l'accouchement
- b. Séreuse entre le 9^e et le 15^e jour de l'accouchement
- c. Sanglantes depuis l'accouchement jusqu'au 3^e jour
- d. Absentes à partir du 15^e jour de l'accouchement

O- Le système reproducteur du fœtus achève sa maturation avant la naissance

- a. Vrai
- b. Faux

P- La fécondation in vitro nécessite la perméabilité de la trompe de Fallope

- a. Vrai
- b. Faux

Q- Le taux hémoglobine doit être supérieur à 11g/100ml de sang chez la gestante non anémiée au dernier trimestre de grossesse

- a. Vrai
- b. Faux

R- Les modifications physiologiques de l'organisme maternel au cours de la grossesse disparaissent au plus tard 6 semaines après la fin de la grossesse

- A- Vrai
- B- Faux

S- Le col de l'utérus gravide est violacé et sécrète la glaire qui est limpide

- a. Vrai
- b. Faux

43) Le détroit supérieur représente le plan de l'engagement de la présentation fœtale lors de l'accouchement par voie basse

- A- Vrai
- B- Faux

C-Le détroit supérieur représente le plan de dégagement de la présentation fœtale lors de l'accouchement par voie haute

- A- Vrai
- B- Faux

TRAVAUX DIRIGES PATHOLOGIE RESPIRATOIRE

BRONCHITE AIGUE

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. La bronchite aigue est une inflammation des alvéoles : **Faux plutôt des bronches**
2. La bronchite aigue est une inflammation aigue des bronches ou des bronchioles d'origine infectieuse le plus souvent bactérienne : **Faux plutôt plus souvent viral**
3. La phase de début d'une bronchite aigue est caractérisée par une toux sèche : **Vrai**
4. Au cours de la bronchite aigue l'état général est altéré : **Faux**
5. Au cours de la bronchite aigue, la radiographie thoracique est toujours anormale : **Faux**
6. La principale complication de la bronchite aigue est la surinfection bactérienne : **Vrai**
7. La radiographie thoracique est indispensable pour le diagnostic de la bronchite : **Vrai**
8. La bronchite aigue est le plus souvent d'origine virale : **Vrai**
9. La phase de début de la bronchite aigue est caractérisé par une toux productive : **Faux**
10. La toux est dite chronique lorsqu'elle évolue depuis moins de 02 semaines : **Faux plutôt 3 semaines**
11. La toux est dite chronique lorsqu'elle évolue depuis plus de 03 mois : **Faux**
12. Le traitement de la bronchite aigue repose sur les moyens symptomatiques : **Vrai**
13. La prescription d'antitussif est systématique devant une toux grasse: **Faux plutôt toux sèche**
14. Le traitement de la bronchite aigue repose essentiellement sur l'antibiothérapie: **Faux**
15. La bronchite aigue est le plus souvent d'origine bactérienne : **Faux**
16. La prescription de mucorégulateur est systématique devant tous type de toux : **Faux**
17. La bronchite aigue est très souvent bénigne : **Vrai**
18. Dans le traitement de la bronchite aigue, les antibiotiques ne sont recommandés qu'à la phase catarrhale : **Vrai**
19. L'antibiothérapie est toujours indiquée dans le traitement de la bronchite aigue : **Faux**

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

20. Parmi ces propositions concernant la phase humide de la bronchite aigue, 2 sont justes : lesquelles ?
 - A. **L'examen physique est pauvre**
 - B. La vomique
 - C. La dyspnée

D. **La toux est productive**

E. La température est très élevée (39°-40°)

21. Cochez les signes de gravité d'une bronchite aiguë

A. **Toux productive**

B. Forte fièvre

C. **Douleur thoracique**

D. Rhinite

E. **Dyspnée**

F. Tension artérielle supérieur à 120mmHg

22. Cochez parmi les propositions suivantes les différents agents pathogènes les plus en cause de la bronchite aiguë

A. Le Mycobacterium tuberculosis

B. **Les virus**

C. **Le tabac**

D. Pneumocoque

23. Ces propositions concernant le traitement de la bronchite aiguë sont juste sauf 2 : lesquelles ?

A. **Apport de vitamine C et autre oligo-élément**

B. Décongestionnant nasaux

C. Conseil pour une alimentation équilibrée

D. **Antibiothérapie systématique**

E. Broncho dilateur

PNEUMOPATHIES AIGUES BACTERIENNES

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. La pneumopathie est une infection du parenchyme pulmonaire par les parasite: **Faux plutôt micro organismes**

2. En côte d'ivoire, la pneumopathie aiguë bactérienne est une pathologie : **Vrai**

3. La pneumopathie bactérienne est la première cause d'hospitalisation est la deuxième cause de consultation : **Faux plutôt l'inverse**

4. La pneumopathie aiguë bactérienne est une affection pleurale: **Faux**

5. La voie aérienne est une voie directe de mécanisme de la pneumopathie bactérienne : **Vrai**

6. Le début d'une pneumopathie franche lobaire aiguë est toujours brutal : **Vrai**

7. A l'examen physique lors d'une pneumopathie on observe un syndrome de condensation pulmonaire : **Vrai**

8. Le traitement de la pneumopathie sans signe de gravité ni complication se fait en ambulatoire : **Vrai**

9. Le traitement de la pneumopathie sans signe de gravité ni complications se fait par voie parentérale : **Faux**
10. L'infirmier est habilité à traiter une personne ayant la pneumopathie avec des signes de gravité : **Faux**
11. La surveillance du traitement de la pneumopathie nécessite de revoir la patiente 48- 72 heures après pour un contrôle de paramètre vitaux : **Vrai**
12. Le staphylocoque est le germe le plus fréquemment rencontré chez l'adulte atteint d'une pneumopathie aigue bactérienne : **Vrai**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

13. Ces propositions concernant les signes de gravités de la pneumopathie aigue bactérienne sont justes sauf 2 : lesquelles ?
- A. Trouble de la conscience
 - B. **Douleur thoracique**
 - C. Température $<35^{\circ}$ ou $>40^{\circ}$
 - D. **Fréquence respiratoire a 16 cycles /min**
 - E. Fréquence cardiaque >125 battement/min
14. Le germe le plus fréquemment retrouvé au cours de la pneumopathie aigue bactérienne chez l'enfant est (cochez la bonne réponse)
- A. **Le pneumocoque**
 - B. Le staphylocoque
 - C. La pseudomonas
 - D. Le bacille de koch
 - E. L'Haemophilus
15. Ces propositions concernant les signes de la pneumopathie bactérienne sont justes sauf 2, lesquelles ?
- A. Forte fièvre
 - B. **Début progressif**
 - C. **Douleur thoracique a type de point de coté**
 - D. Frisson
 - E. Syndrome d'atélectasie
16. Ces propositions concernant le traitement de la pneumopathie sans signe de gravité sont justes sauf une : laquelle ?
- A. Traitement ambulatoire
 - B. Amoxicilline
 - C. **Bi antibiothérapie**
 - D. Durée du traitement : 8 à 10 jours
 - E. Traitement par voie orale

EPANCHEMENTS PLEURAUX

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. L'épanchement pleural désigne la présence de liquide ou de gaz dans la cavité pleurale : **Faux plutôt la présence anormale**
2. L'épanchement gazeux pleural est encore appelé pneumothorax : **Vrai**
3. La pleurésie est l'accumulation le liquide dans la cavité alvéolaire : **Faux plutôt dans la cavité pleurale**
4. Il existe deux types de pleurésie : **Vrai**
5. L'hydropneumothorax est la présence de pneumothorax associé a une pleurésie : **Vrai**
6. La pleurésie exsudative est l'accumulation de liquide par un accroissement de la sécrétion liquidienne : **Vrai**
7. On observe une altération de l'état générale dans une pleurésie purulente : **Vrai**
8. La pleurésie purulente est une urgence thérapeutique : **Vrai**
9. La ponction pleurale est un acte uniquement médical : **Vrai**
10. La tuberculose est la première cause des pleurésies exsudatives : **Vrai**
11. Dans la majorité des pneumothorax le début est brutal : **Vrai**
12. Dans un centre de santé de niveau primaire, la ponction pleurale peut être réalisée par l'infirmier : **Faux**
13. Dans la réalisation d'une ponction pleurale, le rôle de l'IDE ou la SF est d'aider le médecin à effectuer ce geste : **Vrai**

LA TUBERCULOSE

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. La tuberculose est cosmopolite : **Vrai**
2. La tuberculose pulmonaire est la tuberculose la plus répandu au monde : **Vrai**
3. La tuberculose pulmonaire désigne tous cas de tuberculose confirmé bactériologiquement : **Vrai**
4. La tuberculose pulmonaire est une maladie infectieuse contagieuse : **Vrai**
5. Un nouveau patient atteint de tuberculose n'a jamais reçu de traitement antituberculeux ou suit un tel traitement depuis au moins 1 mois : **Vrai**
6. La tuberculose pulmonaire est la localisation du bacille tuberculeux au niveau de la plèvre : **Faux plutôt du parenchyme pulmonaire**
7. La tuberculose pulmonaire contagieuse est une priorité du programme national de lutte contre la tuberculose : **Vrai**
8. La tuberculose multirésistance désigne un cas ou le bacille tuberculeux est résistant au moins a la rifampicine ou a l'isoniazide : **Faux plutôt les deux**

9. La tuberculose est la première affection opportuniste au cours de l'infection VIH : **Vrai**
10. Le *Mycobacterium tuberculosis* est l'agent pathogène de la tuberculose chez l'homme : **Vrai**
11. Le bacille de koch est encore appelé *Mycobacterium bovis* : **Faux**
12. La grossesse est l'un des facteurs favorisant la contamination : **Faux plutôt la maladie**
13. Le début de la tuberculose pulmonaire commune est le plus souvent brutale : **Faux**
14. La tuberculose est la première affection opportuniste au cours de l'infection au VIH : **Vrai**
15. Dans la tuberculose pulmonaire, la toux est productive et évolue depuis au moins trois semaines : **Vrai**
16. La tuberculose pulmonaire est la localisation du bacille tuberculeux au niveau de plèvre: **Vrai**
17. Lors de l'examen physique de la tuberculose pulmonaire on observe un syndrome de condensation pulmonaire : **Vrai**
18. Le diagnostic biologique de la tuberculose repose sur l'examen bactériologique des crachats : **Vrai**
19. La bacilloscopie consiste en la recherche de bacille acido alcool résistant (BAAR) : **Vrai**
20. Il faut hospitaliser une femme enceinte devant une tuberculose : **Vrai**
21. Le traitement de la tuberculose dure 5 mois : **Faux plutôt 6 mois**
22. La durée de la phase d'entretien dans le traitement de la tuberculose commune est de 4 mois : **Vrai**
23. L'un des buts du traitement de la tuberculose est l'éducation sanitaire et souvent psycho-social : **Vrai**
24. Pendant le traitement de la tuberculose il faut associer au moins trois antituberculeux à la phase intensive du traitement : **Vrai**
25. On dit un patient est guérit de la tuberculose pulmonaire quant ce dernier présente des résultats négatifs au cours du dernier mois de traitement et au moins une fois auparavant : **Vrai**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

26. Parmi ces agents infectieux, cochez ceux qui sont responsable de tuberculose
 - A. ***Mycobacterium tuberculosis hominis***
 - B. *Staphylococcus aureus*
 - C. ***Mycobacterium bovis***
 - D. *Mycobacterium bovin*
 - E. ***Mycobacterium africanum***
 - F. *Mycobacterium african*
 - G. *Streptococcus pneumoniae*
27. La voie habituelle de contamination par le bacille de koch chez l'homme est la voie :
 - A. Placentaire

- B. Digestive
- C. Cutanée
- D. **Aérienne**
- E. Oculaire

28. Vous pensez qu'il s'agit d'une tuberculose pulmonaire, cochez parmi ces bilans, les trois examens utiles pour confirmer cette tuberculose

- A. Hémoculture
- B. Goutte épaisse
- C. **Bacilloscopie des crachats**
- D. **Intradermo-réaction a la tuberculine**

E. **Gene-Xpert des crachats**

F. Numération formule sanguine (NFS)

29. Dans la prise en charge de la tuberculose on prescrit : cochez la bonne réponse

- A. **4 mois de HRZE suivis de 2 mois de RH**
- B. 2 mois de HRZE suivis de 4 mois de RHE
- C. 2 mois de HRZE suivis de 4 mois de RH
- D. 6 mois de RHZE
- E. Aucune réponse n'est juste

30. Au cours du traitement d'un nouveau cas de tuberculose pulmonaire bacillifère, les contrôles bactériologiquement des crachats se font :

- A. Au 1^{er}, 4eme et 6eme mois de traitement
- B. **Au 2eme, 5eme et 6eme mois de traitement**
- C. Au 2eme, 4eme, 6eme mois de traitement
- D. Au 5eme, 6eme mois de traitement
- E. Au 3eme, 5eme et 8eme mois de traitement

31. Le traitement des nouveaux cas de tuberculose repose sur ces médicaments sauf 2 :

- A. Ethambutol
- B. Isoniazide
- C. **Kanamycine**
- D. Rifampicine
- E. **Erythromycine**
- F. Pyrazinamide

32. Quels sont les 2 signes qui ne font pas partie des signes d'imprégnation tuberculose ?

- A. Les sueurs nocturnes
- B. **La toux chronique**
- C. Le manque d'appétit
- D. **La fièvres permanente et élevée**
- E. La perte de poids

33. Parmi ces signes, un ne fait pas partie des signes d'imprégnation tuberculeuse :
- A. L'amaigrissement
 - B. **La toux chronique**
 - C. La fièvre vespérale
 - D. L'anorexie
 - E. Les sueurs nocturnes

LA BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)

QUESTION A CHOIX DOUBLE

1. La BPCO est l'ensemble des affections caractérisées par une limitation des débits aériens non ou incomplètement irréversible : **Faux plutôt réversible**
2. Le principal facteur étiologique de la BPCO est l'infection au VIH : **Faux plutôt tabagist**
3. Le principal facteur étiologique est la BPCO est le tabagisme : **Vrai**
4. La BPCO n'est pas une véritable maladie de civilisation : **Faux**
5. La BPCO est encore appelée Bronchite chronique obstructive : **Vrai**
6. La broncho-pneumopathie chronique obstructive est une pathologie liée au tabagisme : **Vrai**

L'ASTHME

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. L'asthme est une maladie aiguë des bronches : **Faux plutôt chronique**
2. L'asthme est une maladie chronique du parenchyme pulmonaire : **Faux une inflammation**
3. L'asthme est une inflammation de bronches entraînant une obstruction bronchique : **Vrai**
4. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches caractérisées par épisodes récurrents de bradypnée inspiratoire : **Faux plutôt expiratoire**
5. L'asthme bronchique est une maladie infectieuse : **Faux**
6. Chez l'asthmatique l'inflammation de la muqueuse bronchique est responsable d'une hyperréactivité bronchique à court terme : **Vrai**
7. Chez le sujet asthmatique il y a un hyperfonctionnement du système parasympathique : **Vrai**
8. Chez le sujet asthmatique il y a un hyperfonctionnement des récepteurs beta 2 du sympathique : **Faux**
9. L'asthme est une maladie aiguë des bronches caractérisée par des épisodes récurrents de dyspnée sifflant : **Fat**
10. Chez le sujet asthmatique, il y a un dysfonctionnement qualitatif et quantitatif des récepteurs Beta 2 : **Vrai**
11. L'obésité est l'un des facteurs favorisant l'asthme : **Vrai**
12. L'asthme commence toujours par les prodromes : **Vrai**
13. Chez Le sujet asthmatique on relève à l'examen physique un état général altéré : **Faux**

14. L'examen physique révèle chez l'asthmatique une fièvre : **Faux**
15. L'examen du diagnostic de certitude de l'asthme est la spirométrie : **Vrai**
16. La spirométrie permet de mesurer les gaz O₂ et CO₂ : **Faux plutôt la gazométrie**
17. Le traitement de la crise d'asthme est une urgence thérapeutique : **Vrai**
18. L'éducation thérapeutique est un volet indispensable de la prise en charge de l'asthmatique : **Vrai**
19. Les beta 2-agoniste de longue durée d'action sont les médicaments dans la prise en charge d'une crise d'asthme : **Faux**
20. La voie d'administration de choix des beta 2 mimétique a courte durée d'action est la voie injectable : **Faux**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

21. Cochez parmi ces informations, celles qui vous orientent vers une crise d'asthme
 - A. Le patient est suivi pour une hypertension
 - B. Le patient est très souvent enrhumé**
 - C. Le patient a une intoxication tabagique
 - D. Le patient a des antécédents de crises similaire depuis l'enfance**
 - E. Le patient a parfois une hémoptysie
 - F. La dyspnée survient quand il mange des arachides ou quand il nettoie les vieux placards**
 - G. Aucune réponse
22. Cochez parmi ces éléments de l'examen, celles qui vous orientent vers une crise d'asthme simple
 - A. Présence de fièvre
 - B. Présence de condensation pulmonaire**
 - C. Présence de sibilant**
 - D. Bon état général
 - E. Bradypnée avec des sibilants**
23. Si vous pensez qu'il s'agit d'une crise d'asthme, quels médicaments prescrirez-vous ?
 - A. Corticoïde inhalés (spray ou nébulisation)
 - B. Antibiotique
 - C. Corticoïdes oraux ou injectable**
 - D. Bronchodilatateurs à action rapide en inhalation (spray ou nébulisation)**
 - E. Antitussif
 - F. Bronchodilatateur a action rapide par voie orale ou injectable
 - G. Association sous la forme inhalée de corticoïde et bronchodilatateur de longue durée d'action
24. Vous décidez de prescrire un traitement de fond pour l'asthme après que la crise soit passée. Quels sont les médicaments essentiels ?

- A. Corticoïde inhalés(spray)
- B. Antibiotique
- C. Corticoïdes oraux ou injectable
- D. **Association sous la forme inhalée de corticoïde et bronchodilatateur de longue durée d'action**
- E. Héparine de bas poids moléculaire

25. Ces éléments traduisent un asthme aigue grave sauf un : lequel ?

- A. Difficulté a tousser
- B. Une polypnée avec FR>30 cycles/min
- C. Une tachycardie >120 Batt/min
- D. Un silence auscultatoire
- E. Une douleur thoracique
- F. **Une bradypnée**

EMBOLIE PULMONAIRE

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. L'embolie pulmonaire est une oblitération de l'artère pulmonaire : **Vrai**
2. L'embolie pulmonaire n'est pas une urgence médicale : **Faux**
3. L'embolie pulmonaire peut être totalement prise en charge par l'infirmier dans un centre de santé primaire : **Faux**
4. Le risque d'embolie pulmonaire est très élevé dans le post partum : **Vrai**
5. L'Age supérieur a 65 ans est une cause de survenue de l'embolie pulmonaire : **Vrai**
6. L'obstruction artérielle est une conséquence hémodynamique de l'embolie pulmonaire : **Vrai**
7. L'embolie gazeuse est une pénétration d'une quantité d'air plus ou moins importante dans les vaisseaux : **Vrai**
8. Dans l'embolie pulmonaire l'état général est conservé : **Vrai**
9. Le dosage des D-dimères est l'examen clé pour le diagnostic de certitude de l'embolie pulmonaire : **Vrai**
10. Le traitement de l'embolie pulmonaire doit se concevoir dans un service de spécialité : **Vrai**

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

11. Parmi ces éléments, cochez les causes acquises de l'embolie pulmonaire
 - A. **Obésité**

- B. **Cardiopathie**
 - C. Mutation du facteur II
 - D. **Diabète**
 - E. **Traumatisme des membres inférieur**
 - F. Déficit héréditaire en protéine naturelles anticoagulantes
12. Parmi les propositions suivantes cochez la conduite à tenir devant une embolie thérapeutique en tant qu'infirmier ou sage-femme dans ton CSU
- A. Faire un traitement des symptômes
 - B. **Faire une évacuation médicalisée**
 - C. Prendre en voie veineuse
 - D. Renvoyer le patient chez lui
 - E. **Hospitaliser le patient pour un traitement efficace**

OEDEME AIGUE DES POUMON (OAP)

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. L'œdème aigue des poumons se caractérise par la présence de liquide dans la plèvre
2. Il existe deux types d'œdème aigue des poumons
3. L'œdème aigue des poumons cardiogéniques est caractérisé par une augmentation de la pression hydrostatique
4. L'œdème aigue des poumons lésionnels est caractérisé par une altération de la membrane alvéolo-capillaire
5. L'œdème aigue du poumon n'est pas une urgence
6. Dans une OAP cardiogénique il y a une présence de fièvre
7. Dans une OAP lésionnel on remarque une absence de fièvre
8. Les perfusions et les transfusions peuvent être cause de OAP
9. Un infirmier doit prendre en charge un patient ayant un œdème aigue des poumons dans un centre de santé de premier contact
10. En cas d'œdème aigue des poumons le médicament à utiliser est l'antidiurétique

CAS PRATIQUE

CAS 1 : M. XY, âgée de 25 ans, est hospitalisé pour toux chronique et amaigrissement

Il présente depuis 2 mois une toux avec des expectorations muco-purulentes et une fièvre à 38°C. Il signale aussi un manque d'appétit, une douleur basithoracique et un amaigrissement de 6 kg depuis le début de sa maladie. Il est suivi pour une séropositivité liée au VIH1 et est traité par les ARV depuis 6

mois. L'examen physique note un syndrome de condensation pulmonaire aux 2 bases pulmonaires et une polypnée.

1. Quelle est votre 1^{ère} hypothèse diagnostique ?

- A. Bronchite aiguë
- B. Bronchite chronique
- C. Tuberculose pulmonaire
- D. Pneumopathie aiguë bactérienne
- E. Embolie pulmonaire

2. Quels sont les 2 examens biologiques de confirmation de ce diagnostic ?

- A. Intradermoréaction à la tuberculine
- B. Bacilloscopie des crachats
- C. Radiographie thoracique
- D. NFS
- E. Spirométrie
- F. Mesure du DEP

3. Si le diagnostic était la tuberculose pulmonaire, quels sont les médicaments que prescririez pour son traitement ?

- A. Amoxicilline
- B. Pyrazinamide
- C. Amoxicilline-acide clavulanique
- D. Ethambutol
- E. Chloramphénicol
- F. Rifampicine
- G. Richfer
- H. Isoniazide
- I. Ceftriaxone

4. Si le diagnostic était la tuberculose pulmonaire, vous prescririez le régime thérapeutique de nouveau cas qui est : cochez la bonne réponse

- A. 2 mois de HRZE plus 4 mois de RH
- B. 4 mois de HRZE plus 2 mois de RH
- C. 2 mois de HRZES suivie de 1 mois de RHZE et 5 mois de RHE
- D. 6 mois de RHZE

5. Si le diagnostic était la tuberculose pulmonaire, les contrôles bactériologiques des crachats se feraient selon le calendrier suivant :

cochez la bonne réponse

- | | |
|---|---|
| A. 2 ^e , 5 ^e et 6 ^e mois. | C. 2 ^e , 5 ^e et 8 ^e mois |
| B. 3 ^e , 5 ^e , et 8 ^e mois | D. 3 ^e , 6 ^e , et 8 ^e mois |

CAS 2 : Mlle XX, 14 ans, consulte pour dyspnée. L'interrogatoire retrouve d'une dyspnée apparue brutalement cette nuit avec la sensation de manque d'air. Ses antécédents sont marqués par des rhinites allergiques à répétition et une toux trainante généralement déclenchée par la poussière. Elle signale aussi qu'elle a quelques fois des épisodes d'étouffement la nuit. Elle n'a ni fièvre, ni amaigrissement. L'examen physique révèle un bon état général, une TA à 110/60 mm Hg. Sa température est de 37,1°C. L'examen de l'appareil respiratoire retrouve une bradypnée expiratoire et la présence de sibilants.

6. Quelle est votre 1^{ère} hypothèse diagnostique ?

- A. Bronchite aiguë
- B. Crise d'asthme
- C. Bronchite chronique
- D. Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- E. Embolie pulmonaire
- F. Pneumopathie aiguë bactérienne
- G. Œdème aiguë du poumon (OAP)

7. Présente-t-elle des signes de gravité ?

- A. Oui
- B. Non
- C. Je ne sais pas

8. Si vous décidez de traiter comme, quels seraient les médicaments nécessaires ?

- A. Corticoïdes inhalés (spray ou nébulisation)
- B. Antibiotiques
- C. Corticoïdes oraux ou injectables
- D. Bronchodilatateurs à action rapide en inhalation (spray ou nébulisation)
- E. Antitussif
- F. Bronchodilatateurs à action rapide par voie orale ou injectable
- G. Furosémide (Lasilix) injectable
- H. Association sous la forme inhalée de corticoïde et bronchodilatateur de longue durée d'action

9. Vous revoyez la demoiselle deux jours après votre prescription. A l'évaluation, les symptômes ont disparu et elle va bien. Prescrirez-vous des médicaments pour éviter les prochaines crises ?

- A. Non, pas nécessaire
- B. Oui nécessaire
- C. Je ne sais pas

10. Si vous décidez de prescrire un traitement. Quels sont les médicaments essentiels ?

- A. Corticoïdes inhalés (spray)
- B. Antibiotiques

- C. Corticoïdes oraux ou injectables
- D. Association sous la forme inhalée de corticoïde et bronchodilatateur de longue durée d'action

CAS 3 : Mme KZ, sans antécédent particulier consulte pour une toux. Il y a deux jours, la maladie a commencé par une rhinite avec des éternuements et des céphalées quelques heures plus tard sont apparues une sèche qui est devenue productive et qui ramenait des crachats muqueux et une petite fièvre non chiffrée. Votre examen physique est normal.

11. Quelle est votre 1^{ère} hypothèse diagnostique ?

- A. Crise d'asthme
- B. Bronchite chronique
- C. Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- D. Embolie pulmonaire
- E. Bronchite aiguë
- F. Pneumopathie aiguë bactérienne
- G. Œdème aigu du poumon (OAP)

12. Quels sont les agents pathogènes les plus en cause de cette maladie ?

- A. *Mycobacterium tuberculosis*
- B. Pneumocoque
- C. Virus
- D. Tabac

13. Votre prescription comprend :

- A. Amoxicilline
- B. Macrolide
- C. Antitussif
- D. Fluidifiant
- E. Vitamine C
- F. Paracétamol
- G. Rien de tous ces médicaments

14. Vous revoyez Mme KZ deux jours plus tard. Elle se plaint de la toux qui ramène des crachats muco-purulents et sa température est à 39°C mais l'examen reste normal. Votre diagnostic le plus probable est :

- A. Asthme aiguë grave
- B. Pneumopathie aiguë grave
- C. Surinfection de la bronchite aiguë
- D. Rechute de tuberculose

15.L'injection de tuberculine au cours du test d'IDR á la tuberculine se fait :

- A. Face antérieure de la main
- B. Face antérieure du bras
- C. Face antérieure de l'avant-bras

COCHEZ LES BONNES PROPOSITIONS

16.Les signes de gravité d'une pneumopathie bactérienne sont :

A- Fréquence respiratoire >30 cycles/mn B- Trouble de la conscience

C- Fréquence cardiaque >125 battements/mn

D- Température <35° ou > 40°

17.Trois (3) propositions sont justes concernant le traitement de la pneumopathie bactérienne sans signe de gravité : lesquelles ?

A- Amoxicilline

B- Hospitalisation

C- Durée du traitement : 8 à 10 jours

D- Amoxicilline + macrolides

E- Voie orale

18.Cochez les éléments qui traduisent un asthme aigu grave

A. Difficulté à tousser

B. Une polypnée avec FR>30 cycles/mn

C. Une tachycardie

D. Un silence auscultatoire

E. Une douleur thoracique

19.Laquelle de ces associations est juste concernant le traitement de fond de l'asthme (traitement d'éviction de crise d'asthme) ?

A- Bêta-2 agoniste de courte durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés B- Bêta-2 agoniste de courte durée d'action injectable + corticoïdes inhalés

C- Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes injectables

D- Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés E- Aucune de ces propositions n'est juste

20.Le syndrome d'épanchement pleural liquidien est constitué par :

A- Augmentation des vibrations vocales + tympanisme + diminution du murmure vésiculaire

B- Abolition des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants

C- Augmentation des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants

D- Abolition des vibrations vocales + matité + abolition du murmure vésiculaire

E- Aucune de ces propositions

21.La voie habituelle de contamination par le bacille de Koch chez l'homme est la voie :

- A- Cutanée
- B- Digestive
- C- Aérienne
- D- Placentaire
- E- Oculaire

22. Quels sont les 2 signes qui ne font pas partie des signes d'imprégnation tuberculeuse ?

- A- La perte de poids
- B- La toux chronique
- C- La fièvre permanente et élevée
- D- Le manque d'appétit
- E- Les sueurs nocturnes

23. Le traitement des nouveaux cas de tuberculose repose sur ces médicaments sauf 2 : lesquels ?

- A- Ethambutol
- B- Erythromycine
- C- Rifampicine
- D- Pirazinamide
- E- Isoniazide
- F- Kanamycine

24. Au cours du traitement d'un nouveau cas de tuberculose pulmonaire bacillifère, le contrôle bactériologique des crachats se fait :

- A- Au 1^{er}, 4^{ème} et 6^{ème} mois de traitement
- B- Au 2^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} mois de traitement
- C- Au 2^{ème}, 4^{ème} et 6^{ème} mois de traitement
- D- Au 5^{ème} et 6^{ème} mois de traitement
- E- Au 3^{ème}, 5^{ème} et 8^{ème} mois de traitement

25. Parmi ces éléments, Cochez les facteurs constitutionnels de l'embolie pulmonaire

- A- Anomalie congénitale due à une mutation du facteur V.
- B- Obésité
- C- Grands brûlés
- D- Déficit héréditaire en protéines naturelles anticoagulantes
- E- Protéines C et en protéines S
- F- Traumatisme des membres inférieurs
- G- Diabète

26. D.f consulte pour une dyspnée. Cette dyspnée semble de plus en plus intense depuis les 5 derniers jours. Elle a également une toux sèche et une douleur à l'hémithorax gauche. Vous suspectez un épanchement pleural : si pleurésie, cochez les signes retrouvés à l'examen physique

- A- Augmentation des vibrations vocales + tympanisme + diminution du murmure vésiculaire

- B- Abolition des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants
- C- Augmentation des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants
- D- Abolition des vibrations vocales + matité + abolition du murmure vésiculaire
- E- Aucune de ces propositions

27. Toutes ces propositions concernant les signes respiratoires de gravité de la crise d'asthme sont justes sauf 2 : lesquelles ?

- A- Difficulté à tousser
- B- Une polypnée avec FR > 30 cycles/mn
- C- Une tachycardie
- D- Un silence auscultatoire
- E- Une douleur thoracique

28. Laquelle de ces associations est juste concernant le traitement de fond de l'asthme ?

- F- Bêta-2 agoniste de courte durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés
- G- Bêta-2 agoniste de courte durée d'action injectable + corticoïdes inhalés
- H- Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes injectables
- I- Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés
- J- Aucune de ces propositions n'est juste

29. Toutes ces propositions concernant les signes de gravité d'un épanchement pleural sont justes sauf 2 : lesquelles ?

- A- La présence de signes de lutte respiratoire
- B- La toux
- C- La tachycardie
- D- La douleur thoracique
- E- Les extrémités froides

30. L'épanchement d'air dans la cavité pleurale est appelé :

- A- Hémithorax
- B- Hydro pneumothorax
- C- Empyème
- D- Pyopneumothorax
- E- Le pneumothorax

SOINS ESSENTIELS AUX NOUVEAU-NE

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. Le lavage des mains est l'une des prédispositions capitales à prendre avant l'accueil du nouveau-né en salle de naissance : **Vrai**
2. Le port de cache nez n'est non seulement une nécessité pour l'accueil du nouveau-né mais une obligation : **Vrai**
3. Les soins ombilicaux du nouveau-né sont faits dans les 3 minutes de vie : **Faux, plutôt la section**
4. Les soins peau à peau continue constituent un moyen privilégié pour maintenir la température corporelle dans les valeurs normales des bébés de petits poids et ceux qui sont froids en dépit d'être emmaillotté : **Vrai**
5. FB infirmier, conseille la mère de poursuivre l'administration de collyre au nouveau-né à la maison pour une durée de 7 jours afin de ne pas gaspiller le produit. Ce conseil est très pertinent : **Faux, applicable une fois**
6. La section du cordon ombilical chez un nouveau-né sans problème à la naissance intervient avant 1 minute de vie : **Faux**
7. La section immédiate du cordon ombilical du nouveau-né après la sortie de la filière génitale expose le nouveau-né à une anémie ferriprive : **Vrai**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

1. Les soins essentiels du nouveau-né sont limités aux :

- A. 5 premières minutes de vie
- B. 60 premières minutes de vie
- C. **90 premières minutes de vie**
- D. 24 premières minutes de vie

2. La respiration du nouveau-né ne vérifie entre :

- A. **0-1 minute**
- B. 1-5 minute

C. 5-10 minute

D. 10-15 minute

3. A la naissance, la section du cordon ombilical du nouveau-né se fait entre :

A. 0 et 1 minute de vie

B. 1 et 3 minutes de vie

C. 3 et 5 minutes de vie

D. 5 et 10 minutes de vie

4. Dans la première heure de vie, il est nécessaire de mesurer la température du nouveau-né toutes les :

A. 10 minutes

B. 15 minutes

C. 20 minutes

D. 30 minutes

5. La mise du nouveau-né au sein doit se faire précocement entre :

A. 0 et 15 minutes de vie

B. 15 et 30 minutes de vie

C. 30 et 60 minutes de vie

D. 60 et 90 minutes de vie

6. GG est né a 14H30 minute a terme. Il est en bonne santé apparente. Je mesure son poids et lui administre la vitamine K1 en IM entre

A. 14H30 min et 14H45 min

B. 14H46 min et 15H00 min

C. 15H01 min et 15H30 min

D. 15H31 min et 16H00 min

7. Dans l'exécution des soins essentiels du nouveau-né, la prise du poids et la réalisation de soins prophylactique interviennent entre :

A. Avant 60 minutes de vie

B. 60 et 90 minutes de vie

C. 90 et 120 minutes de vie

D. Après 120 minutes de vie

8. Dans l'exécution des soins essentiels du nouveau-né j'aide la mère à mettre son bébé au sein

A. Avant 60 minutes de vie

B. 60 et 90 minutes de vie

C. 90 et 120 minutes de vie

D. Après 120 minutes de vie

TOILETTE

QUESTION A CHOIX DOUBLE

1. La toilette est définie comme une technique qui consiste à plonger le nouveau-né dans l'eau : **Faux**
2. La toilette est indiquée chez le nouveau-né dont le cordon a chuté : **Vrai ???**
3. Il existe trois types de toilette : **Faux**
4. Après la toilette la transmission n'est pas exigée : **Faux**
5. Pendant la toilette l'agent de santé doit éviter les courants d'air : **Vrai**

BAIN DE L'ENFANT

QUESTION A CHOIX DOUBLE

1. Il existe trois types de bain : **Vrai**
2. Le bain est exigé chez le nouveau-né dont le cordon n'a pas chuté : **Faux**
3. Lorsque la température corporelle de l'enfant dépasse 39 degrés Celsius, il faut lui donner un bain tiède : **Faux**
4. Il est compté au nombre des types de bain, le bain de propreté : **Vrai**
5. Chez l'enfant qui a 12 ans, le bain est un risque : **Faux**
6. Lorsque l'enfant est agité il faut lui donner le bain thérapeutique : **Faux plutôt de détente**
7. Le bain de détente est indiqué chez l'enfant qui fait la fièvre : **Faux**
8. Bien tenir la tête du bébé est une précaution, pour donner le bain à un enfant : **Vrai**

9. Le bain est une source de bien-être : **Vrai**
10. Le bain est l'immersion du corps de l'enfant dans l'eau afin de maintenir la peau en parfait état de propreté et de prévenir l'apparition des lésions cutanées : **Vrai**

SOINS DES ORIFICES

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. Pour nettoyer les oreilles de l'enfant, l'on utilise le coton tige : **Faux**
2. Le nettoyage des yeux chassieux se fait de l'intérieur vers l'extérieur : **Faux**
3. Le nouveau-né de Mme TS présente une conjonctivite purulente. Je nettoie ses yeux de l'extérieur vers l'intérieur : **Vrai**
4. L'un des buts des soins des orifices est de prévenir les infections : **Vrai**
5. Les soins des orifices sont indiqués chez les enfants qui font la malnutrition sévère : **Vrai**
6. Lorsque l'œil est propre, le nettoyage se fait du coin intérieur de l'œil vers le coin extérieur : **Vrai**
7. Les soins des yeux se réalisent avec du coton imbibé d'antiseptique : **Faux plutôt avec du sérum physiologique ou eau tiède**
8. Pour faire les soins des oreilles il faut éviter le coton tige : **Vrai**
9. Pour les soins des yeux, il faut instiller 1 goutte de collyre d'antiseptique dans chaque œil 1 fois par jour : **Faux plutôt une seule fois**
10. Le nouveau-né de Mme HKB présente une conjonctivite purulente. Je nettoie ses yeux de l'intérieur vers l'extérieur : **Faux plutôt l'inverse**
11. L'une des dispositions indispensables à la réalisation des soins aux enfants est de réunir tout le matériel : **Vrai**
12. Pour faire les soins des oreilles il faut nettoyer la face interne du pavillon ensuite la face externe : **Vrai**
13. La réalisation des soins du nez se fait avec au moins 6 mèches de coton roulé : **Vrai**
14. Pour réaliser les soins du nez il faut imbiber les mèches de coton de sérum bicarbonaté à 14 % : **Faux**
15. Le nettoyage de bouche se fait avec une compresse enroulée au doigt imbibé préalablement de sérum physiologique : **Faux**

16. Les maladies infectieuses et les sécrétions abondantes indiquent essentiellement des soins des orifices : **Vrai**
17. Les soins des oreilles se font avec du coton tige ou des compresses en nettoyant la face interne du pavillon puis la face externe : **Faux**

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

1. Le soin de la bouche se fait avec
- A. Du sérum glucosé
 - B. Du sérum bicarbonaté
 - C. Du sérum physiologique
 - D. Du sérum hypertonique
2. Pour faire les soins de la bouche, il faut commencer par :
- A. Les gencives
 - B. Les parois internes des joues
 - C. La langue
3. Mme DKT envoie au centre de santé, son nouveau-né présentant un muguet buccal. L'agent de santé décide de faire le soin de la bouche avec :
- A. Du sérum glucosé isotonique
 - B. Du sérum bicarbonaté a 14 pour 1000
 - C. Du sérum salé physiologique

SOINS OMBILICAUX

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. Dans les soins ombilicaux, la solution ou le gel de chlorhexidine sur le cordon frais de la pointe du moignon a la base du cordon : **Vrai**
2. Le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et le matériel adéquat sont des précautions à prendre avant tout soins : **Vrai**
3. Le pansement du cordon frais a lieu les 5 premiers jours de vie du nouveau-né : **Faux**

4. Le pansement du cordon sec se déroule à partir du 6eme jours de vie jusqu'à la chute du cordon : **Faux**
5. Le pansement de la plaie ombilicale intervient après la chute du moignon du cordon : **Vrai**
6. Le procédé pour le pansement du cordon sec consiste a nettoyer le moignon du cordon ombilical sec de la base vers l'extrémité : **Vrai**
7. Le procédé pour le pansement du cordon frais consiste a appliquer la chlorhexidine de l'extrémité du moignon, tout le long du cordon jusqu'à la base : **Vrai**
8. Le pansement de la plaie ombilicale se fait de l'extérieur vers l'intérieur : **Faux plutôt l'inverse**
9. La maitrise de la technique des soins ombilicaux met l'enfant a l'abri des infections : **Vrai**
10. Le pansement a la Chlorhexidine se fait une fois par jour jusqu'à la cicatrisation : **Vrai**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

1. **Le pansement du cordon ombilical frais est réalisé pendant les :**
 - A. 2 premiers jours de vie
 - B. **3 premiers jours de vie**
 - C. 4 premiers jours de vie
 - D. 5 premier jours de vie
2. **Vous recevez à votre permanence le nouveau-né YC au 5eme jours de vie, avec une pate de médicament traditionnel sur le cordon ombilical. Vous décidez d'effectuer le soin ombilical :**
 - A. **De la base vers la pointe du moignon du cordon ombilical**
 - B. De la pointe du moignon du cordon vers la base de l'ombilic
 - C. De la base de l'ombilic vers le moignon du cordon
3. **Parmi les précautions suivantes, deux sont à observer par l'agent de santé avant les soins ombilicaux. Lesquelles ?**
 - A. **Oter les bijoux**
 - B. Habiller le nouveau-né
 - C. **Demander l'identité du nouveau-né a sa mère**

D. Remercier la mère

E. Noter le soin dans le carnet ou le dossier médical du nouveau-né F. Nettoyer et ranger le matériel

CARNET DE SANTE MERE-ENFANT

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. Dans le carnet de santé mère enfant la partie réservée à l'accouchement concerne la 3eme partie : **Vrai**
2. Le carnet de santé mère enfant est un document médico-légal : **Vrai**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

1. Dans le carnet de santé mère-enfant, la partie réservée à l'accouchement concerne :
 - A. 3eme partie
 - B. 1ere partie
 - C. 2eme partie
 - D. 4eme partie
2. Pour affirmer qu'une gestante est bien suivie, il faut qu'elle réalise
 - A. Au plus 3 consultations prénatales
 - B. Au moins 4 consultations prénatales
 - C. Au plus 2 consultations prénatales
 - D. Entre 2 et 3 consultations prénatales

CROISSANCE DE L'ENFANT : MENSURATION

POIDS

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. La croissance physique est un processus dynamique, ordonné, évolutif, mesurable : **Vrai**

2. Le nouveau-né normal perd 5 à 10% de son poids de naissance entre le 3ème et le 5ème jour de vie : **Vrai**
3. Le nouveau-né normal a un poids en dessous de 2500 : **Faux**
4. Le nouveau-né à terme eutrophique reçoit de la vitamine K1 en IM : **Vrai**
5. L'intervalle de poids de naissance normal du nouveau-né est compris entre 2500 et 3500 grammes : **Faux**
6. L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance à 24 mois : **Faux**
7. Chez les enfants âgés de 4 à 12 mois, prendre le poids de l'enfant une fois par mois : **Vrai**
8. Prendre le poids de l'enfant une fois par semestre chez les enfants âgés de 13-24 mois
9. L'interprétation des données recueillies amène l'agent de santé à réorienter l'enfant dans un service adéquat : **Vrai**
10. Prendre le poids des enfants de 0 à 1 mois, une fois par semaine : **Vrai**

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

1. Parmi les propositions suivantes, une fait partie de l'intérêt des mensurations chez les enfants

A. Apprécier l'état nutritionnel

B. Ajuster le statut vaccinal

C. Ajuster l'évolution staturale

D. Tracer la courbe de poids

2. Parmi les mesures ci-dessous une est utilisée pour apprécier la croissance de l'enfant

A. La température

B. La fréquence respiratoire

C. Le rythme cardiaque

D. Le périmètre brachial

3. Le poids théorique d'un enfant de 9 ans correctement nourri depuis la naissance est de

A. 16 kg

- B. 18 kg
 - C. 20kg
 - D. **26 kg**
4. PH est âgé de 8 ans. Il a une croissance normale. Le poids idéal théorique de PH est
- A. **24 kg**
 - B. 20 kg
 - C. 22kg
 - D. 26 kg
5. Le poids théorique d'un enfant de 5 ans correctement nourri depuis la naissance est de :
- A. 16 kg
 - B. **18kg**
 - C. 20 kg
 - D. 22 kg
6. Le nouveau-né normal et nourri au sein, double son poids a
- A. 2 mois
 - B. 4 mois
 - C. **3 mois**
 - D. 6 mois
7. L'enfant né a terme et correctement nourri double sa taille de naissance a
- A. 3 ans
 - B. 5 ans
 - C. **4 ans**
 - D. 2 ans
8. L'enfant né a terme et correctement nourri triple son poids a
- A. 16 mois
 - B. 14 mois
 - C. 15 mois
 - D. **12 mois**
9. Le nouveau-né au sein prend en moyenne

- A. 10 à 20 grammes par jours
 - B. 25 à 30 grammes par jour**
 - C. 20 à 25 grammes par jour
 - D. 20 à 40 grammes par jour
- 10. Le poids de naissance du nouveau-né normal est compris entre :**
- A. 2500g et 3500g
 - B. 2500g et 3700g
 - C. 2500g et 3800g
 - D. 2500 et 4000g**
- 11. Vous recevez un nourrisson de 12 mois pesant 12 kg. Il est correctement alimenté depuis la naissance son poids de naissance est :**
- A. 2500 grammes
 - B. 2800 grammes
 - C. 3500 grammes
 - D. 4000 grammes**
- 12. QP est âgé de 12 mois et pèse 10,5kg. Son poids de naissance était de :**
- A. 3000g
 - B. 3250g
 - C. 3400g
 - D. 3500g**
- 13. Le rythme de surveillance de la croissance du nouveau-né est :**
- A. 1 consultation par jour
 - B. 1 consultation par semaine**
 - C. 2 consultations par semaine
 - D. 1 consultation par mois
- 14. Les éléments de surveillance du développement staturo-pondéral sont aussi appelés**
- A. Inducteur de croissance
 - B. Élément de croissance

C. **Indicateur de croissance**

D. Repère de croissance

15. Laquelle de propositions suivantes n'est pas un but de la mensuration régulière de l'enfant ?

A. De suivre l'évolution de la croissance de l'enfant

B. D'apprécier l'état nutritionnel de l'enfant

C. D'ajuster les doses de médicament à administrer à l'enfant

D. **De suivre le calendrier vaccinal**

16. L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance à : A. 16 mois

B. 14 mois

C. 10 mois

D. 12 mois

17. Rythme de surveillance de la croissance du nouveau-né

A. 1 consultation par jour

B. 1 consultation par semaine

C. 2 consultations par semaine

D. 1 consultation par mois

18. Au cours de la surveillance de l'enfant allaité la prise de poids normale de l'enfant est comprise entre :

A. 10 à 15 grammes par jour

B. 15 à 20 grammes par jour

C. 20 à 25 grammes par jour

D. 25 à 30 grammes par jour

TAILLE

QUESTION A CHOIX DOUBLES

1. Le stress et le manque d'affection sont des facteurs environnementaux limitant la croissance harmonieuse de l'enfant

2. La croissance des os, la taille et le périmètre crânien sont les éléments quantitatifs de la croissance de l'enfant
3. Pour prendre la taille d'un enfant âgé de 4 ans j'utilise une toise verticale
4. A la naissance l'enfant a une taille moyenne de 50 cm. S'il est correctement nourri et en bonne santé, sa taille augmente de 3cm/mois entre 0 et 3 mois
5. La taille est la hauteur de l'enfant mesurée depuis le sommet du crane jusqu'au talon
6. L'enfant correctement nourri et en bonne santé augmente de taille de 2cm/mois entre 6 et 12 mois

QUESTION A CHOIX MULTIPLES

1. **QJ est né à terme avec une taille de 50 cm. Il est correctement nourri.**

Sa taille a 4 ans est de :

- A. 80 cm
 - B. 90 cm
 - C. 100 cm
 - D. 110 cm
2. **L'enfant né a terme et correctement nourri double sa taille de naissance a :** A. 4 ans
 - B. 5 ans
 - C. 3 ans
 - D. 2 ans
3. **L'enfant né a terme et correctement nourri double sa taille de naissance a :** A. 48 mois
 - B. 60 mois
 - C. 24 mois
 - D. 36 mois
4. **BV est correctement nourri depuis la naissance et a une taille de 92 cm. Le médecin vous informe que BV viens de doubler sa taille de naissance. Je déduis que BV est âgé de**
 - A. 24 mois

- B. 36 mois
- C. 12 mois
- D. 48 mois

PERIMETRE BRACHIAL

1. Entre 1 et 2 ans, la valeur du périmètre brachial comprise entre 14 et 16 cm est dite normal
2. **Le périmètre brachial permet d'évaluer l'état nutritionnel du nourrisson. Ainsi est considéré ayant une malnutrition par carence, tout enfant de plus de 1 ans dont le périmètre brachial est :**
 - A. Supérieur à 16 cm
 - B. Supérieur à 14 cm
 - C. Inférieur à 12 cm
 - D. Inférieur à 15 cm

FONTANELLES

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. La fontanelle antérieure du nouveau-né est appelée le bregma
2. La fontanelle postérieure du nouveau-né est de forme losangique
3. La fontanelle antérieure est de forme losange et se ferme à 1 an
4. La fontanelle postérieure se ferme à 1 mois
5. La fontanelle antérieure se ferme à partir de 12 mois

INCUBATEUR

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES

1. Les incubateurs ouverts sont aussi appelés tables radiant
2. Chez l'enfant en incubateur il faut surveiller la coloration et les selles

3. Au niveau de l'incubateur, il faut vérifier qu'il y a seulement de l'eau distillée dans le bac
4. L'une des principales fonctions de l'incubateur est d'assurer un isolement sur le plan infectieux
5. Le nouveau-né en incubateur est exposé aux agressions extérieures
6. L'incubateur est un dispositif médical destiné à maintenir le nouveau-né normal ou le prématuré dans une atmosphère appropriée en termes de température, d'humidité et d'oxygène
7. Il existe deux types d'incubateur
8. La fonction principale de l'incubateur est d'assurer la respiration d'un air filtré et humidifier
9. Les incubateurs sont utilisés seulement dans les services de maternité et de réanimation néonatale

Sujet de maladies non transmissibles

- 1- **Choisir parmi les maladies suivantes, les 3 maladies non transmissibles** A- Diabète du sujet jeune
C- Hypertension sur grossesse
E- Asthme
- 2- **Parmi les maladies ci-après, l'organisation mondiale de la santé en a retenu 4 comme étant les principales maladies non transmissibles, choisir les 2 non retenus par cette organisation.**
C- La tuberculose pulmonaire
F- Le rhumatisme articulaire aigu
- 3- **Les deux expressions suivantes permettent de définir l'épidémiologie des maladies non transmissibles ; lesquelles** B- Facteur de risque
D- Facteurs favorisants
- 4- **Choisir deux définitions justes des maladies non transmissibles parmi celles énoncées cidessous**
B- Affections non causées par un agent pathogène
D- Affections de longue durée, à évolution lente et progressive
- 5- **Choisir parmi les propositions suivantes les 4 facteurs dits facteurs de risque du diabète** A- Manque d'exercice
C- Abus d'alcool

E- Hérité

F- Stress

6- **Parmi les expressions suivantes qui permettent de définir un facteur de risque ,un seul n'est pas juste ,lequel ?**

B- Un germe pathogène

7- **Les éléments ci-après caractérisent « un état physiologique » sauf deux, lesquels ?**

B- Hypertension artérielle

E- Alimentation

8- **Les facteurs de risque des MNTs dans les collectivités sont décrits par les éléments suivants sauf deux ; lesquels ?**

C-Tabagisme, alimentation malsaine

F-Constitution génétique

9- **Le diabète est une maladie chronique causé par : (Choisir les réponses justes)**

A- Un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation.

C- un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée insuline.

10- **Retenir les 3 appellations du diabète insulino-dépendant parmi les propositions ci- dessous**

A- Diabète maigre

B- B- Diabète juvénile

D- Diabète type 1

. 11- **Le diabète non insulino-dépendant est aussi appelé : (choisir les bonnes appellations)**

C- Diabète gras

12- **Parmi les types de diabète habituellement décrits une seule des définitions ci-après est juste, laquelle ?**

C-Diabète gestationnel : survient chez la femme seulement au cours de la grossesse

13- **Les phénomènes suivants sont à l'origine de l'augmentation du nombre de cas de diabète non insulino-dépendant dans le monde : (cocher les deux réponses justes)** A- La croissance et le vieillissement de la population

C- La hausse de prévalence à des âges déterminés

14- **Les symptômes habituellement présents dans le diabète, sont les suivants sauf un (cocher les réponses justes)**

A- Une soif et/ou une faim anormales B- B- Une envie d'uriner plus souvent

D- Une sensation de faiblesse et de fatigue

15- **Les maladies suivantes font partie des complications du diabète, lesquelles ?**

A- Insuffisance rénale (l'urée augmentée) B- B- Insuffisance cardiaque

D- Impuissance sexuelle chez l'homme

E- Gangrène des pieds

16- Il ya deux propositions justes de définition de la tension artérielle, lesquelles ?

A- Vitesse à laquelle le sang circule dans les artères

C- Pression de sang sur la paroi des artères

17- Choisir parmi les facteurs ci-après au nombre de 3 sont considérés comme pouvant occasionner l'hypertension artérielle ; lesquels ? A- Le tabagisme

C- Le stress

E- L'hérédité

18- En vue de prévenir les risques de survenu de l'Hypertension artérielle, choisir 3 conseil utiles parmi ceux proposés ci-après. B- Réduire la consommation de graisse

D- Faire de l'exercice régulièrement

E- Réduire le poids en cas d'excès de poids

19- Les fibres alimentaires favorisent l'éclosion progressive des maladies non transmissibles F

20- Les bienfaits de la consommation abusive de l'alcool sont entre autre l'impuissance sexuelle chez les hommes, les troubles mentaux et l'harmonie conjugale F

21- Les conséquences du stress sont entre autre l'hypertension artérielle, diabète et troubles mentaux. V

22- La mesure de la pression artérielle se décompose en deux valeurs exprimées en centimètre de mercure (cmHg) V

23- Un environnement favorable à la santé est un environnement qui exerce une influence positive sur l'état de santé des individus, en facilitant les choix bénéfiques à la santé V

24- L'activité physique est définie comme étant l'ensemble des efforts exercés par la musculature squelettique qui a pour conséquence d'accroître la dépense énergétique au-delà de celle qui est propre au repos. V

25- L'activité physique est synonyme de sport F

26- La sédentarité est définie comme étant l'« absence d'activité ou d'exercice physique ». V

27- La pression artérielle diastolique est le relâchement du muscle cardiaque V

28- La pression artérielle diastolique est toujours supérieure à 90 mmHg F

29- La pression artérielle systolique est la contraction du muscle cardiaque V

30- La pression artérielle diastolique est la contraction du cœur F

31- La pression artérielle ou tension artérielle fait partie des maladies non transmissibles retenues par l'OMS F

32- La pression artérielle systolique ne doit pas être supérieure à 140 mmHg V

33- Une personne est déclarée hypertendue lorsque, les valeurs systoliques et diastoliques de sa tension artérielle sont supérieures respectivement à 140 et 90 mmHg après plusieurs prises chez cette personne V

- 34- L'excès d'alcool, de sels, de tabac et la sédentarité peuvent être les facteurs principaux de risques Cardiovasculaires dans l'hypertension artérielle F
- 35- La notion de « sport » implique le plus souvent des activités physiques d'intensité élevée, structurées, régies par des règles, et pratiquées dans des situations compétitives V
- 36- La déclaration à « l'hypertension artérielle » d'une personne est faite de façon systématique lorsque, les valeurs systoliques et diastoliques de la tension artérielle sont supérieures respectivement à 140 et 90 mmHg dès la première prise chez cette personne F
- 37- Les artères sont les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang du cœur vers les organes V
- 38- La tension artérielle correspond à la pression du sang sur la paroi des artères qui conduisent le sang du cœur vers les organes V
- 39- La cérémonie de port de blouse organisée en l'honneur de la licence est une activité considérée comme éliminatoire de stress V
- 40- L'hypertension artérielle accentue le risque d'artère bouchée et donc d'infarctus V
- 41- Les artères obstruées favorisent aussi l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque et les troubles de la vision V
- 42- L'hypertension artérielle ralentit le risque d'artère bouchée et donc d'infarctus F
- 43- Une forte pression du sang sur la paroi des artères contribue au vieillissement accéléré de ces vaisseaux sanguins V
- 44- Les maladies non transmissibles sont toutes appelées maladies chroniques V
- 45- L'Hypercholestérolémie et les maladies mentales sont spécifiquement des maladies non transmissibles V
- 46- Les maladies infectieuses peuvent se transformer en maladies non transmissibles F
- 47- Une maladie chronique est différente d'une maladie non transmissible F
- 48- Dans la prévention des maladies non transmissibles, réduire la consommation de graisse, d'alcool, de sucre, de sel et augmenter celle des légumes et fruits constituent, ce que l'on appelle avoir une alimentation équilibrée V
- 49- Les vaisseaux transportant du sang non oxygéné sont appelés les veines V
- 50- Une maladie est dite non transmissible quand elle attaque les deux sexes et tous les âges F
- 51- L'exercice des soins infirmiers est une profession génératrice de stress V
- 52- L'ambition de quelques étudiants de la licence 1 en sciences infirmières et obstétricales est de passer en année supérieure F

ÉVALUATION N2-S2 ÉPIDÉMIOLOGIE & CCSC (Santé Publique) IDE/SF/MT L1 2023

SEMESTRE 2

1. L'épidémiologie étudie la répartition et la distribution de la santé et de la maladie dans le temps sur un territoire géographique donné.

A

B

4.L'épidémiologie étudie les êtres humains ainsi que les animaux.

A

B

5.L'épidémiologie s'intéresse à la fois à la maladie et au malade.

A

B

6.La finalité thérapeutique en épidémiologie est la guérison du malade.

A

B

7.L'épidémiologie étudie un groupe un individu et non un groupe d'individus.

A

B

8.L'approche clinique dans la résolution des problèmes de santé est l'éradication de la maladie

A

B

9.L'épidémiologie étudie les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles.

A

B

10.La proportion est un rapport dans lequel le numérateur est inclus dans le dénominateur

A

B

11. Le taux est un rapport dans lequel le numérateur est le dénominateur.

A

B

12. L'épidémiologie étudie la distribution de la santé dans le temps et dans l'espace sur un territoire géographique donné.

A

B

13. L'épidémiologie est une discipline scientifique qui s'étudie selon deux axes

A

B

14. Les phénomènes en épidémiologie sont au nombre de trois

A

B

15. Les axes en épidémiologie sont :

A. Axe descriptif

B. Axe analogique

C. Axe évaluatif ou d'action

D. Axes conceptuels

16. Les concepts statistiques qui permettent de résumer les données épidémiologiques sont :

A. Le ratio

- B. L'indice
- C. La proportion
- D. Le taux

17. Les phénomènes de masse en épidémiologie sont :

- A. L'épidémie
- B. L'endémie
- C. La pandémie
- D. La padémie

18. L'épidémie est un phénomène de masse

- A. Limitée dans le temps et dans l'espace
- B. Illimitée dans le temps et limitée dans l'espace
- C. Illimitée dans le temps et illimitée dans l'espace
- D. Limitée dans le temps et illimitée dans l'espace

19. L'endémie est un phénomène de masse

- A. Illimitée dans le temps et illimitée dans l'espace
- B. Illimitée dans le temps et limitée dans l'espace
- C. Limitée dans le temps et limitée dans l'espace
- D. Limitée dans le temps et illimitée dans l'espace

20. La pandémie est un phénomène de masse

- A. Limitée dans le temps et illimitée dans l'espace
- B. Illimitée dans le temps et dans l'espace
- C. Illimitée dans le temps et illimitée dans l'espace
- D. Limitée dans le temps et limitée dans l'espace

21.L'épidémiologie descriptive permet de répondre à :

- A. Quatre questions
- B. Une question
- C. Trois questions
- D. Deux questions

22.L'Épidémiologie analytique permet de répondre à :

- A. Quatre questions
- B. Une question
- C. Trois questions
- D. Deux questions

23.L'Épidémiologie évaluative permet de répondre à :

- A. Quatre questions
- B. Une question
- C. Trois questions
- D. Aucune question

24.Dans le processus de communication, si l'objectif n'est pas fixé au départ, il sera difficile de mesurer les résultats à la fin

- A
- B

25.La méthode est la technique que je vais utiliser pour passer le message

- A
- B

26.La communication pour le changement de comportement est un processus interactif et participatif

A

B

27.Elle permet d'échanger des informations, des idées, des connaissances, des opinions et des décisions.

A

B

28.La perception, c'est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d'informations externes pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure.

A

B

29.Les croyances correspondent à un élément de connaissance descriptive qu'un individu entretient à l'égard d'un objets

A

B

30. Les attitudes résument les évolutions positives ou négatives, les réactions émotionnelles et les prédispositions à agir.

A

B

31.La culture est l'ensemble des normes, rites valeurs, convictions et habitudes d'une société.

A

B

32.Toute société met en place un système de stratification sociale des différentes classes sociales.

A

B

33.La modification du comportement humain suit généralement un processus progressif.

A

B

34.La segmentation consiste à découper un public cible donné en groupes homogènes afin de leur adresser des messages spécifiques et adaptés.

A

B

35.L'information c'est l'ensemble des activités qui ont pour objet la collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles auprès du public

A

B

36.Dans la liste qui suit, reprenez les deux éléments constitutifs de la communication

A. Signal

B. Emetteur

C. receveur

D. Message

37.Identifiez deux éléments du paralangage sur la liste suivante :

A. les mimiques du visage ;

B. l'élocution;

C. la façon de parler

D. la tenue vestimentaire.

38.Indiquez dans la liste deux obstacles liés à l'émetteur dans le processus de communication

- A. le refus du message
- B. la maîtrise du sujet ;
- C. Non-respect des autres ;
- D. Mauvaise attitude ;

39.Indiquez dans la liste deux obstacles liés à l'émetteur dans le processus de communication

- A. reconnaissance du public
- B. Mauvaise diction
- C. Non disponibilité
- D. Trop de patience

40.Obstacles liés au récepteur

- A. Mauvaise perception du message
- B. Défiance
- C. Existence de feed-back
- D. Non disponibilité

41.Obstacles liés au message

- A. Confus et imprécis
- B. Appliqué
- C. reformulé
- Trop long ou trop court etc

42. Avant toute animation, l'animateur doit se poser les questions suivantes pour identifier son public cible :

- A. Quel est son problème ?
- B. Qui suis-je ?
- C. A qui vais-je parler ?

D. Quel nouveau comportement vais-je lui imposer ?

ÉVALUATION N2 PEV (SANTÉ PUBLIQUE) IDE/SF/MT L1 2023

1.3.Les vaccins du PEV sont conservés entre -2°C et 8°C.

A

B

4.Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, la fille de 9 ans séronégative au VIH reçoit :

A-1 dose de HPV

B-2 doses de HPV

C-3 doses de HPV

5.4.La vaccination est une substance administrée à but préventif.

A

B

6..Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, l'enfant reçoit la troisième dose du Penta le même jour que l'unique dose de VPI.

A

B

7.Vous recevez ce jour un enfant présentant des symptômes de SIDA, identifiez parmi les vaccins suivants, ceux qu'il peut recevoir :

A-BCG

B-VPI

C-Penta

D-PCV-13

E-VAA

8.Un vaccin non périmé peut avoir sa PCV non virée.

A

B

9.Dans le calendrier normal de vaccination du PEV ivoirien, la troisième dose de Penta 3 est administrée à l'enfant huit semaines après la première dose de Penta.

A

B

10.Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont des anatoxines

A-BCG

B-VPO

C-VPI

E-RR

F-Rotarix

G-Td

11.Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, la fille de 9 ans séronégative au VIH reçoit une de ses doses de HPV à :

A-9 ans

B-9 ans et 4 mois

C-9 ans et 6 mois

12. Pour un enfant dont le carnet est perdu, sa série de vaccination interrompue ne sera pas recommencée lorsque sa mère est capable de mentionner le dernier vaccin qu'il a reçu.

A

B

13. Le BCG a pour voie d'injection la face externe du haut du bras ou épaule gauche.

A

B

14. L'OMS a recommandé la mise en place des programmes de vaccination en 1974.

A

B

15. Le réfrigérateur doit être toujours installé sur un support d'au moins 5 mm.

A

B

16. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles dont la prévention est assurée par le Penta :

A-la diphtérie

B-l'hépatite C

C-le polyomyélite de type B

D-la rougeole

E-la rubéole

F-le tétanos

17. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont bactériens.

A-BCG

B-VPO

C-VPI

D-VAA

E-RR

F-Rotarix

G-Td

18.Le serum est une substance qui est administrée à but curatif.

A

B

19.Un vaccin est une action de prévention des maladies.

A

B

20.Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, l'enfant reçoit sa troisième dose de VPO avant l'âge 13 semaines.

A

B

21..Dans les associations successives de vaccins, il est obligatoire d'administrer tous les antigènes de l'association le même jour.

A

B

22..Parmi les raisons suivantes, identifier celles qui peuvent expliquer le nombre élevé de cas de maladies évitables par la vaccination.

A.abandon des soins curatifs au profit de la vaccination

B.mauvais accueil dans les centres de vaccination

- C.longue attentes dans les centres de vaccination
- D.compétence du personnel soignant
- E.bonne conservation des vaccins
- F.ruptions peu fréquentes des stocks de vaccins

23.Le maintien de la chaine du froid est important dans le cadre des activités de vaccination car:

- A-les vaccins supportent l'excès de chaleur ou de froid
- B-l'altération des vaccins est réversible
- C-les effets successifs des altérations s'additionnent.

24.La PCV signifie Pastille de Conservation des Vaccins.

- A
- B

25.Une MAPI est un incident qui survient avant un acte vaccinal.

- A
- B

26.Vous recevez ce jour un enfant présentant des symptômes de SIDA, il peut recevoir dans son calendrier :

- A-1 dose de RR
- B-2 doses de RR
- C-1 dose de BCG
- D-1 dose de VAA
- E-3 doses de Penta
- F-2 doses de Rota

27. Parmi ces maladies, indiquez celles qui ne sont pas des cibles du PEV ivoirien

A- la tuberculose osseuse

B- la poliomyélite

C- l'hépatite c

D- la fièvre jaune

E- la rougeole

F- le cancer du corps de l'utérus

28. On parle de rupture de la chaîne du froid lorsque la température du réfrigérateur est :

A- supérieure à 8°C

B- supérieure à 2°C

C- inférieure à 8°C

D- inférieure à 2°C

E- comprise entre 2°C et 8°C

F- inférieure à -2°C

G- inférieure à -8°C

29. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles dont les vaccins sont vivants atténués.

A- Tétanos

B- Tuberculose

C- Fièvre jaune

D- Rougeole

E- diphtérie

30. Vous recevez ce jour en séance de vaccination, un enfant de 11 mois qui n'a reçu aucun vaccin depuis sa naissance. Quel (s) vaccin (s) doit-il recevoir en priorité ?

A- RR

B-Penta

C-BCG

D-VPO

E-Hep B

31. Le vaccin polio inactivé peut être injecté en intramusculaire au niveau de la cuisse ou dans la fesse.

A

B

32. Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, la femme enceinte reçoit sa 4^e dose de Td, 1 an après le Td3.

A

B

33. Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, l'enfant reçoit les deux doses de Rotarix avant l'âge de 10 semaines.

A

B

34. Le réfrigérateur doit être dégivré lorsque la couche de glace atteint 5 mm.

A

B

35. Dans les associations combinées de vaccins, les antigènes peuvent être administrés pendant des jours différents à condition de respecter un intervalle de 4 semaines entre les doses.

A

B

36.MAPI signifie, Manifestation post immunisation.

A

B

37..Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux qui sont viraux.

A-BCG

B-VPO

C-VPI

D-VAA

E-RR

F-Rotarix

G-Td

38.Voici une liste de quantité de dose de Td et des durées de protection de la femme enceinte.

a-2 doses

b-3 doses

c-5 doses

d- 6 doses

α -Aucune protection

β -3 ans de protection

μ -5 ans de protection

π -10 ans de protection

Ω -15 ans de protection

γ -protection à vie

Identifier les bonnes combinaisons entre les nombres de doses de Td et les durées de protection de la femme enceinte.

A (d, π)

B (a, β)

C (b, β)

D (b, μ)

E (a, α)

F (c, γ)

39. La dose de vaccin antihépatite B est administrée au nouveau-né à raison de 0,05 cl.

A

B

40. Parmi les vaccins suivants, identifiez ceux qui ne doivent pas être congelés :

A- VPI

B- Penta

C- ROTARIX

D- PCV13

E- RR

F- VAA

G- Td

41. En cas d'oubli de l'administration d'un vaccin dans une association vaccinale successive, celui-ci doit être administré au moins :

A- 2 semaines après les autres vaccins administrés

B- 4 semaines après les autres vaccins administrés

C- 6 semaines après les autres vaccins administrés

42. Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, la fille de 9 ans séropositive au VIH reçoit une de ses doses de HPV à :

A- 9 ans

B- 9 ans et 1 mois

C- 9 ans et 2 mois

D- 9 ans et 4 mois

E- 9 ans et 6 mois

43..La PCV normal est composée d'un carré bleu dans un cercle blanc.

A

B

44.Dans le calendrier normal de vaccination du PEV ivoirien, l'enfant reçoit la quatrième dose de VPO le même jour que la troisième dose de Penta.

A

B

45.Voici une liste de matériels et leurs rôles

1-Matériels qui produisent le froid

2-Matériels de monitoring de la chaîne du froid

3-Matériels de conservation du froid

a- le porte-vaccin

b- le thermomètre

c- la PCV

d-l'accumulateur

e-la chambre froide

f-le coussinet en mousse

g-le congélateur

h-la fiche de température du réfrigérateur

Identifier les bonnes combinaisons entre les matériels et leurs causes rôles respectifs

A (1,e,g)

B (1,c,e,h)

C(2,b,c,h)

D(3,a,d,f,)

E (3,a,c,e,f)

F(1,b,e,h,)

46.La vaccination induit souvent une immunité générale vis-à-vis des maladies.

A

B

47.La dose de BCG à administrer au nouveau-né est de 0,05 cc .

A

B

48.Le réfrigérateur doit être toujours installé à une distance de 15 à 30 m du mur.

A

B

49.Voici une liste de MAPI et des causes

1-Insuffisance d'asepsie

2- erreur de conservation des vaccins

3-réaction de l'organisme vis-à-vis du vaccin

a- fièvre légère

b- abcès froid

c- abcès chaud

d-malaise

e-prurits

f-éruptions cutanées

g-vomissements

h-diarrhées

Identifier les bonnes combinaisons entre les MAPI et leurs causes respectives

A (1,c)

B (1,c,e,h)

C(2,b)

D(3,a,d,e,f,g,h)

E (3,a,c,e,f)

F(1,b,e,h,f)

50. Le programme élargi de vaccination de la Côte d'Ivoire a été mis en place en 1978.

A

B

51. Le bacille de Calmette et Guérin est un vaccin viral vivant.

A

B

52. Dans le calendrier normal du PEV ivoirien, la femme enceinte reçoit sa 3^e dose de Td :

A- 6 mois après le Td 2

B- 7 mois après le Td1

C- 1 mois après le Td1

ÉVALUATION DE NUTRITION N1 IDE/SF/MT L1 2023

3. Décongeler les aliments surgelés à température ambiante est une pratique d'hygiène alimentaire. : **Vrai**

4. Conserver la nourriture dans des récipients ouverts est une mesure d'hygiène alimentaire. : **Faux**

5. Décongeler les aliments surgelés au réfrigérateur ou au four à micro-onde est une pratique d'hygiène alimentaire. : **Faux**

6. Faire bouillir les soupes et les ragouts jusqu'à au moins 50°C est une pratique d'hygiène alimentaire. : **Faux**

7.L'alimentation est une réaction métabolique. : **Faux**

8.L'arachide est un aliment énergétique. : **Faux, plutôt l'huile d'arachide**

9.L'igname est un aliment énergétique. : **Faux, plutôt de production**

10.L'œuf est un aliment de protection : **Faux, plutôt de construction**

11.L'œuf et l'huile de soja sont des aliments de construction. : **Faux, pas l'huile de soja mais le soja**

12.L'orange est un aliment énergétique. : **Faux, plutôt de production**

13.La fièvre typhoïde et le marasme sont des maladies liées à un déficit de nutriments. : **Faux, plutôt la kwashiorkor et le marasme**

14.Le kwashiorkor est une maladie liée à la carence alimentaire. : **Vrai**

15.La mangue est un aliment de construction. : **Faux, plutôt de protection**

16.La nutrition est l'action d'introduire les aliments dans l'organisme par la bouche. : **Faux**

17.La viande est un aliment énergétique. : **Faux, plutôt de construction**

18. La volaille et l'orange sont des aliments de protection. : **Faux**

19.Laisser les aliments cuits plus de deux heures à la température ambiante est une et pratique d'hygiène alimentaire. : **Faux**

20. Le Kwashiorkor et le marasme sont dues à un excès de nutriments donc ce sont des maladies protéino-énergétiques : **Faux**

21. Le diabète et l'obésité sont des maladies dues à un déficit alimentaire. : **Faux, plutôt par excès alimentaire**

22. La fièvre typhoïde est la seule maladie due au manque d'hygiène alimentaire. : **Faux, il y a aussi le choléra...**

23. L'action involontaire d'introduire les aliments dans l'organisme par la bouche est une alimentation. : **Faux, plutôt volontaire**

24. La calorie est la mesure de la valeur énergétique des aliments. : **Faux, plutôt l'unité de mesure**

25. La sécurité alimentaire en elle seule garantit à coup sûr les besoins nutritionnels des populations. : **Vrai**

26. La nutrition est un ensemble de réactions métaboliques par lesquelles l'organisme transforme et utilise les nutriments pour son bon fonctionnement et pour se maintenir en vie. : **Faux, plutôt transforme et utilise les aliments**

27. Le nutriment est une substance chimique provenant de la transformation de l'aliment dans l'organisme. **Vrai**

28. Dans la pyramide sanitaire, le lait et les céréales ne sont pas consommés même rythme. : **Faux, plutôt la pyramide alimentaire**

29. Dans la pyramide sanitaire, il est conseillé de consommer la viande, le poisson ou l'œuf plus d'une fois par jour. : **Faux**

30. Parmi ces éléments, cochez ceux qui ne sont pas dans les cinq clés pour une alimentation sûre.

A- Séparer les aliments crus des aliments cuits

B- **Conservez la nourriture dans récipients couverts et propres**

C- **Faites bien réchauffer les aliments déjà cuits (faire bouillir ou chauffer jusqu'à une température très élevée)**

D- Utiliser de l'eau propre et des aliments frais

31. Le nombre de fruits et légumes qu'il est recommandé de consommer par jour peut-être

A- 7

B- 3

C- 6

D- 4

E- 5

32. Dans la liste ci-dessous, cochez 03 règles clés pour une alimentation sûre.

A- **Faire bien cuire les aliments**

B- **Prenez l'habitude de la propreté**

C- Lavez les fruits et les légumes dans de l'eau propre

D- Conservez la nourriture dans des récipients couverts

E- Utilisez de l'eau fraîche et des aliments propres

F- **Garder la nourriture à température sûre.**

33. Parmi les aliments ci-dessus, cochez les grands groupes

A- Féculents

B- **Aliments énergétiques**

C- Matières grasses

D- **Aliments de construction**

E- Fruits

F- Aliments de protection

34. Parmi les aliments ci-dessus, cochez ceux qui sont des aliments énergétiques

A- Arachide " huile "

B- Mangue 🍌

C- Banane 🍌

D- Viande

35. Dans la liste ci-après, cochez les aliments de construction

A- Mandarine 🍊

B- Orange

C- Plantain

D- Manioc

E- **Soja**

F- **Viande**

36. Parmi les aliments ci-dessus, cochez les aliments de protection

A- Mangue 🍌

B- Poisson 🐟

C- Taro

D- Épinard

37. Parmi les aliments suivants indiquez ceux qui sont des céréales

A- Igname

B- **Blé**

C- Arachide

D- **Sorgho**

E- **Maïs**

F-Taro

G-Soja

38.Parmi les aliments suivants indiquez ceux qui sont des tubercules

A-**Igname**

B-Mil

C-Arachide

D-**Manioc**

E-Maïs

F-**Taro**

G-Soja

39.Parmi les aliments suivants indiquez ceux qui sont des matières grasses

A-Mil

B- **Arachide " huile "**

C-Manioc

D-Maïs

E-Taro

F-**Soja "huile "**

40.Parmi les aliments suivants indiquez ceux qui sont des aliments énergétiques

A-Les protéines d'origine

B-**Les céréales**

C-Les produits d'origine animale

D-**Les tubercules**

E- Les légumes

G- Les fruits

41. Parmi les aliments suivants indiquez ceux qui sont des aliments de construction

A- **Les protéines d'origine végétale**

B- Les céréales

C- **Les produits d'origine animale**

D- Les tubercules

E- Les légumes

F- Les fruits

42. Parmi les aliments suivants indiquez ceux qui sont des aliments de protection

A- Les protéines d'origine végétale

B- **Les légumes**

C- Les céréales

D- Les produits d'origine animale

E- **Les fruits**

F- Les tubercules

43. Parmi les maladies suivantes indiquez celles qui sont d'origine alimentaire.

A- La fièvre typhoïde

B- **Le kwashiorkor**

C- Le Choléra

D- **L'obésité**

44. Parmi les maladies suivantes indiquez celles qui sont dues à un manque d'hygiène alimentaire.

A- **La fièvre typhoïde**

B- Le marasme

C- **Le Choléra**

D- L'obésité

45. Parmi les maladies suivantes indiquez celles qui sont dues à une carence alimentaire.

A- Le diabète

B- **Le marasme**

C- Le Choléra

D- L'obésité

E- **Le kwashiorkor**

46. Parmi les maladies suivantes indiquez celles qui sont dues à un excès alimentaire.

A- **Le diabète**

B- Le kwashiorkor

C- La fièvre typhoïde

D- **L'obésité**

E- Le marasme



EVALUATION VIH/sida LICENCE II IDE/SF DU 29/6/2022

Consignes de composition

Entoure la ou les lettre(s) correspondant à la bonne réponse

- 1- **Pénalité QCD** ; Réponse fausse = -1 ; sans réponse = 0 ; réponse juste = 1
- 2- **Pénalité QCM** : Réponse fausse = 0 ; sans réponse = 0 ; réponse juste = 1
- 3- Aucun document, ni ordinateur, ni téléphone n'est autorisé

CAS CLINIQUE I :

Dame XXL est reçue à la maternité ce matin pour sa deuxième CPN. Elle est dépistée positive au VIH et mise sous ARV par la sage-femme.

Elle pose des questions à la sage-femme relativement à son état de santé, à son suivi et au suivi de son enfant en ces termes :

- Quel sera l'état de santé de mon bébé après l'accouchement ?
- Vous avez parlé de l'observance au traitement ARV toute à l'heure. Quels sont ses avantages et inconvénients ?
- Je souhaiterais accoucher à Abidjan auprès de ma mère. Qui me suivra là-bas ?
- J'ai entendu parler de « File Active » et de « perdus de vue ». Qu'est-ce que c'est ?

Aidez la sage-femme à répondre à la préoccupation de Dame XXL.

QUESTIONS

- 1- Identifiez parmi les protocoles suivants, ceux qui peuvent être prescrits en première ligne à Dame XXL
 - A- TDF + 3TC +DTG
 - B- TDF + 3TC + EFV
 - C- TDF + 3TC + LPV/rit
 - D- ABC + 3TC + EFV
- 2- A la naissance, le bébé de XXL est:

- A- un enfant exposé avec un haut risque de transmission du VIH.
 - B- un enfant exposé avec un faible risque de transmission du VIH.**
 - C- Un enfant non exposé.
- 3- Parmi les examens ci-dessous, un ne fait pas partie du bilan initial de XXL, lequel ?
- A- NFS
 - B- Radiographie pulmonaire
 - C- Numération CD4
 - D- Charge Virale**
- 4- Identifiez parmi les protocoles suivants, celui qui sera prescrit en première ligne au bébé à la naissance si XXL est de statut VIH1.
- A- NVP**
 - B- AZT
 - C- NVP + AZT
- 5- La durée de ce traitement prophylactique est:
- A- 4 semaines
 - B- 6 semaines**
 - C- 8 semaines
- 6- Le seuil de bonne observance pour le TARV se situe entre
- A- 90-95% pour une réponse optimale**
 - B- 75-80% pour une réponse optimale
 - C- 50-75% pour une réponse optimale
- 7- Les éléments ci-dessous représentent les avantages de l'observance au TARV sauf un, lequel ?
- A- Amélioration de l'état de santé.
 - B- Amélioration de l'espérance de vie.
 - C- Amélioration de la qualité de vie.
 - D- Charge virale au-dessus de 1000 copies/ml**
- 8- Ces critères ci-dessous sont ceux de l'éligibilité à la File Active sauf un, lequel ?
- A- Les patients en retour dans les soins
 - B- Les perdus de vue**
 - C- Patients en retard de traitement
 - D- Tous les patients qui ont nouvellement commencé (initié) le traitement ARV dans la période de rapportage (Nouvelles inclusions)
- 9- Un patient sous ARV est « dit perdu de vue » lorsqu'il manque son rendez-vous
- A- 28 jours après le dernier rendez-vous**
 - B- 90 jours après le dernier rendez-vous
 - C- 45 jours après le dernier rendez-vous

10- Parmi les besoins fondamentaux de Virginia Henderson ci-dessous lesquels sont non satisfaits chez Dame XXL ?

- A- Eviter les dangers**
- B- Communiquer avec son semblable
- C- Apprendre**
- D- S'occuper afin d'être utile

QCM

11- Le concept de la double protection est utilisé pour se protéger

- A- Contre les IST et le VIH
- B- Contre les grossesses à risque et les IST/VIH/Sida
- C- Contre les grossesses non désirées et les IST
- D- Contre les grossesses non désirées et les IST/ VIH/Sida**

Q12 Chez l'enfant exposé, lorsque la première PCR est positive :

- A. Il est impératif de la confirmer avec une deuxième PCR avant d'initier un quelconque traitement ARV.
- B. Il est impératif d'initier le traitement ARV et de la confirmer avec une deuxième PCR.**
- C. L'enfant est définitivement déclaré positif au VIH.
- D. L'enfant est systématiquement mis sous ARV sans refaire une deuxième PCR de confirmation.

Q13 Parmi les propositions suivantes une répond au principe de base du TARV, laquelle ?

- A. Réduire la réplication virale dans le temps.
- B. Réduire le nombre de nouvelles contaminations.
- C. Repousser la résistance virale dans le temps.**
- D. Améliorer la qualité de vie du patient.

Q14 Parmi les rétrovirus suivants, le VIH1 et le VIH2 appartiennent à quels groupes ?

- A. Lentivirus
- B. Oncovirus
- C. Spumavirus

Q15 Deux de ces examens ci-après ne font pas partie du bilan initial de la mère. Coche-les

- A- NFS
- B- UREE
- C- GLYCEMIE
- D- RADIOPULMONAIRE
- E- Groupe Rhésus**
- F- Charge Virale**

Q16 Les gestes d'urgence en cas d'AES consistent à

- A- Faire saigner la blessure
- B- Laisser saigner**

C- Stopper le soin en cours

D- Nettoyer la blessure avec de l'alcool à 90°

E- Faire un pansement compressif à la Bétadine jaune

Q17 Le traitement post-exposition est

A- TDF+3TC+DTG dans les 72 h suivant l'exposition et pendant 28 jours

B- TDF+3TC+EFV dans les 72 h suivant l'exposition et pendant 28 jours

C- AZT+3TC+LPV/r dans les 72 h suivant l'exposition et pendant 6 semaines

D- NVP 2mg/Kg dans les 72 h suivant l'exposition et pendant 6 semaines

Q18 L'algorithme du test en vigueur en Côte d'Ivoire est :

A. En parallèle

B. En série

C. En parallèle et en série

Q19 Le temps de lecture pour un test de Détermine sur sang total au bout du doigt est :

A. 5 min

B. 10 min

C. 15 min

D. 20 min

Q20 Le temps de lecture pour un test de STAT PAK sur sang total au bout du doigt est :

A. 5 min

B. 10 min

C. 15 min

D. 20 min

Q21 Le traitement ARV a pour but de :

A- Préparer le patient au traitement

B- Utiliser les 5 principes fondamentaux (5 A)

C- Associer au moins trois médicaments appartenant à au moins deux classes thérapeutiques

D- Améliorer la qualité de vie des PVVIH

Q22 Toute femme enceinte ou allaitante dépistée positive au VIH doit bénéficier d'un TARV :

A. Jusqu'à l'arrêt de l'allaitement pour sa propre santé et pour prévenir la TME du VIH.

B. Jusqu'à l'arrêt de l'allaitement pour prévenir la TME du VIH uniquement.

C. A vie pour sa propre santé et pour prévenir la TME du VIH.

D. A vie pour prévenir la TME du VIH uniquement.

Q23 Le traitement ARV de la femme enceinte ou allaitante dépistée positive au VIH 1 est une trithérapie composée de :

A. Ténofovir (TDF) et Zidovudine (AZT) et Néviperapine(NVP) sous forme d'un comprimé combiné à dose fixe.

B. Ténofovir (TDF)+ Lamivudine (3TC) + Dolutegravir (DTG)

- C. Abacavir (ABC) et Lamivudine (3TC) et Efavirenz (EFV) sous forme d'un comprimé combiné à dose fixe.
- D. Ténofovir (TDF) + Lamivudine (3TC) +Lopinavir/ritonavir(LPV/r)

Q24 La femme enceinte séropositive est mise sous Cotrimoxazole :

- A. Au 2^{ème} trimestre de sa grossesse concomitamment avec un traitement préventif antipalustre
- B. Au 2^{ème} trimestre de sa grossesse en remplacement d'un éventuel traitement préventif antipalustre**
- C. Au 3^{ème} trimestre de sa grossesse concomitamment avec un traitement préventif antipalustre
- D. Au 3^{ème} trimestre de sa grossesse en remplacement d'un éventuel traitement préventif antipalustre

Q25 Choisissez la bonne réponse

- A. Tous les enfants de moins de 10 ans séropositifs au VIH sont éligibles au TARV sauf ceux dont le nombre de CD4 est supérieur à 750 cell/mm³
- B. Tous les enfants séropositifs au VIH sont éligibles au TARV.**
- C. Tous les enfants de plus de 10 ans séropositifs au VIH sont éligibles au TARV sauf ceux dont le nombre de CD4 est supérieur à 750 cell/mm³
- D. Tous les enfants de plus de 10 ans séropositifs au VIH en bonne santé ne sont pas éligibles au TARV.

Q26 La charge virale (CV) doit être faite :

- A. Le 6^{ème} et 12^{ème} mois après la mise sous traitement ARV pour la première année, puis 1 fois/ans les années suivantes chez les PVVIH adultes et adolescents.**
- B. Le 6^{ème} et 12^{ème} mois après le dépistage VIH positif la première année, puis 1 fois/ans les années suivantes chez les PVVIH adultes et adolescents.
- C. 12 mois après la mise sous traitement ARV chez les PVVIH adultes et adolescent.
- D. 6 mois après le dépistage VIH positif la première année, puis 1 fois/ans les années suivantes chez les PVVIH adultes et adolescents.

Q27 L'échec viral est défini par :

- A. Une CV supérieure à 1000 copies/ml après 3 mois de traitement ARV bien suivi et persistant 6 mois après le renforcement de l'observance au traitement.
- B. Une CV inférieure à 1000 copies/ml après 6 mois de traitement ARV bien suivi et persistant 3 mois après le renforcement de l'observance au traitement.
- C. Une CV inférieure à 1000 copies/ml après 3 mois de traitement ARV bien suivi et persistant 6 mois après le renforcement de l'observance au traitement.
- D. Une CV supérieure à 1000 copies/ml après 6 mois de traitement ARV bien suivi et persistant 3 mois après le renforcement de l'observance au traitement.**

Q28 Lorsqu'il y a apparition d'un syndrome de reconstitution immunitaire il faut :

- A- Réajuster le traitement en cours
- B- Continuer le protocole en cours**
- C- Arrêter le traitement en cours
- D- Prendre en charge la pathologie sous-jacente

Q29 Un de ces critères ci-après ne fait pas partie des critères lorsque l'enfant exposé est dit à faible risque de transmission du VIH. Lequel ?

- A- La mère a une CV inférieure 1000 copies/ml au 3 trimestre de la grossesse
- B- La mère n'a pas choisi l'option d'allaiter son enfant
- C- La mère est sous ARV au moins 4 semaines avant l'allaitement.
- D- La mère n'a pas bénéficié du TARV au cours de la grossesse.**

Q30 Le TARV doit être initié Chez un patient co-infecté (VIH+Tuberculose),:

- A. Une semaine après l'initiation du traitement antituberculeux
- B. Deux semaines après l'initiation du traitement antituberculeux**
- C. Trois semaines après l'initiation du traitement antituberculeux
- D. Attendre la guérison du patient avant d'initier le TARV

Q31 Le patient sous TARV doit être référé si :

- A. Le taux d'Hb est inférieur à 9g/dl
- B. Le taux d'Hb est inférieur à 8g/dl**
- C. Le taux d'Hb est inférieur à 9.5g/dl
- D. Le taux d'Hb est inférieur à 8.5g/dl

Q32 L'échelle de gravité (des effets indésirables) de l'OMS comporte :

- A. Cinq grades**
- B. Six grades
- C. Trois grades
- D. Quatre grades

Q33 Une PVVIH est dite naïve :

- A. Lorsqu'elle ne connaît pas son statut sérologique
- B. Lorsqu'elle n'a jamais eu de contact avec les ARV**
- C. Lorsqu'elle est sous traitement ARV et ignore les voies de contamination
- D. Lorsqu'elle n'a aucune notion sur le VIH/sida

Q34 L'enfant exposé est mis sous traitement prophylactique :

- A. Au cours des 72heures qui suivent l'accouchement**
- B. Au cours de la période néonatale.
- C. Avant les 72heures qui suivent l'accouchement
- D. Avant les premières tétées

Q35 Il est important devant toute IST de penser à une co infection avec le VIH **A**

Q36 La solution chlorée (eau de javel) diluée à 0.5% est une méthode pour détruire le virus du VIH **A**

Q37 Le sororat est un déterminant de la propagation du VIH **A**

Q38 L'inconscience est un déterminant de la propagation du VIH chez les jeunes **A**

Q39 La primo infection dure en moyenne 12 semaines **A**

Q40 Toute grossesse au cours du dernier stade de la maladie à VIH est proscrite. **A**

Q41 Le virus du VIH peut résister dans du sang en dessiccation entre 3 et 7 jours **A**

Q42 Le VIH 2 sévit le plus en Afrique de l'Ouest **A**

Q43 La gonococcie est une cause fréquente de l'écoulement urétral **A**

Q44 L'annonce vise à interrompre la chaîne de transmission des IST **A**

Q45 L'enfant exposé au VIH sera dépisté systématiquement et obligatoirement à 6 semaines de vie grâce à la réalisation de la PCR. **A**

Q46 Le taux de CD4 chez un patient infecté par le VIH est proportionnel à la charge virale de ce patient **B**

Q47 Le seuil de bonne observance pour le TARV se situe au-dessus de 90%, voire de 95% pour une réponse optimale. **A**

Q48 Un patient sous traitement ARV est dit « stable » s'il ne présente pas d'affection opportuniste exclusivement **B**

Q49 Il faut donner obligatoirement le TARV à une PVVIH en bonne santé **A**

Q50 L'enzyme, la Transcriptase inverse transforme ARN du virus en ADN pour se reproduire **A**