

10:24

PRÉPA D.E MÉDECINE – AUXILIAIRE DE SANTÉ

Niveau: 2ieme année Auxiliaire de santé Composé par ARIEL AVIEL

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collecte pas automatiquement vos détails, tels que le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous le fournissez vous-même.

Obligatoire

1.Antenne

2.24. Dans la surveillance infirmière du malade hospitalisé, la détermination du débit opérationnel de la perfusion s'obtient par le calcul :

(1 point)

A. Volume de soluté estimé en gouttes ÷ temps en minutes.

B. Volume de soluté estimé en millilitres × temps en heures.

C. Volume de soluté estimé en gouttes × temps en minutes.

D. Volume de soluté estimé en millilitres ÷ temps en minutes.

3.4. L'amélioration des conditions de vie fait partie des mesures préventives de la tuberculose.

(1 point)

Vrai

Faux

4.21. Associer chaque paramètre vital à son type de représentation sur la feuille de température. Paramètres vitaux :a) Température b) Diurèse c) Pouls d) Tension artérielle e) Fréquence Respiratoire
représentations :

1)Histogramme hachuré en Rouge2) courbe en vert 3)Courbe en bleu 4)Histogramme coloré en jaune 5)Courbe en rouge

(1 point)

- A. (a-1) (b-2) (c-3) (d-4) (e-5)
- B. (a-2) (b-3) (c-4) (d-5) (e-1)
- C. (a-4) (b-5) (c-2) (d-3) (e-1)
- D. (a-3) (b-4) (c-5) (d-1) (e-2)

5.7. La coqueluche est une toxi-infection contagieuse.

(1 point)

Vrai

Faux

6.1. La thermorégulation est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent le maintien constant de la température de l'homme.

(1 point)

Vrai

Faux

7.25. Parmi les propositions suivantes, indiquez les deux types d'hémorragies non observés pendant la phase jaune de la fièvre jaune :

(1 point)

Sélectionnez 2 options.

Méléna

Gingivorragies

Hématémèses

Épistaxis

Hémoptyxies

8.35. En tant qu'auxiliaire, quel besoin fondamental selon Virginia Henderson aiderez-vous à satisfaire en priorité chez la mère ?

(1 point)

- A. Éviter le danger.
- B. Apprendre.
- C. S'occuper de manière à se sentir utile.

9.27. Parmi les propositions suivantes, indiquez l'élément concerné par la coproculture.

(1 point)

- A. Le sang
- B. Les selles
- C. Le crachat

10.Groupe/amphi

11.Promotion

12.38. Les soins infirmiers palliatifs au malade visent à :

(1 point)

- A. Atténuer les symptômes d'une maladie sans agir sur la cause.
- B. Atténuer les effets secondaires des produits administrés sans agir sur la cause.
- C. Atténuer les complications d'une maladie sans agir sur la cause.

13.17. L'hypertension artérielle est une élévation de la pression systolique (maxima) au-dessous de 140 mmHg et/ou de la pression diastolique (minima) au-dessous de 95 mmHg.

(1 point)

Faux

Vrai

14.20. La toilette est un ensemble de soins d'hygiène apportés au corps et aux orifices d'une personne, lui procurant confort, bien-être et prévention des infections ainsi que des escarres. Choisir la bonne proposition :

(1 point)

- A. Qu'il a la faculté de maintenir une température corporelle interne constante quelle que soit celle du milieu interne.
- B. Qu'il a la faculté de maintenir une température corporelle interne constante quelle que soit celle du milieu extérieur.
- C. Qu'il a la faculté de maintenir une température corporelle extérieure constante quelle que soit celle du milieu extérieur.

15.39. Dans votre relation d'aide au patient, les soins et interventions visent à : cochez l'intrus.

(1 point)

- A. Diminuer sa peur et son anxiété.
- B. Accorder une attention désintéressée.
- C. Asservir le malade.
- D. Rassurer le client.

16.10. Le pédiluve est un soin contre-indiqué chez le sujet diabétique.

(1 point)

Vrai

Faux

17.12. La pression artérielle permet d'évaluer le travail cardiaque et la résistance des vaisseaux périphériques.

(1 point)

Vrai

Faux

18.16. Une escarre est une lésion cutanée d'origine ischémique, liée à une compression des tissus mous entre les saillies osseuses internes et le plan dur du support sur lequel repose le sujet.

(1 point)

Vrai

Faux

19.29. La période d'incubation de la rage varie en moyenne entre :

(1 point)

A. 30 et 45 jours

B. 10 et 15 jours

C. 07 et 15 jours

20.28. L'un des signes cliniques suivants se rencontre dans l'insuffisance cardiaque gauche.

(1 point)

A. Dyspnée

B. Turgescence des jugulaires

C. Œdème des membres inférieurs

21.33. Pour cet enfant, choisir l'opération permettant de calculer son IMC.

(1 point)

A. $(9,5)^2 \div (0,89)^2$

B. $9,5 \div (0,89)^2$

C. $(9,5)^2 \div 0,89$

D. $9,5 \div 0,89$

22.6. Pendant une perfusion, la chambre à compte-goutte du perfuseur doit être entièrement remplie.

(1 point)

Faux

Vrai

23.22. Associer chaque terme à sa définition. Termes : a) Tachycardie b) Bradycardie c) Arythmie d) Polypnée

Définitions : 1) est l'élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 100 pulsations/min. 2) est la diminution de la fréquence cardiaque en dessous de 60 pulsations/min. 3) Rythme irrégulier. 4) Augmentation de la fréquence respiratoire avec diminution du volume respiratoire.

Propositions :

(1 point)

A. (a-1) (b-2) (c-3) (d-4)

B. (a-2) (b-3) (c-4) (d-1)

C. (a-4) (b-5) (c-2) (d-3)

24.18. Les dispositifs médicaux à haut risque entrant en contact avec le système vasculaire ou les cavités stériles doivent être propres et manipulés à l'aide de gants propres.

(1 point)

Faux

Vrai

25.23. Selon la classification européenne, il existe :

(1 point)

- A. 4 stades dans l'évolution des escarres.
- B. 3 stades dans l'évolution des escarres.
- C. 2 stades dans l'évolution des escarres.
- D. 5 stades dans l'évolution des escarres.

26. Nom et prénom

27.36. Cet enfant atteint de varicelle :

(1 point)

- A. Doit être lavé quotidiennement.
- B. Ne doit pas être lavé pendant la phase des éruptions.
- C. Doit être lavé tous les deux jours.

28.9. La perforation intestinale est une complication redoutable de la fièvre typhoïde.

(1 point)

Vrai

Faux

29.5. L'hypothermie est une diminution de la température corporelle au-dessous de la normale.

(1 point)

Vrai

Faux

30. CAS CLINIQUE Dans votre rôle d'auxiliaire, vous êtes de service au CSU de Tafiré où vous êtes chargé de l'accueil des patients avec la prise des paramètres vitaux. Vous recevez, en compagnie de sa mère sans emploi, l'enfant T.Y, âgé de 10 mois, pour une fièvre éruptive. Aucune trace de

vaccination n'existe dans le carnet Mère/Enfant, ni pour la mère ni pour l'enfant. Les constantes relevées sont : Température : 38,9 °C (voie axillaire) Poids : 9,5 kg Taille : 0,89 m Sexe : Masculin L'examen clinique précise que l'éruption cutanée est une varicelle.

31. Pour faire baisser la fièvre de l'enfant T.Y., vous disposez de l'Aspirine 250 mg pour enfant. L'infirmier devrait-il vous demander de lui donner 1 comprimé ?

(1 point)

Faux

Vrai

31.37. Dans votre rôle d'auxiliaire, vous veillerez à : cochez l'activité usurpée.

(1 point)

A. Installer le malade.

B. Identifier les besoins non satisfaits et exécuter les soins prescrits.

C. Accomplir auprès du malade des tâches de maintien d'hygiène et de confort.

D. Assister le patient en perte d'autonomie durable ou momentanée.

E. Assurer le service des repas.

32.19. Le patient est dit apyrétique lorsque sa température corporelle se situe entre 36,5 °C et 37,5 °C.

(1 point)

Vrai

Faux

33.11. La poliomyélite est une maladie du péril fécal.

(1 point)

Vrai

Faux

34.3. À la phase d'état, la fièvre jaune se caractérise par la phase rouge et la phase jaune.

(1 point)

Vrai

Faux

35.15. La tuberculose est une maladie virale pulmonaire contagieuse.

(1 point)

Faux

Vrai

36.34. En tant qu'auxiliaire, quel besoin fondamental selon Virginia Henderson aiderez-vous à satisfaire en priorité chez l'enfant ?

(1 point)

A. Maintenir la température de l'enfant dans les limites de la normale.

B. Être propre et protéger ses téguments.

C. Manger et boire.

D. Éviter le danger.

37.32. Cocher parmi les propositions suivantes la température à noter pour l'enfant T.Y.

(1 point)

A. 38,4 °C

B. 39,0 °C

C. 38,9 °C

D. 39,4 °C

38.14. La transmission directe de la fièvre typhoïde se fait par l'intermédiaire de l'eau et des aliments souillés.

(1 point)

Faux

Vrai

39.8. La fièvre jaune est transmise par la piqure de moustique dont le plus important se nomme Plasmodium falciparum.

(1 point)

Faux

Vrai

40.26. La poliomyélite est une maladie infectieuse d'origine :

(1 point)

A. Virale

B. Bactérienne

C. Parasitaire

D. Mycosique

41.30. La rage est une maladie infectieuse d'origine :

(1 point)

A. Virale

B. Parasitaire

C. Bactérienne

42.13. La prophylaxie antipalustre chez la femme enceinte se résume à la prise de la Sulfadoxine-Pyriméthamine et à l'utilisation de MILDA.

(1 point)

Vrai

Faux

43.2. La pression artérielle est la force exercée par le flux sanguin sur les parois des veines.

(1 point)

Faux

Vrai

Envoyer

Ne communiquez jamais votre mot de passe. Signaler un abus



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle
Créer mon propre formulaire

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles. | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)