

Nom :

Prénoms :

Date :

Note :

/ 30

Instructions : Pour chaque question, cochez la ou les bonnes réponses. Répondez de manière claire et lisible sans rature.

PARTIE 1 : QCM (CHOISIS LA OU LES BONNES RÉPONSES)
Q1. Les nématodes sont :

- | | |
|---|---|
| ☐ A) Des vers ronds, cylindriques, non segmentés | ☐ B) Des vers plats segmentés |
| ☐ C) Des protozoaires | ☐ D) Des vers qui vivent dans l'intestin |

Q2. Les 3 nématodes les plus fréquents en Côte d'Ivoire sont :

- | | |
|---|---|
| ☐ A) Ascaris, Ankylostome, Oxyure | ☐ B) Taenia, Ascaris, Bilharzie |
| ☐ C) Entamoeba, Giardia, Trichomonas | ☐ D) Ascaris, Ankylostome, Trichocéphale |

Q3. L'ascaridiose se transmet par :

- | | |
|--|--|
| ☐ A) Voie féco-orale : eau, crudités, mains sales | ☐ B) Transcutanée par les pieds nus |
| ☐ C) Piqûre de moustique | ☐ D) Auto-infestation anus-bouche |

Q4. Le cycle de Looss (passage par les poumons) concerne :

- | | |
|---|--|
| ☐ A) Oxyurose uniquement | ☐ B) Ascaridiose, Ankylostomose et Anguillulose |
| ☐ C) Taeniasis | ☐ D) Amibiase |

Q5. Pendant la migration larvaire de l'ascaris dans les poumons, on observe :

- | | |
|--|---|
| ☐ A) Syndrome de Löffler : toux, fièvre, sifflement | ☐ B) Prurit anal nocturne |
| ☐ C) Anémie sévère | ☐ D) Occlusion intestinale |

Q6. L'ankylostomose est appelée maladie des pieds nus car :

- | | |
|---|--|
| ☐ A) Les larves pénètrent la peau des pieds nus dans le sol humide | ☐ B) On l'attrape en mangeant sans se laver les mains |
| ☐ C) Elle se transmet par les chaussures | ☐ D) Elle gratte les pieds |

Q7. Pourquoi l'ankylostomose donne une anémie grave ?

- | | |
|---|--|
| ☐ A) Chaque ver suce 0,2 à 0,5 ml de sang par jour | ☐ B) Le ver mange le fer des aliments |
| ☐ C) Elle provoque des vomissements de sang | ☐ D) Elle détruit la moelle osseuse |

Q8. Le signe majeur qui fait penser à l'oxyurose est :

- | | |
|--|---|
| ☐ A) Prurit anal nocturne intense avec insomnie | ☐ B) Diarrhée glairo-sanglante |
| ☐ C) Ventre ballonné avec vomissement de ver | ☐ D) Pâleur et fatigue |

Q9. L'oxyurose est très contagieuse en collectivité car :

- | | |
|--|--|
| ☐ A) Auto-infestation : enfant se gratte l'anus → œufs sous ongles → bouche | ☐ B) Piqûre de moustique |
| ☐ C) Eau souillée | ☐ D) Viande de porc mal cuite |

Q10. L'examen de référence pour toutes les nématodoses est :

- | | |
|---|---|
| ☐ A) Examen Parasitologique des Selles (EPS) à la recherche d'œufs | ☐ B) Test de Widal |
| ☐ C) Goutte épaisse | ☐ D) Scotch-test pour l'oxyurose seulement |

Q11. Le Scotch-test anal ou test de Graham :

- | | |
|---|--|
| ☐ A) Se fait le matin au réveil avant toilette et avant selles | ☐ B) Se fait après un lavement |
| ☐ C) Recherche les œufs d'oxyure autour de l'anus | ☐ D) Recherche les œufs d'ascaris |

Q12. Une complication grave de l'ascaridiose est :

- | | |
|--|---|
| ☐ A) Occlusion intestinale par pelote de vers | ☐ B) Anémie à 4g/dl |
| ☐ C) Prolapsus rectal | ☐ D) Appendicite, angiocholite |

Q13. Le traitement de première intention des nématodoses en Côte d'Ivoire est :

- | | |
|---|--|
| ☐ A) Albendazole 400 mg prise unique | ☐ B) Paracétamol |
| ☐ C) Mebendazole 500 mg prise unique | ☐ D) Amoxicilline |

Q14. Concernant le traitement :

- | | |
|--|--|
| ☐ A) Il faut traiter toute la famille en même temps pour l'oxyurose | ☐ B) L'albendazole est contre-indiqué au 1er trimestre de grossesse |
| ☐ C) On donne du fer si anémie par ankylostome | ☐ D) Une seule prise suffit toujours sans renouvellement |

Q15. La prévention des nématodoses (WASH) comprend :

- | | |
|--|--|
| ☐ A) Lavage des mains au savon avant de manger et après WC | ☐ B) Porter des chaussures / bottes |
| ☐ C) Laver les crudités, boire eau potable, utiliser latrines | ☐ D) Dormir sous moustiquaire |

PARTIE 2 : QCD (RÉPONDRE PAR VRAI OU FAUX)

Q1. Les nématodes sont des vers ronds, cylindriques et non segmentés.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q2. Le Taenia saginata est une nématodose intestinale.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q3. L'ascaridiose se transmet par voie transcutanée en marchant pieds nus.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q4. Le cycle de Looss signifie que les larves d'Ascaris passent par les poumons avant de devenir adultes dans l'intestin.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q5. Le syndrome de Löffler (toux, fièvre, sifflement) correspond à la phase intestinale de l'ascaridiose.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q6. L'ankylostomose provoque une anémie sévère car chaque ver suce du sang dans l'intestin.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q7. La géophagie (manger de la terre) est un signe évocateur d'ankylostomose chez l'enfant.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q8. Le signe majeur de l'oxyurose est le prurit anal nocturne qui empêche l'enfant de dormir.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q9. L'oxyurose se transmet par piqûre de moustique.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q10. L'examen de référence pour diagnostiquer les nématodoses est l'examen parasitologique des selles (EPS).

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q11. Le Scotch-test anal doit être fait le soir après la toilette.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q12. Une pelote d'Ascaris peut provoquer une occlusion intestinale grave nécessitant une chirurgie.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q13. Pour traiter l'oxyurose, il suffit de traiter seulement l'enfant qui se gratte.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q14. L'Albendazole 400 mg en prise unique est le traitement de première intention des nématodoses en Côte d'Ivoire, mais il est contre-indiqué au 1er trimestre de grossesse.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux

Q15. Porter des chaussures, se laver les mains, laver les crudités et utiliser des latrines permet de prévenir toutes les nématodoses.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux