

Exercice 1 SÉMIOLOGIE CHAPITRE 2 SYMPTÔMES LIÉS À LA FONCTION CARDIO- VASCULAIRE



PROPOSÉ PAR JBK

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collecte pas automatiquement vos détails, tels que le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous le fournissez vous-même.

* Obligatoire

1. La tachycardie se définit comme : (1 point) *

- ☐ Un rythme cardiaque lent
- ☐ Un rythme irrégulier
- ☐ Une absence de pouls
- ☐ Un rythme cardiaque rapide

2. Les caractéristiques de la dyspnée incluent : (1 point) *

- ☐ Température corporelle
- ☐ Tension artérielle
- ☐ Rythme respiratoire (polypnée/bradypnée)
- ☐ Glycémie

3. Devant une syncope, il faut :
(1 point) *

- ☐ Placer en position latérale de sécurité (PLC)
- ☐ Donner de l'eau sucrée
- ☐ Secouer le patient
- ☐ Faire respirer des sels ammoniacés

4. Devant un œdème des membres inférieurs, l'AS doit :
(1 point) *

- ☐ Appliquer de la glace
- ☐ Surélever les jambes
- ☐ Faire un massage vigoureux
- ☐ Donner un diurétique sans ordonnance

5. L'aorte naît : (1 point) *

- ☐ Du ventricule droit
- ☐ Du ventricule gauche
- ☐ De l'oreillette droite
- ☐ De l'oreillette gauche

6. L'hématémèse désigne : (1 point) *

- ☐ Du sang dans les selles
- ☐ Du sang dans les urines
- ☐ Du sang vomi
- ☐ Un saignement de nez

7. La CAT (conduite à tenir) générale devant tout symptôme cardio-vasculaire comprend :
(1 point) *

- ☐ Minimiser les symptômes
- ☐ Prendre les constantes et alerter
- ☐ Donner un traitement sans avis
- ☐ Attendre 24h avant d'agir

8. Les signes précurseurs d'un évanouissement incluent : (1 point) *

- ☐ Rougeur du visage
- ☐ Tremblements des membres supérieurs
- ☐ Douleurs abdominales
- ☐ Pâleur, sueurs, bourdonnements d'oreilles

9. Les cavités cardiaques comprennent : (1 point) *

- ☐ 2 oreillettes et 2 ventricules
- ☐ 1 ventricule et 3 oreillettes
- ☐ 3 ventricules et 1 oreillette
- ☐ 4 ventricules

10. Un garrot est indiqué pour :
(1 point) *

- ☐ Une hémorragie capillaire
- ☐ Une ecchymose
- ☐ Une plaie superficielle
- ☐ Une hémorragie artérielle

11. Le méléna se caractérise par :
(1 point) *

- ☐ Du sang noirâtre digéré dans les selles
- ☐ Du sang dans les expectorations
- ☐ Du sang rouge dans les selles
- ☐ Du sang dans les urines

12. Une dyspnée est :

(1 point) *

- ☐ Une douleur thoracique
- ☐ Une sensation d'étouffement
- ☐ Un gonflement des membres
- ☐ Une perte de connaissance

13. Un œdème cardiaque est généralement :

(1 point) *

- ☐ Dur et douloureux
- ☐ Mou et prenant le godet
- ☐ Chaud et rouge
- ☐ Localisé au visage

14. En cas d'hémorragie externe, le premier geste est : (1 point) *

- ☐ Allonger et comprimer la plaie Donner un antidouleur
- ☐ Faire un massage cardiaque
- ☐ Attendre l'arrêt spontané du saignement

15. Groupe classe

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

16. Un malaise (liothymie) se manifeste par : (1 point) *

- ☐ Pâleur, sueurs, vision floue
- ☐ Rougeur du visage
- ☐ Tremblements des mains
- ☐ Convulsions

17. Le rythme cardiaque normal est de : (1 point) *

- ☐ 50 battements/min
- ☐ 90 battements/min
- ☐ 70 battements/min
- ☐ 110 battements/min

18. Le péricarde est :
(1 point) *

- ☐ La couche musculaire du cœur
- ☐ L'enveloppe du cœur
- ☐ La paroi interne des cavités cardiaques
- ☐ Le septum interventriculaire

19. Devant un état de choc, l'AS doit : (1 point) *

- ☐ Donner à boire
- ☐ Faire marcher le patient
- ☐ Réchauffer, rassurer, prévenir l'infirmier
- ☐ Donner un sédatif

20. Les artères coronaires naissent : (1 point) *

- ☐ De l'aorte près des valvules sigmoïdes
- ☐ De l'artère pulmonaire
- ☐ De la veine cave
- ☐ De l'artère sous-clavière

21. Votre Nom et prénoms en Majuscule

Entrez votre réponse

22. La prise en charge initiale d'une dyspnée comprend :
(1 point) *

- ☐ Allonger strictement
- ☐ Donner à boire chaud
- ☐ Faire des exercices respiratoires
- ☐ Installer en position assise

23. Le système cardio-vasculaire est constitué de :
(1 point) *

- ☐ Cœur et poumon
- ☐ Cœur et vaisseaux (artères et veines)
- ☐ Cerveau et moelle épinière
- ☐ Foie et rate

24. Les trois couches des parois cardiaques sont : (1 point) *

- ☐ Endoderme, mésoderme, ectoderme
- ☐ Myocarde, péricarde, endocarde
- ☐ Cortex, médulla, capsule

☐ Adventice, média, intima

25. La syncope est due principalement à : (1 point) *

☐ Une hyperglycémie

☐ Une infection urinaire

☐ Un traumatisme crânien

☐ Une chute brutale du débit cardiaque

26. La veine cave inférieure draine le sang vers : (1 point) *

☐ L'oreillette gauche

☐ L'oreillette droite

☐ Le ventricule droit

☐ Le ventricule gauche

27. La CAT (conduite à tenir) devant une hémorragie interne comprend :
(1 point) *

☐ Donner à boire abondamment

☐ Faire vomir le patient

☐ Allonger, réchauffer, alerter

☐ Masser l'abdomen

28. Les types de syncope mentionnés sont : coches les intrus
(1 point) *

☐ Syncope orthostatique

☐ Syncope cardiaque

☐ Syncope respiratoire

☐ Syncope vagale

☐ Syncope épileptique

29. Les enveloppes du cœur comprennent : (1 point) *

☐ Myocarde

☐ Épicarde

☐ Péricarde

☐ Plèvre

☐ Endocarde

30. Les fonctions principales du cœur sont :
(1 point) *

☐ Produire des hormones

☐ Pomper le sang

☐ Assurer la circulation sanguine

☐ Oxygéner le sang

☐ Filtrer les déchets

31. La bradycardie correspond à : (1 point) *

☐ Un cœur qui bat très lentement

☐ Un cœur qui bat très vite

☐ Un rythme irrégulier

☐ Une extrasystole

32. La fonction principale du système cardio-vasculaire est :
(1 point) *

- ☐ Distribuer l'oxygène et les nutriments via le sang
- ☐ Produire des hormones
- ☐ Filtrer les déchets urinaires
- ☐ Digérer les aliments

33. La valve tricuspide sépare :
(1 point) *

- ☐ Oreillette gauche et ventricule gauche
- ☐ Ventricule droit et artère pulmonaire
- ☐ Ventricule gauche et aorte
- ☐ Oreillette droite et ventricule droit

34. Les palpitations correspondent à :
(1 point) *

- ☐ Des douleurs musculaires
- ☐ Des troubles de la vision
- ☐ Des acouphènes
- ☐ Des battements cardiaques perçus par le patient

35. Les valvules sigmoïdes empêchent :
(1 point) *

- ☐ Le reflux du sang dans les ventricules
- ☐ Le passage du sang vers les poumons
- ☐ L'écoulement du sang vers les artères
- ☐ Le remplissage des oreillettes

36. La phase de contraction cardiaque s'appelle : (1 point) *

- ☐ Diastole
- ☐ Systole
- ☐ Tachycardie
- ☐ Asystolie

37. Devant des palpitations, l'AS doit :
(1 point) *

- ☐ Prendre les constantes et alerter
- ☐ Donner un bêta-bloquant
- ☐ Faire un massage carotidien
- ☐ Ignorer si le patient est jeune

38. Un œdème cardiaque débute typiquement : (1 point) *

- ☐ Au visage
- ☐ Aux membres inférieurs et chevilles
- ☐ Aux mains
- ☐ À l'abdomen

39. FILIÈRE

- ☐ AS

40. L'état de choc se caractérise par: (1 point) *

- ☐ Pâleur, sueurs froides, soif intense
- ☐ Rougeur cutanée, fièvre

☐ Hypotension artérielle isolée

☐ Tachycardie isolée

41. La rectorragie est : (1 point) *

☐ Du sang digéré dans les selles

☐ Du sang dans les urines

☐ Du sang rouge vif par l'anus

☐ Un saignement gingival

42. La dissociation pouls/température évoque: (1 point) *

☐ Un état de choc

☐ Une crise d'angoisse

☐ Une hypoglycémie

☐ Une infection urinaire

43. Les types d'hémorragie interne incluent :
(1 point) *

☐ Hématémèse

☐ Épistaxis

☐ Méléna

☐ Ecchymose

☐ Rectorragie

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles. | [Protection de la vie privée des consommateurs](#) | [Conditions d'utilisation](#) |

[Accessibilité](#)