

Évaluation des étudiants de l'infas Aboisso

* Obligatoire

Soins infirmiers

5. Les objectifs de la toilette liés à la personne soignée comprennent : (2 points) *

- ☐ Augmenter le risque d'infection nosocomiale
- ☐ Assurer le bien-être physique et moral
- ☐ Garantir une hygiène corporelle
- ☐ Permettre une formation des muscles

6. Le principe général de la toilette concernant l'ordre des soins est de procéder : (2 points) *

- ☐ De bas en haut systématiquement
- ☐ De haut en bas, principe pouvant être modifié selon les besoins
- ☐ Sans ordre particulier
- ☐ Toujours en commençant par les pieds
- ☐ Aucune des réponses

7. Lors de l'installation du patient pour la toilette, il faut : (2 points) *

- ☐ Ignorer ses demandes esthétiques
- ☐ Prévoir la réfection du lit
- ☐ L'installer de façon confortable et sûre
- ☐ Individualiser le matériel utilisé
- ☐ Aucune réponse

8. Une hygiène rigoureuse et adaptée pendant la toilette permet de : (2 points) *

- ☐ Diminuer les infections nosocomiales
- ☐ Augmenter les infections nosocomiales
- ☐ N'avoir aucun effet sur les infections
- ☐ Provoquer systématiquement des escarres
- ☐ Aucune réponse

9. Le soin de toilette doit tenir compte de (2 points) *

- ☐ L'état physique et psychologique de la personne
- ☐ Uniquement de l'avis du soignant
- ☐ Des appareillages éventuels
- ☐ Des prescriptions médicales
- ☐ Aucune des réponses

10. Après la toilette, l'aide-soignant doit : (2 points) *

- ☐ Évaluer et transmettre les éléments significatifs du soin
- ☐ Ne rien noter
- ☐ Quitter la chambre sans ranger le matériel
- ☐ Laisser le lit défait
- ☐ Aucune des réponses

11. Le matériel de toilette doit être : (2 points) *

- ☐ Partagé entre plusieurs patients sans précaution
- ☐ Individualisé et à usage unique quand nécessaire
- ☐ Réutilisé sans désinfection

☐ Jamais vérifié

☐ Aucune des réponses

12. Concernant la prévention des infections nosocomiales pendant la toilette, il faut : (2 points) *

☐ Appliquer les notions d'hygiène de base

☐ Appliquer les précautions standards

☐ Ignorer l'environnement de la personne

☐ Adapter les précautions au risque infectieux

13. Le soin de toilette permet notamment : (2 points) *

☐ Un moment privilégié de relation et d'observation

☐ Une dégradation de la relation soignant-soigné

☐ Une augmentation systématique du stress du patient

☐ Une diminution du confort du patient

14. Pour la toilette génito-anale, les précautions standards imposent : (2 points) *

☐ Le port de gants non stériles à usage unique

☐ Le port de gants stériles obligatoirement

☐ Aucune réponse

☐ Aucune protection des mains

☐ Le port d'un masque uniquement

☐ Toutes les réponses

15. Chez l'homme non circoncis, la technique consiste à : (2 points) *

☐ Rétracter le prépuce puis le replacer dans sa position initiale

- ☐ Ne jamais toucher le prépuce
- ☐ Couper le prépuce
- ☐ Laisser le prépuce rétracté en permanence

16. Le nettoyage du méat urinaire se fait par : (2 points) *

- ☐ Des mouvements circulaires
- ☐ Des mouvements de va-et-vient brusques
- ☐ Un frottement vigoureux
- ☐ Un rinçage à l'alcool

17. L'ordre correct de la toilette du corps est : (2 points) *

- ☐ Visage, membres supérieurs, thorax, abdomen, dos, membres inférieurs, organes génitaux, siège
- ☐ Pieds, jambes, puis visage
- ☐ Dos, puis visage uniquement
- ☐ Organes génitaux en premier
- ☐ Aucune réponse

18. Chez la personne diabétique, les soins des pieds doivent être : (2 points) *

- ☐ Minutieux
- ☐ Non traumatisants pour les ongles
- ☐ Réalisés avec de l'eau très chaude
- ☐ Effectués sans précaution particulière

19. Les zones à insister lors de la toilette en raison de la prolifération microbienne sont : (2 points) *

- ☐ Les oreilles, les coudes, les aisselles

- ☐ Les plis cutanés sous les seins
- ☐ L'ombilic et les pieds
- ☐ Uniquement le visage

20. Avant de commencer tout soin de toilette, les précautions standards imposent de : (2 points) *

- ☐ Se désinfecter les mains
- ☐ Ne rien faire de particulier
- ☐ Porter uniquement un tablier
- ☐ Attendre l'accord du médecin

21. La toilette est définie comme : (2 points) *

- ☐ Un ensemble de soins d'hygiène apportés aux pores et aux orifices d'une personne
- ☐ Un soin réservé uniquement aux malades en fin de vie
- ☐ Un acte médical invasif
- ☐ Une technique de rééducation

22. Les odeurs corporelles proviennent notamment de la sécrétion excessive de sueur par : (2 points) *

- ☐ Les glandes apocrines
- ☐ Les glandes salivaires
- ☐ Le foie
- ☐ Les reins
- ☐ Aucune réponses

23. Pour la grande toilette, le matériel est déposé sur : (2 points) *

- ☐ Un chariot
- ☐ Le sol
- ☐ Le lit du patient voisin
- ☐ Aucun support particulier

24. Pour laver les yeux du patient sans savon, il faut : (2 points) *

- ☐ Utiliser une partie différente du gant pour chaque œil
- ☐ Utiliser la même partie du gant pour les deux yeux
- ☐ Utiliser du savon systématiquement
- ☐ Frotter énergiquement les paupières

25. La toilette de l'abdomen doit accorder une attention particulière : (2 points) *

- ☐ Aux plis abdominaux
- ☐ Aux articulations du genou
- ☐ Rien de spécifique
- ☐ Au nombril
- ☐ Aucune réponse

26. Pour la toilette du dos, le patient est placé en :
(2 points) *

- ☐ Décubitus latéral
- ☐ Décubitus dorsal strict
- ☐ Position debout
- ☐ Position assise stricte

27. Le nettoyage de l'oreille a pour but de débarrasser le conduit auditif : (2 points) *

- ☐ Des poils du nez
- ☐ Des débris épidermiques
- ☐ Du cérumen
- ☐ Rien de particulier

28. Chez l'adulte, pour redresser la courbure du conduit auditif, il faut tirer le pavillon de l'oreille : (2 points) *

- ☐ En arrière et en bas
- ☐ En arrière et en haut
- ☐ Vers l'avant
- ☐ Vers le bas uniquement

29. En cas de sécrétions séchées adhérentes aux parois de l'oreille, le tampon peut être imbibé de : (2 points) *

- ☐ Eau de javel
- ☐ Eau oxygénée
- ☐ Parfum
- ☐ Alcool pur

30. Pour le nez, le soin consiste à : (2 points) *

- ☐ Ne jamais nettoyer le nez
- ☐ Utiliser de l'alcool pur dans les narines
- ☐ Imbiber un morceau de coton d'eau, l'essorer et nettoyer les narines
- ☐ Introduire un coton-tige profondément dans le nez

31. Pour le lavage des dents, le matériel présenté au malade comprend : (2 points) *

- ☐ Un rasoir
- ☐ Une brosse à ongles
- ☐ Un verre d'eau pour la prothèse dentaire
- ☐ Le haricot
- ☐ Aucune réponses

32. Après la coiffure du patient, il faut veiller à : (2 points) *

- ☐ Laisser les cheveux sur les draps
- ☐ Ce qu'il ne reste pas de cheveux sur le malade
- ☐ Ne pas nettoyer le peigne
- ☐ Ne pas refaire le lit

33. À la fin du soin de toilette et de coiffure, l'aide-soignant doit : (2 points) *

- ☐ Réinstaller confortablement le malade
- ☐ Laisser le matériel sale sur le chariot
- ☐ Se laver les mains
- ☐ Ranger le matériel utilisé après l'avoir nettoyé

34. La solution antiseptique utilisée pour l'oreille est instillée : (2 points) *

- ☐ Avant tout nettoyage
- ☐ Après le nettoyage du conduit auditif
- ☐ Elle n'est jamais utilisée
- ☐ Uniquement chez l'enfant

35. Le capiluve est un soin qui permet d'assurer : (2 points) *

- ☐ La propreté des cheveux
- ☐ La propreté du cuir chevelu
- ☐ Le traitement des escarres
- ☐ La prévention des infections urinaires

36. Le capiluve peut se réaliser : (2 points) *

- ☐ Uniquement debout
- ☐ Uniquement en salle d'opération
- ☐ Jamais chez un patient hospitalisé
- ☐ Au lit ou au fauteuil

37. Le capiluve peut être indiqué (2 points) *

- ☐ Uniquement en cas de contre-indication
- ☐ Sur proposition des soignants
- ☐ Pour raison médicale comme un EEG
- ☐ Sur demande du patient

38. Pour l'ergonomie du soignant pendant le capiluve, il faut : (2 points) *

- ☐ Se pencher au maximum sans précaution
- ☐ Ignorer la position du dos
- ☐ Maintenir une position de dos droit
- ☐ S'asseoir sur le lit du patient

39. Avant de mouiller les cheveux, il faut (2 points) *

- ☐ Les démêler
- ☐ Les couper
- ☐ Appliquer directement le shampooing sans préparation
- ☐ Ne rien faire de particulier

40. Après le capiluve, il faut : (2 points) *

- ☐ Laisser les cheveux mouillés sans les sécher
- ☐ Quitter la chambre sans vérifier la satisfaction du patient
- ☐ Respecter la coiffure habituelle du patient
- ☐ Ne jamais donner de miroir au patient

41. Le matériel du capiluve comprend notamment : (2 points) *

- ☐ Un ou deux bocs d'eau
- ☐ Une alèse en caoutchouc et une en tissu
- ☐ Un sèche-cheveux
- ☐ Une pommade pour les pieds

42. Le pédiluve est un soin d'hygiène qui permet d'assurer : (2 points) *

- ☐ La propreté des pieds
- ☐ La propreté des dents
- ☐ La propreté des oreilles
- ☐ Aucune des réponses

43. Une contre-indication au pédiluve est : (2 points) *

- ☐ Une escarre talonnière

- ☐ Une simple fatigue légère du patient sans autre signe
- ☐ Un rhume
- ☐ Une bonne santé générale

44. Pour l'ergonomie du soignant pendant le pédiluve, il faut maintenir : (2 points) *

- ☐ Aucune posture particulière
- ☐ Une position assise sur le sol sans précaution
- ☐ Le dos totalement courbé
- ☐ Un dos droit ou plat

Vous pouvez imprimer une copie de votre réponse après envoi



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)
[Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)