

ÉVALUATION N1 ANATO-PHYSIO ET SEMIO-PATHO DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE IDE/SF L1 2023

CAS 3 : Mme KZ, sans antécédent particulier consulte pour une toux. Il y a deux jours, la maladie a commencé par une rhinite avec des éternuements et des céphalées quelques heures plus tard sont apparues une sèche qui est devenue productive et qui ramenait des crachats muqueux et une petite fièvre non chiffrée. Votre examen physique est normal.

71. Quelle est votre 1^{ère} hypothèse diagnostique ? (1 point) 

- ☐ A. Crise d'asthme
- ☐ B. Bronchite chronique
- ☐ C. Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- ☐ D. Embolie pulmonaire
- ☒ E. Bronchite aiguë
- ☐ F. Pneumopathie aiguë bactérienne

72. Quels sont les agents pathogènes les plus en cause de cette maladie ? (1 point)



- ☐ A. Mycobacterium tuberculosis
- ☐ B. Pneumocoque
- ☒ C. Virus
- ☐ D. Tabac

73. Parmi ces propositions concernant la phase humide de la bronchite aiguë, deux sont justes: lesquelles ? (1 point)

- ☒ A. La toux est productive
- ☐ B. La température est très élevée (39° - 40°)
- ☒ C. L'examen physique est pauvre
- ☐ D. La dyspnée
- ☐ E. La vomique

74. votre prescription comprend : (1 point)

- ☐ A. amoxicilline
- ☐ B. macrolide
- ☐ C. antitussif
- ☒ D. fluidifiant
- ☒ E. vitamine C
- ☒ F. paracétamol

75. vous revoyez Mme KZ deux jours plutard. Elle se plaint de la toux qui ramène des crachats muco-purulents et sa température est à 39°C mais l'examen reste normal. Votre diagnostic le plus probable est :

(1 point) 

- ☐ A. asthme aigue grave
- ☐ B. pneumopathie aigue grave
- ☒ C. surinfection de la bronchite aigue
- ☐ D. rechute de tuberculose

76. injection de tuberculine au cours du test d'IDR à la tuberculine se fait : (1 point)



- ☐ A. face antérieure de la main
- ☐ B. face antérieure du bras
- ☒ C. face antérieure de l'avant-bras

77. Les signes de gravité d'une pneumopathie bactérienne sont (1 point) 

- ☐ A. Fréquence respiratoire >30 cycles/mn
- ☐ B. Trouble de la conscience
- ☐ C. Fréquence cardiaque >125 battements/mn
- ☐ D. Température <35° ou > 40°
- ☒ E. Toutes les propositions sont bonnes

78. Trois (3) propositions sont justes concernant le traitement de la pneumopathie bactérienne sans signe de gravité : lesquelles ?

(1 point)

- ☒ A. Amoxicilline
- ☐ B. Hospitalisation
- ☒ C. Durée du traitement : 8 à 10 jours
- ☐ D. Amoxicilline + macrolides
- ☒ E. Voie orale

79. Cochez les éléments qui traduisent un asthme aigu grave (1 point) 

- ☐ A. Difficulté à tousser
- ☐ B. Une polypnée avec FR>30 cycles/mn
- ☐ C. Une tachycardie
- ☐ D. Un silence auscultatoire
- ☐ E. Une douleur thoracique
- ☒ F. A+B+C+D

80. Laquelle de ces associations est juste concernant le traitement de fond de l'asthme (traitement d'éviction de crise d'asthme) ? (1 point) 

- ☐ A. Bêta-2 agoniste de courte durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés
- ☐ B. ta-2 agoniste de courte durée d'action injectable + corticoïdes inhalés
- ☐ C. Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes injectables
- ☒ D. Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés
- ☐ E. Aucune des propositions

81. Le syndrome d'épanchement pleural liquidien est constitué par : (1 point) 

- ☐ A. Augmentation des vibrations vocales + tympanisme + diminution du murmure vésiculaire
- ☐ B. Abolition des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants
- ☐ C. Augmentation des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants
- ☒ D. Abolition des vibrations vocales + matité + abolition du murmure vésiculaire +
- ☐ E. Aucune de ces propositions

82. La voie habituelle de contamination par le bacille de Koch chez l'homme est la voie : (1 point) 

- ☐ A. Cutanée
- ☐ B. Digestive
- ☒ C. Aérienne
- ☐ D. Placentaire
- ☐ E. Oculaire

83. Quels sont les 2 signes qui ne font pas partie des signes d'imprégnation tuberculeuse ?

(1 point)

- ☐ A. La perte de poids
- ☒ B. La toux chronique
- ☒ C. La fièvre permanente et élevée
- ☐ D. Le manque d'appétit
- ☐ E. Les sueurs nocturnes

84. Le traitement des nouveaux cas de tuberculose repose sur ces médicaments sauf 2 : lesquels ?

(1 point)

- ☐ A. Ethambutol
- ☒ B. Erythromycine
- ☐ C. Rifampicine
- ☐ D. Pirazinamide
- ☐ E. Isoniaside
- ☒ F. Kanamycine

85. Au cours du traitement d'un nouveau cas de tuberculose pulmonaire bacillifère, le contrôle bactériologique des crachats se fait: (1 point) 

- ☐ A. Au 1er, 4eme et 6eme mois de traitement
- ☒ B. Au 2eme, 5eme et 6eme mois de traitement
- ☐ C. Au 2eme, 4eme et 6eme mois de traitement
- ☐ D. Au 5eme et 6eme mois de traitement
- ☐ E. Au 3eme, 5eme et 8eme mois de traitement

86. Parmi ces éléments, Cochez les facteurs constitutionnels de l'embolie pulmonaire
(1 point)

- ☒ A. Anomalie congénitale due à une mutation du facteur V.
- ☐ B. Obésité
- ☐ C. décompensée.
- ☐ D. grands brûlés
- ☐ E. Déficit héréditaire en protéines naturelles anticoagulantes
- ☒ F. protéines C et en protéines S

87. D.f consulte pour une dyspnée. Cette dyspnée semble de plus en plus intense depuis les 5 derniers jours. Elle a également une toux sèche et une douleur à l'hémithorax gauche. Vous suspectez un épanchement pleural : si pleurésie, cochez les signes retrouvés à l'examen physique

(1 point) 

- ☐ A. Augmentation des vibrations vocales + tympanisme + diminution du murmure vésiculaire
- ☐ B. Abolition des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants
- ☐ C. Augmentation des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants
- ☒ D. Abolition des vibrations vocales + matité + abolition du murmure vésiculaire
- ☐ E. Aucune des propositions

88. Toutes ces propositions concernant les signes respiratoires de gravité de la crise d'asthme sont justes sauf 2 : lesquelles ?

(1 point)

- ☐ A. Difficulté à tousser
- ☐ B. Une polypnée avec FR>30 cycles/mn
- ☒ C. Une tachycardie
- ☐ D. Un silence auscultatoire
- ☒ E. Une douleur thoracique

89. Laquelle de ces associations est juste concernant le traitement de fond de l'asthme ?

(1 point) 

- ☐ A. Bêta-2 agoniste de courte durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés
- ☐ B. Bêta-2 agoniste de courte durée d'action injectable + corticoïdes inhalés
- ☐ C. Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes injectables
- ☒ D. Bêta-2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés
- ☐ E. Aucune des propositions

90. Toutes ces propositions concernant les signes de gravité d'un épanchement pleural sont justes sauf 2 : lesquelles ? (1 point)

- ☐ A. La présence de signes de lutte respiratoire
- ☒ B. La toux
- ☐ C. La tachycardie
- ☒ D. La douleur thoracique
- ☐ E. Les extrémités froides

91. L'épanchement d'air dans la cavité pleurale est appelé : (1 point) 

- ☐ A. hémithorax
- ☐ B. hydro pneumothorax
- ☐ C. empyème
- ☐ D. pyopneumothorax
- ☒ E. Le pneumothorax

Vous pouvez imprimer une copie de votre réponse après envoi



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles. | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)