

ÉVALUATION : 50 QUESTIONS VRAI / FAUX

Module : Parasitologie (Nématodoses, Cestodoses, Paludisme) & Les Brûlures

Nom & Prénom : _____

Date : ____ / ____ / 2026

Note : ____ / 50

Instructions : Cochez la case [V] pour Vrai ou [F] pour Faux pour chaque affirmation.

1. Brûlures & Prise en charge initiale

- | | |
|---|---|
| 1. Une brûlure du deuxième degré profond détruit partiellement la membrane basale. | ☐ V ☐ F |
| 2. Les brûlures du deuxième degré profond guérissent spontanément en moins de 10 jours. | ☐ V ☐ F |
| 3. Les brûlures du deuxième degré profond sont très douloureuses (++++). | ☐ V ☐ F |
| 4. Une brûlure du troisième degré atteint l'épiderme, le derme et l'hypoderme. | ☐ V ☐ F |
| 5. Dans les brûlures du 3ème degré, la formation d'escarres s'accompagne d'une insensibilité locale. | ☐ V ☐ F |
| 6. La surface corporelle brûlée (SCB), la localisation et la profondeur sont les facteurs de gravité d'une brûlure. | ☐ V ☐ F |
| 7. Chez l'enfant, une SCB supérieure à 10% définit une brûlure grave. | ☐ V ☐ F |
| 8. Chez l'adulte, une SCB supérieure à 15% est considérée comme grave. | ☐ V ☐ F |

2. Nématodoses Intestinales (Ascaridiose, Ankylostomiase, Anguillulose, Oxyurose, Dracunculose)

- | | |
|---|---|
| 9. Les nématodoses intestinales sont causées par des vers plats. | ☐ V ☐ F |
| 10. L'ascaridiose est une parasitose intestinale cosmopolite et spécifiquement humaine. | ☐ V ☐ F |
| 11. L'homme se contamine par l'ascaris en ingérant des œufs embryonnés (voie digestive). | ☐ V ☐ F |
| 12. La migration larvaire de l'ascaris au niveau pulmonaire peut provoquer une toux et une dyspnée asthmatiforme. | ☐ V ☐ F |
| 13. L'occlusion intestinale par un peloton d'ascaris et la péritonite par perforation sont des complications possibles. | ☐ V ☐ F |
| 14. L'ankylostomiase est causée par <i>Ankylostoma duodenale</i> et <i>Necator americanus</i> . | ☐ V ☐ F |
| 15. La contamination par l'ankylostome se fait principalement par ingestion d'eau souillée. | ☐ V ☐ F |
| 16. L'ankylostomiase entraîne une spoliation sanguine pouvant causer une anémie grave chez l'enfant. | ☐ V ☐ F |
| 17. L'anguillulose est due au parasite <i>Strongyloides stercoralis</i> . | ☐ V ☐ F |
| 18. L'oxyurose est une affection cosmopolite très fréquente chez les enfants, causée par un petit ver rond blanc. | ☐ V ☐ F |
| 19. Le signe principal et pathognomonique de l'oxyurose est un prurit anal intense, souvent vespéral ou nocturne. | ☐ V ☐ F |

20.	Pour éviter la réinfestation par l'oxyure, il est recommandé de traiter tous les membres de la famille en même temps.	☐ V ☐ F
21.	La dracunculose (ver de Guinée) est provoquée par le ver <i>Dracunculus medinensis</i> .	☐ V ☐ F
22.	L'hôte intermédiaire et vecteur de la dracunculose est un petit crustacé appelé Cyclops.	☐ V ☐ F
23.	L'Homme contracte le ver de Guinée en mangeant de la viande de porc mal cuite.	☐ V ☐ F
24.	La localisation habituelle de la lésion causée par le ver de Guinée se situe au niveau du visage.	☐ V ☐ F

3. Cestodoses (Tæniase & Botriocephalose)

25.	Les cestodoses sont des helminthiases causées par des vers plats rubanés (cestodes).	☐ V ☐ F
26.	<i>Taenia saginata</i> est le ténia du bœuf et peut mesurer 4 à 12 mètres de long.	☐ V ☐ F
27.	L'Homme s'infecte par <i>Taenia saginata</i> en mangeant de la viande de porc mal cuite.	☐ V ☐ F
28.	L'infection par <i>Taenia saginata</i> est très souvent asymptomatique ou révélée par la découverte d'anneaux dans le linge.	☐ V ☐ F
29.	<i>Taenia solium</i> est le ténia du porc et mesure généralement 2 à 8 mètres de long.	☐ V ☐ F
30.	La prophylaxie des ténias repose sur le contrôle vétérinaire et la cuisson suffisante des viandes.	☐ V ☐ F
31.	<i>Diphyllobothrium latum</i> (Bothriocéphale) est le plus grand cestode adulte chez l'Homme (jusqu'à 20 m).	☐ V ☐ F
32.	La contamination par le bothriocéphale se fait en ingérant du poisson cru ou insuffisamment cuit.	☐ V ☐ F
33.	En plus des troubles digestifs, la bothriocéphalose peut engendrer une anémie.	☐ V ☐ F

4. Paludisme (Épidémiologie, Clinique & Prévention)

34.	Le paludisme est une maladie parasitaire due à un protozoaire transmis par la piqûre de l'anophèle femelle.	☐ V ☐ F
35.	<i>Plasmodium falciparum</i> est la seule espèce responsable des formes graves et mortelles de paludisme.	☐ V ☐ F
36.	Le seul réservoir de parasites pour le paludisme humain est l'Homme.	☐ V ☐ F
37.	L'accès palustre simple de première invasion comporte une fièvre pouvant atteindre 39°C - 40°C après 8 à 15 jours d'incubation.	☐ V ☐ F
38.	L'accès palustre intermittent classique se déroule selon 3 phases : frissons, chaleur, puis sueurs abondantes.	☐ V ☐ F
39.	Pendant la phase de frisson de l'accès palustre, la température corporelle diminue.	☐ V ☐ F
40.	La prostration, les convulsions répétées et les troubles de la conscience sont des critères d'accès palustre grave.	☐ V ☐ F
41.	Le neuropaludisme se caractérise chez l'adulte par un coma hypotonique et aréflexique.	☐ V ☐ F
42.	L'ictère, l'anémie grave et l'hypoglycémie ne font pas partie des critères de gravité du paludisme.	☐ V ☐ F

- | | | |
|-----|--|---|
| 43. | Le TDR (Test de Diagnostic Rapide) et la Goutte Épaisse sont des examens biologiques de diagnostic du paludisme. | ☐ V ☐ F |
| 44. | La pulvérisation d'insecticide type DDT a un effet rémanent pour lutter contre les moustiques adultes. | ☐ V ☐ F |

5. Rôle de l'Auxiliaire de Santé & Soins

- | | | |
|-----|---|---|
| 45. | À l'entrée du patient, le rôle de l'auxiliaire inclut l'accueil, le tri, la prise des paramètres vitaux et l'orientation. | ☐ V ☐ F |
| 46. | L'auxiliaire de santé ne doit pas intervenir dans l'information du patient ni dans les activités d'IEC/CCC. | ☐ V ☐ F |
| 47. | La surveillance des paramètres vitaux (Température, Pouls, Tension Artérielle) fait partie intégrante des soins. | ☐ V ☐ F |
| 48. | L'hygiène des mains et l'utilisation d'équipements de protection individuelle font partie des mesures de prévention des risques infectieux. | ☐ V ☐ F |
| 49. | La gestion des déchets et le tri du matériel usagé relèvent de la responsabilité des équipes de soins. | ☐ V ☐ F |
| 50. | Assurer la traçabilité des soins et des transmissions n'est pas nécessaire pour une prise en charge de qualité. | ☐ V ☐ F |

CORRECTION OFFICIELLE

Clé de réponse détaillée & Justifications issues des cours

N°	Réponse	Justification & Source du cours
1	VRAI	La membrane basale est partiellement détruite dans le 2ème degré profond.
2	FAUX	La cicatrisation d'une brûlure du 2ème degré profond prend 3 à 4 semaines.
3	VRAI	La douleur est notée très vive (+++).
4	VRAI	Il y a atteinte de toutes les couches de la peau (épiderme, derme, hypoderme).
5	VRAI	Les escarres noirâtres s'accompagnent d'une insensibilité locale.
6	VRAI	Les 3 facteurs de gravité sont la surface, la localisation et la profondeur.
7	VRAI	Chez l'enfant, SCB > 10% est considéré comme grave.
8	VRAI	Chez l'adulte, SCB > 15% est considéré comme grave.
9	FAUX	Les nématodes sont des vers ronds (les vers plats sont les cestodes/trématodes).
10	VRAI	L'ascaridiose est une parasitose cosmopolite spécifiquement humaine.
11	VRAI	Contamination par ingestion d'eaux, légumes ou crudités portant des œufs.
12	VRAI	Signes pulmonaires liés à la migration larvaire (syndrome de Löffler).
13	VRAI	Complications sévères dues à l'accumulation d'ascaris adultes.
14	VRAI	Ce sont les deux espèces d'ankylostomes responsables.
15	FAUX	La contamination est cutanée (marche pieds nus sur sol humide).
16	VRAI	Provoque une spoliation sanguine grave entraînant une anémie.
17	VRAI	Nom scientifique de l'anguillule.
18	VRAI	Affection cosmopolite et bénigne très fréquente chez l'enfant.
19	VRAI	Prurit anal vespéral/nocturne pathognomonique.
20	VRAI	Traitement simultané de la famille pour éviter la réinfestation.
21	VRAI	Agent pathogène de la dracunculose.
22	VRAI	<i>Cyclops</i> est le crustacé hôte intermédiaire.
23	FAUX	Contamination en buvant de l'eau contenant les cyclops.
24	FAUX	Localisation préférentielle aux membres inférieurs (pied, cheville).
25	VRAI	Les cestodoses sont dues à des vers plats (cestodes).
26	VRAI	Ténia du bœuf, mesure 4 à 12 mètres.
27	FAUX	<i>Taenia saginata</i> provient du bœuf (<i>Taenia solium</i> provient du porc).
28	VRAI	Découverte fréquente d'anneaux isolés dans le linge ou les selles.
29	VRAI	Ténia du porc, mesure 2 à 8 mètres.
30	VRAI	Contrôle des viandes (sécurité sanitaire) et cuisson suffisante.
31	VRAI	Peut atteindre jusqu'à 20 mètres de longueur.
32	VRAI	Ingestion de poisson d'eau douce cru ou mal cuit.

N°	Réponse	Justification & Source du cours
33	VRAI	Peut entraîner une anémie spécifique (anémie bothriocéphalique).
34	VRAI	Transmis par la piqûre de l'anophèle femelle.
35	VRAI	Seule espèce causant les accès graves / neuropaludisme mortel.
36	VRAI	L'Homme est le seul réservoir de parasites.
37	VRAI	Fièvre brutale à 39°-40°C après incubation de 8 à 15 jours.
38	VRAI	Déroulement classique : Frissons → Chaleur → Sueurs.
39	FAUX	La température augmente progressivement (sensation de froid intense malgré la fièvre).
40	VRAI	Signes neurologiques majeurs de gravité du paludisme.
41	VRAI	Neuropaludisme chez l'adulte = coma hypotonique et aréflexique.
42	FAUX	Ce sont tous des critères officiels de gravité du paludisme.
43	VRAI	TDR et Goutte Épaisse sont les 2 examens biologiques de référence.
44	VRAI	Action rémanente contre les anophèles adultes.
45	VRAI	Rôle direct d'accueil, de tri et de prise des constantes.
46	FAUX	L'auxiliaire doit participer à l'IEC/CCC et à l'information du patient.
47	VRAI	Prise de température, pouls, tension indispensable lors des soins.
48	VRAI	Mesures d'hygiène fondamentales en milieu de soins.
49	VRAI	Gestion, tri et élimination sécurisée des déchets hospitaliers.
50	FAUX	La traçabilité et les transmissions sont indispensables pour la continuité des soins.