MINISTERE DE LA SANTE
DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
DES AGENTS DE SANTE

ANTENNE D'ABENGOUROU

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

Fomesoutra.com
ça soutra!

DIPLOME D' ETAT BLANC 2026 AUXILIAIRE DE SANTE (AS) 2
EPREUVE HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

VERSION D

I. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE :

Choisi la ou les lettre(s) de la bonne réponse
Réponse juste = 1 point, réponse fausse ou absence = 0 point

1. Lequel de ces produits est destiné aux tissus vivants ?
   A. Désinfectant
   B. Antifongique
   C. Antiseptique
   D. Antibiotique
2. Quelles sont les trois principales familles de produits de nettoyage et d'hygiène citées
   A. Détergents,antibactériens,antifongiques
   B. Détergents,antiseptiques,désinfectants
   C. Antiseptiques, antibiotiques, antiviraux
   D. Détergents, antiviraux, antiparasitaires
3. L'intérêt particulier du détergent est d'éliminer : choisir les deux réponses justes
   A. Les salissures
   B. Les Graisses
   C. Éliminer les microorganismes
   D. Éliminer les bactéries
4. Trois des éléments ci-dessous, sont des critères majeurs d'un antiseptique. Lesquels ?
   A. La rémanence
   B. La vitesse d'action
   C. Le rapport qualité/prix.
   D. La couleur
   E. L'odeur

Étude de cas : *vous êtes Auxiliaire de santé dans un centre de santé rural de BIEBI. Vous recevez avec l'infirmier chef deux patients dont un blessé par machette et l'autre pour un pansement septique. Vous disposez seulement d'un seul bidon de javel à 12° et de l'eau dans votre centre de santé.*

Entourer la ou les bonne(s) réponse(s)

5. L'eau de javel à 12° que vous disposez est
   A. Un détergent
   B. Un antiseptique
   C. Un désinfectant
6. Pour nettoyer les surfaces propres, vous utiliserez l'eau de javel diluée dont le degré est à :
   A. 2°
   B. 8°
   C. 1.2°
   D. Inférieur à 0.5°
7. La quantité d'eau qu'il faut ajouter à 1L d'eau de javel à 12° pour avoir un désinfectant à 3° pour les surfaces souillées est :
   A. 1L
   B. 2L
   C. 3L
   D. 4L
8. Parmi les propositions ci-dessous, une fait partie des propriétés de l'antiseptique. Lequel ?
   A. Éliminer les microbes sur les tissus inertes
   B. Éliminer les microbes sur les tissus vivants
   C. Éliminer la salissure
   D. Inactif en présence de matières organiques
9. Parmi les propositions suivantes, citer les trois qui font partie des Précautions d'usage des désinfectants
   A. Vérifier la date de péremption

B. Manipuler les désinfectants avec des gants de soins
C. Ne pas compléter le contenu de produits entamés
D. Conserver le produit dans son conditionnement d'origine fermé

10. Pour préparer l'eau javellisée 2°chl, je dilue :
A. 1 volume de javel 9°chl dans 5 volumes d'eau
B. 1 volume de javel 8°chl dans 4 volumes d'eau
C. 1 volume de javel 12°chl dans 5 volumes d'eau
D. 1 volume de javel 12°chl dans 3 volumes d'eau
E. 1 volume de javel 8°chl dans 3 volumes d'eau

11. Quel produit est spécifiquement destiné à l'hygiène de l'environnement de soins ?
A. Antiseptique
B. Antibiotique
C. Désinfectant
D. Antiviral

12. Les différentes catégories de ligne en milieu hospitalier :
A. Le linge recyclable
B. Le ligne à usage unique
C. La tenue de base et surblouses hospitalier

13. La manipulation du linge hospitalier nécessite le respect de règles et de précautions rigoureuses à savoir :
A. Pratiquer l'hygiène des mains avant et après toute manipulation
B. S'abstenir de fumer, mais peut manger ou porter la main au visage au cours du travail.
C. Manipuler le linge à bout de bras, sans le secouer

14. Les antiseptiques dans cette liste sont :
A. Formol
B. Bétadine jaune
C. Omo
D. Éosine aqueuse
E. Savon de Marseille

15. Lequel de ces produits peut être utilisé pour l'hygiène de l'environnement de soins ?
A. Détergents
B. Antiseptiques
C. ~~Antifongique~~ Anti-Septique
D. Antibiotiques

16. Le lavage simple des mains se pratique :
A. En début et fin de service
B. Après un geste de vie courante
C. Entre deux activités non invasives
D. Après tout contact avec un patient infecté ou porteur d'une bactérie multi-Résistantes

17. Le lavage chirurgical des mains se pratique en
A. 5 temps et 10 minutes
B. 5 temps et 3 minutes
C. 3 temps et 5 minutes

18. La désinfection chirurgicale des mains par friction se pratique
A. 3 temps et 5 minutes
B. 5 minutes et 2 temps
C. 30 à 60 secondes

19. Le vêtement professionnel a pour rôle
A. D'identifier l'agent ou la catégorie professionnelle de l'agent
B. De protéger l'agent (constituer une barrière contre les produits et microbes)
C. D'être présentable à son poste de travail et bien se revêtir

20. Le port de gants est impératif pour le personnel hospitalier si
A. Risque de contact avec un produit biologique d'origine humaine contaminé
B. Manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériel non souillés
C. Présence d'une lésion cutanée même minime
D. Réalisation d'actes invasifs

21. Les différentes sortes de linge en milieu hospitalier sont
A. Le linge plat
B. Le linge en forme
C. Le linge de bloc opératoire

22. La seule précaution standard pour prévenir les accidents avec exposition au sang est
A. Port de gang avant chaque soin
B. Vaccination contre l'hépatite B
C. La prise d'antibiotique
D. L'hygiène des mains

II. Question Choix Direct (QCD) :

A = vrai et B = faux.
Réponse juste = 1 point, réponse fausse = - 1 point et absence de réponse = 0 point

23. L'hygiène hospitalière est la politique du contrôle et de prévention de l'infection
24. L'Infection Nosocomiale concerne uniquement les malades et le personnel soignant
25. L'hygiène améliore l'état de santé et de confort des individus
26. L'hygiène hospitalière est un indicateur de qualité et de sécurité des soins.
27. Après utilisation d'un détergent, les surfaces sont propres et désinfectées
28. La durée d'utilisation d'un antiseptique après ouverture du flacon est de 10 jours maximum
29. Une infection associée aux soins contractée dans un centre de santé est aussi appelée infection d'origine exogène
30. L'Infection Nosocomiale peut être provoquée par les micro-organisme hébergés par le patient
31. Les infections associées aux soins (I.A.S) se contractent uniquement à l'hôpital
32. L'infection du site opératoire est considérée comme nosocomiale si elle survient dans le mois qui suit l'intervention
33. L'infection est endogène lors que le malade s'infecte par ses propres germes
34. Les infections nosocomiales d'origine endogène sont combattues par le nettoyage régulier des locaux et du matériel
35. Les infections associées aux soins (I.A.S) se contractent partout il y a soins
36. L'infection du site opératoire est considérée comme nosocomiale si elle survient dans les 30 jours après l'intervention
37. Les germes responsables des infections nosocomiales se recrutent seulement parmi les bactéries et les virus
38. L'infection est exogène lorsque le malade s'infecte par les germes de l'environnement
39. L'infection est endogène lors que le malade s'infecte par les germes de l'environnement
40. Il existe trois techniques d'hygiène des mains
41. Il existe trois types de lavage
42. Le lavage simple des mains a pour but d'éliminer les salissures et réduire la flore transitoire par action mécanique
43. L'infection nosocomiale concerne seulement les malades et le personnel de santé
44. Le temps indiqué pour effectuer le lavage simple des mains est d'au moins 1 minute
45. Le but du lavage hygiénique des mains est d'éliminé les salissures et réduire la flore transitoire en utilisant un désinfectant
46. Le lavage chirurgical des mains a pour d'éliminer la flore transitoire et réduire la flore commensale de façon prolongée.
47. Une infection pathogène est une infection capable d'entrainer une maladie.
48. Le nettoyage régulier et la désinfection des surfaces est une des règles à respecter pour lutter contre les infections endogènes